

中醫臨床技能測驗

帶狀皰疹

- ☐望
- ☐聞
- ☐問 (含病史詢問)
- ☐切 (含脈診及身體診察)
- ☐病情解釋
- ☐醫病溝通
- ☐臨床處理
- ☐衛教
- ☒單項技能操作(穴位定標)

☐跨領域照護(非必選)：中醫會診/中西醫整合

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	1/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	------	------	------------------

第_____站

場景：中醫門診

姓名、年齡、性別：

陳小姐，70 歲，女性

主訴：（請簡要撰寫，而非詳細描述現病史）

因左側軀幹皮膚紅色丘疹與水泡，至
中醫門診接受針灸治療。

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	2/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	------	------	------------------

二、 考生指引

■ 背景資料：

陳春風，70 歲女性，3 天前西醫診斷為帶狀皰疹，現正服用抗病毒藥物:Acyclovir，但仍感到疼痛，初次至中醫門診接受針灸治療。

■ 測驗主題：

1. 請依感控程序進行接觸患者前的標準動作，並將患者擺位後，找出病患之：
 - ① 支溝
 - ② 太衝
 - ③ 行間
 - ④ 曲池
 - ⑤ 合谷
 - ⑥ 後溪
 - ⑦ T7 華佗夾脊
2. 口述找尋穴位方法，並實際操作。
3. 用穴位貼紙代替針刺標示出穴位。
(只須找出穴位，無需針刺)

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	3/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	------	------	------------------

■測驗時間：8 分鐘

■案例資訊：

身體檢查特徵

1.望診：

(1)體型：體盛(身高：165cm 體重：75Kg)。

(2)面色：白，略泛油光。指甲：淡紅。口唇：略暗紅。舌診：舌淡紅略胖，苔白黃膩，有齒痕。

2.聞診：

(1)氣味：呼吸時偶有痰音。

(2)聲音：語音略緊繃。

3.問診：

(1)寒熱：較怕熱。

(2)汗：汗出多。

(3)頭面：常頭汗出，皮膚黏膩

(4)二便：大便 1-2 日 1 行，便略軟;小便頻率正常，量可，顏色略深。

(5)攝食：食慾可。

(6)飲水：喜冷飲，飲多。

(7)鼻：正常。

(8)咽喉：正常。

(9)耳：正常。

(10)口齒：正常。

(11)胸脅：左側脅肋區 T7-T8 皮節區域皮膚條狀紅色丘疹與水泡

(12)腹部：較易脹氣。

(13)四肢：肌肉較鬆軟。

(14)情志：較易擔心、緊張。

(15)睡眠：晚上約 12 點就寢，早上 6 點起床。眠可。

4. 脈診：左脈濡滑弦有力 右脈濡滑

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	4/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	------	------	------------------

三、考官指引

■測驗目標/面向(可複選)：

- ☐望
- ☐聞
- ☐問 (含病史詢問)
- ☐切 (含脈診及身體診察)
- ☐病情解釋
- ☐醫病溝通
- ☐臨床處理
- ☐衛教
- 單項技能操作(穴位定標)

■測驗場景：■中醫門診、□中醫病房、□其他

■考官注意事項(考官任務)，應涵蓋以下：

1. 本考試目的在於為專科醫師臨床能力之最低標準把關。
2. 評分心態是評分公平性之關鍵，評分時請保持專注。
3. 請檢視考生指引、SP 指引與評分表之測驗目標一致性，以掌握本題。
4. 請詳讀評分項目、評分說明。
5. 考前評分共識時段，請依據考題及共識參考影片，進行評分之熱身。
6. 本題測驗重點為找出病患穴位並口述(只需找出穴位，無需針刺)。

■病情摘要

(一) 個案情境與主訴

陳春風，70 歲女性，有糖尿病病史，近一個月因處理長輩後事，壓力繁重，一周前曾感冒疲倦，6 天前左側脅肋區開始出現搔癢疼痛，3 天前患處皮膚出現紅色丘疹與水泡，且疼痛加劇，因而至西醫門診，診斷為帶狀皰疹，現正服用抗病毒藥物: Aciclovir，但仍感到疼痛，請兒子上網搜尋，說中醫針灸可緩解疼痛，故前來門診接受治療。

(二) 病史詢問

1. 主要臨床症狀：3 天前左側脅肋區皮膚出現紅色丘疹與水泡，伴隨搔癢疼痛

2. 現病史：紅色集簇性粟粒丘疹群與水泡，水泡邊緣緊繃周有紅暈，內容液澄清透明，分布於左脅肋區，帶狀分布環軀幹而生，帶狀寬度約有 6-7cm，自側後脅肋區向前蔓延生長，近日過度勞累，精神壓力大，一周前曾感冒疲倦，6 天前左側脅肋區開始出現搔癢疼痛，3 天前患處皮膚出現紅色丘疹與水泡。皮膚敏感，碰觸時疼痛加劇，甚至觸碰到衣服也會痛，喝青草茶後疼痛略緩解，伴隨疲倦，全身不適，低燒。

3. 過去病史：糖尿病。

4. 家族史：父母親皆有糖尿病。

5. 個人史：已婚，3 個小孩，2 男 1 女。

6. 藥物史：降血糖藥 METFORMIN 500MG 1tab BID

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	5/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	------	------	------------------

7.其他病史：幼兒時期曾患水痘皮疹。

(三)身體檢查特徵

1.望診：

(1)體型：體盛(身高：165cm 體重：75Kg)。

(2)面色：白，略泛油光。指甲：淡紅。口唇：略暗紅。舌診：舌淡紅略胖，苔白黃膩，有齒痕。

2.聞診：

(1)氣味：呼吸時偶有痰音。

(2)聲音：語音略緊繃。

3.問診：

(1)寒熱：較怕熱。

(2)汗：汗出多。

(3)頭面：常頭汗出，皮膚黏膩

(4)二便：大便 1-2 日 1 行，便略軟;小便頻率正常，量可，顏色略深。

(5)攝食：食慾可。

(6)飲水：喜冷飲，飲多。

(7)鼻：正常。

(8)咽喉：正常。

(9)耳：正常。

(10)口齒：正常。

(11)胸脅：左側脅肋區 T7-T8 皮節區域皮膚條狀紅色丘疹與水泡

(12)腹部：較易脹氣。

(13)四肢：肌肉較鬆軟。

(14)情志：較易擔心、緊張。

(15)睡眠：晚上約 12 點就寢，早上 6 點起床。眠可。

4. 脈診：左脈濡滑弦有力 右脈濡滑

(四)本案例臨床診斷與處置之參考

1. 鑑別診斷:

單純疱疹(herpes simplex)

皰疹性皮膚炎(dermatitis herpetiformis)

膿痂疹(impetigo)

接觸性皮膚炎 (contact dermatitis)

陰道念珠菌感染(Candidiasis)

蚊蟲叮咬(insect bites)

2. 相關檢驗：

Tzanck smear

VZV-specific IgM antibody

PCR for VZV DNA

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	6/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	------	------	------------------

3. 相關處置：

止痛藥(Analgesics): Morphine, Zostrix, lidocaine

抗病毒藥物(antiviral drug): Aciclovir, Valaciclovir, Famciclovir

類固醇(Steroids): Corticosteroids

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	7/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	------	------	------------------

四、評分表

■測驗目標：單向技能操作

■測驗時間：8 分鐘

評分項目: (建議 10-15 項)	評量考生			
測驗項目：	完全做到	部分做到	沒有做到	備註
1.醫師在接觸病人前先將手洗淨、並自我介紹與確認病人身分	2	1	0	
2.選定針灸取穴之最適當姿勢與體位。	2	-	0	
3.右手支溝穴	2	1	0	
4.右腳太衝穴	2	1	0	
5.右腳行間穴	2	1	0	
6.右手曲池穴	2	1	0	
7.右手合谷穴	2	1	0	
8.右手後溪穴	2	1	0	
9. T7 華佗夾脊	2	1	0	
10.能關心病人的感受並適時安撫。	2	1	0	

及格標準 設定方法	Extended Angoff		及格分數	13	
考生整體表現	差 1	待加強 2	普通 3	良好 4	優秀 5
說明：					

評分考官簽名：_____

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	8/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	------	------	------------------

評分說明

1.醫師在接觸病人前①先將手洗淨、②自我介紹、③確認病人身分


完全做到：依標準程序洗手(乾濕擇一)，並自我介紹與詢問病人是否為陳小姐。

部份做到：僅做到三項其中 1~2 項

沒有做到：3 項皆未做到。

2.選定針灸取穴之最適當姿勢與體位


完全做到：有正確擺位，採仰臥位（圖一）或坐姿。



圖一：仰臥位示意圖


沒有做到：沒有正確擺位。

3.支溝穴：手腕關節背面上方三寸(前臂伸側面)，尺桡兩骨間(圖三)，且用病人同身寸度量(三焦經經火穴)（圖二）。



圖二：同身寸度量法

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	9/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	------	------	------------------




圖三、支溝穴

完全做到：手腕關節背面上方三寸(前臂伸側面)，尺桡兩骨間，且用病人同身寸度量(三焦經經火穴)(口述取穴步驟及實際操作皆正確)。

部份做到：口述取穴步驟或實際操作有錯誤。

沒有做到：口述取穴步驟與實際操作皆錯誤。

4.太衝穴：足大趾外側(大趾與次趾之間)，趾縫上 2 寸(行間上 1 寸 5 分)，且用病人同身寸度量(肝經原穴)。(圖四)



圖四、太衝穴


完全做到：足大趾外側(大趾與次趾之間)，趾縫上 2 寸(行間上 1 寸 5 分)，且用病人同身寸度量。(口述取穴步驟及實際操作皆正確)。

部份做到：口述取穴步驟或實際操作有錯誤。

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	10/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	-------	------	------------------

沒有做到：口述取穴步驟與實際操作皆錯誤。

5.行間穴：足大趾與次趾縫間(足背第一、二趾趾蹼)，動脈應手陷中，蹼緣後方赤白肉際處(太衝下 1 寸 5 分)，且用病人同身寸度量(圖五)




圖五、行間穴

完全做到：足大趾與次趾縫間(足背第一、二趾趾蹼)，動脈應手陷中，蹼緣後方赤白肉際處(太衝下 1 寸 5 分)，且用病人同身寸度量(口述取穴步驟及實際操作皆正確)。

部份做到：口述取穴步驟或實際操作有錯誤。

沒有做到：口述取穴步驟與實際操作皆錯誤。

6. 曲池穴：以手拱胸，取肘部橈側橫紋盡頭(尺澤與肱骨外上髁連線的中點)。貼近骨邊取之 (圖六)。且用病人同身寸度量



圖六、曲池穴

完全做到：以手拱胸，取肘部橈側橫紋盡頭(尺澤與肱骨外上髁連線的中

測驗對象

☐中醫內科 ☒針灸科 ☐中醫婦科 ☐中醫兒科
☐中醫傷科 ☐中醫家庭暨社區醫學科
專科醫師訓練臨床技能測驗教案

11/18

版本日期


2021/10/05 Final

點)。貼近骨邊取之。且用病人同身寸度量(口述取穴步驟及實際操作皆正確)。

部份做到：口述取穴步驟或實際操作有錯誤。

沒有做到：口述取穴步驟與實際操作皆錯誤。

7. 合谷穴：手伸直側置，橈側向上，令拇，食二指伸張(手背第 1~2 掌骨間)，取歧骨前微凹處是穴(約第 2 掌骨橈側的中點處)，且用病人同身寸度量。(圖七)



圖七、合谷穴


完全做到：手伸直側置，橈側向上，令拇，食二指伸張(手背第 1~2 掌骨間)，取歧骨前微凹處是穴(約第 2 掌骨橈側的中點處)，且用病人同身寸度量。(口述取穴步驟及實際操作皆正確)。

部份做到：口述取穴步驟或實際操作有錯誤。

沒有做到：口述取穴步驟與實際操作皆錯誤。

8. 後溪穴：仰手握拳取之，拳尖起骨下陷中。當本節(掌指關節)後之橫紋尖端骨邊陷中是穴，且用病人同身寸度量(圖八)

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	12/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	-------	------	------------------




圖八、後溪穴

完全做到：後溪穴：仰手握拳取之，拳尖起骨下陷中。當本節(掌指關節)後之橫紋尖端骨邊陷中是穴，且用病人同身寸度量(口述取穴步驟及實際操作皆正確)。

部份做到：口述取穴步驟或實際操作有錯誤。

沒有做到：口述取穴步驟與實際操作皆錯誤。

9. T7 華佗夾脊：俯臥，第七胸椎棘突下，棘突下旁開五分。雙手平放於身體兩側，兩邊肩胛骨最下角的水平連線通過 T7 的棘突，或由大椎穴再往下數 7 節棘突(圖九)



圖九、T7 華佗夾脊

完全做到：俯臥，第七胸椎棘突下，棘突下旁開五分。雙手平放於身體兩側，兩邊肩胛骨最下角的水平連線通過 T7 的棘突，或由大椎穴再往下數 7 節棘突(口述取穴步驟及實際操作皆正確)。

測驗對象

☐中醫內科 ☒針灸科 ☐中醫婦科 ☐中醫兒科
☐中醫傷科 ☐中醫家庭暨社區醫學科
 專科醫師訓練臨床技能測驗教案

13/18

版本日期

2021/10/05 Final

部份做到：口述取穴步驟或實際操作有錯誤。
沒有做到：口述取穴步驟與實際操作皆錯誤。
10. 能關心病人的感受並適時安撫(①按壓穴道時能詢問病人是否過於疼痛難以忍受，若是則②能放輕力道並請病人稍微忍耐)
完全做到：兩者皆有做到。
部份做到：只做到其中一項。
沒有做到：沒做到。

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	14/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	-------	------	------------------

五、SP 指引(劇本)

考題說明

■測驗任務：單項技能操作，單項技能操作，標示出正確的支溝穴(三焦經經火穴)、太衝穴(肝經原穴)、行間穴(肝經榮火穴)、曲池穴(大腸經合土穴)、合谷穴(大腸經原穴)、後溪穴(小腸經輸木穴)及 T7 華佗夾脊穴。

■任務：

1. 考前：依據劇本及共識影片，與訓練師試演至少一次，以確認演出之有效性。
2. 劇本未提供之訊息，在不協助/不阻礙考生得分的原則下，可自行決定回應方式，考前請向工作人員參閱評分表，以了解演出之原則與底限。
3. 考試時：心態請力持公平，不協助/不阻礙考生得分。

■場景：門診

■起始姿勢：坐姿

■表情、情緒、動作：表情溫和；情緒略顯緊張；動作自然

■人員/道具：一名 70 歲女性 SP(著短褲與可拉至手肘以上並且可將左脅肋拉起的短袖上衣)、左脅肋 T7-T8 帶狀泡疹的圖片一張、有完整測驗穴位的清單一張(支溝穴、太衝穴、行間穴、曲池穴、合谷穴、後溪穴、T7 華佗夾脊穴)、圓形有色貼紙(直徑 1.2 公分，標註穴位用)

■演出時間：8 分鐘

SP 開場語

「最近左肋骨區開始出現搔癢疼痛與疹子，去西醫檢查後，醫師認為我得了帶狀皰疹，女兒幫我上網搜尋後，說醫師您針灸技術不錯，想來給您治療看能不能幫忙緩解疼痛。」

SP 必問問題

無

回應考生原則

- 1、考生問什麼回答甚麼，一問一答，不需主動提問。
- 2、若不清楚考生問題內容，可請考生再問一次。

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	15/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	-------	------	------------------

劇情

(一) 個案情境與主訴

陳春風，70 歲女性，有糖尿病病史，近一個月因處理長輩後事，壓力繁重，一周前曾感冒疲倦，6 天前左側脅肋區開始出現搔癢疼痛，3 天前患處皮膚出現紅色丘疹與水泡，且疼痛加劇，因而至西醫門診，診斷為帶狀皰疹，現正服用抗病毒藥物: Aciclovir，但仍感到疼痛，請兒子上網搜尋，說中醫針灸可緩解疼痛，故前來門診接受治療。

(二) 病史詢問

1. 主要臨床症狀：3 天前左側脅肋區皮膚出現紅色丘疹與水泡，伴隨搔癢疼痛
2. 現病史：紅色集簇性粟粒丘疹群與水泡，水泡邊緣緊繃周有紅暈，內容液澄清透明，分布於左脅肋區，帶狀分布環軀幹而生，帶狀寬度約有 6-7cm，自側後脅肋區向前蔓延生長，近日過度勞累，精神壓力大，一周前曾感冒疲倦，6 天前左側脅肋區開始出現搔癢疼痛，3 天前患處皮膚出現紅色丘疹與水泡。皮膚敏感，碰觸時疼痛加劇，甚至觸碰到衣服也會痛，喝青草茶後疼痛略緩解，伴隨疲倦，全身不適，低燒。
3. 過去病史：糖尿病。
4. 家族史：父母親皆有糖尿病。
5. 個人史：已婚，3 個小孩，2 男 1 女。
6. 藥物史：降血糖藥 METFORMIN 500MG 1tab BID
7. 其他病史：幼兒時期曾患水痘皮疹。

(三) 身體檢查特徵

1. 望診：

- (1) 體型：體盛(身高：165cm 體重：75Kg)。
- (2) 面色：白，略泛油光。指甲：淡紅。口唇：略暗紅。舌診：舌淡紅略胖，苔白黃膩，有齒痕。

2. 聞診：

- (1) 氣味：呼吸時偶有痰音。
- (2) 聲音：語音略緊繃。

3. 問診：

- (1) 寒熱：較怕熱。
- (2) 汗：汗出多。
- (3) 頭面：常頭汗出，皮膚黏膩
- (4) 二便：大便 1-2 日 1 行，便略軟；小便頻率正常，量可，顏色略深。
- (5) 攝食：食慾可。
- (6) 飲水：喜冷飲，飲多。
- (7) 鼻：正常。
- (8) 咽喉：正常。
- (9) 耳：正常。
- (10) 口齒：正常。
- (11) 胸脅：左側脅肋區 T7-T8 皮節區域皮膚條狀紅色丘疹與水泡
- (12) 腹部：較易脹氣。
- (13) 四肢：肌肉較鬆軟。
- (14) 情志：較易擔心、緊張。
- (15) 睡眠：晚上約 12 點就寢，早上 6 點起床。眠可。

4. 脈診：左脈濡滑弦有力 右脈濡滑

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	16/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	-------	------	------------------

劇本對白例句

	醫師對 SP 的問題	SP 的回應
自我介紹與 確認病患	您好，我是 OO 醫師。請問您的大名？	我叫陳春風，醫師您好！
確認病患就 診目的	請問身體那兒不舒服？	最近左肋骨區開始出現搔癢疼痛與疹子，去西醫檢查後，醫師認為我得了帶狀皰疹，兒子幫我上網搜尋後，說醫師您針灸技術不錯，想來給您治療看能不能幫忙緩解疼痛。
	請問您過去有針灸過嗎？	沒有，這是第一次。
正確擺位	麻煩您坐在椅子上，正坐即可(仰臥亦可)。	好的，如考生要求進行擺位。
	請將您的膝蓋彎曲成 90 度。	好的，如考生要求進行擺位。
確認穴位	請問我按壓穴位的時候，會有酸麻或酸脹感嗎？	請如實回答即可。
考試過程中	若考生尋找穴位過程中，按壓身體造成無法忍受的感覺時。	請如實反應當時感覺，例如：這樣按壓很痛，無法忍受，請輕一點。

■診間示意圖：無

■道具及器材：一名 70 歲女性 SP(著短褲與可拉至手肘以上並且可將左脅肋拉起的短袖上衣)、左脅肋 T7-T8 帶狀泡疹的圖片一張、有完整測驗穴位的清單一張(支溝穴、太衝穴、行間穴、曲池穴、合谷穴、後溪穴、T7 華佗夾脊穴)、圓形有色貼紙(直徑 1.2 公分，標註穴位用)

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	17/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	-------	------	------------------

道具

1. 左脅肋 T7-T8 帶狀泡疹的圖片



圖片取自：<https://www.sciencephoto.com/media/694446/view/shingles-rash>

版權：DR HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

測驗對象	☐ 中醫內科 ☒ 針灸科 ☐ 中醫婦科 ☐ 中醫兒科 ☐ 中醫傷科 ☐ 中醫家庭暨社區醫學科 專科醫師訓練臨床技能測驗教案	18/18	版本日期	2021/10/05 Final
------	--	-------	------	------------------