

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

衛生福利部 115 年度專科護理師甄審筆試試題本

報考科別：內科、外科、兒科、
精神科、婦產科、
家庭科

科目：專科護理通論

【注 意 事 項】

- 1.請核對考試科目與報考類別是否相符。
- 2.請檢查答案卡、座位及入場證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
- 3.本試卷共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。
試卷最後一題後面有備註【以下空白】。
- 4.本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 **2B** 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
- 5.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
- 6.本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
- 7.請在試卷首頁入場證號碼之方格內，填上自己的入場證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。

入場證號碼：□□□□□□□□

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫入場證號碼，再翻閱試題本作答。

1. 根據 113 年 3 月 12 日發布「專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法」，專科護理師（以下簡稱專師）執行職務的範疇，下列敘述何者最不適當？
 - (A) 專師得自行開立藥物處方供藥師調劑，可事後請醫師核簽
 - (B) 醫院未訂定該項預立流程，專師就不得代為開立相關醫囑表單
 - (C) 專師得於醫師監督下，執行未及於肌肉及肌腱之表層傷口縫合
 - (D) 專師得於病歷製作紀錄並署名，其執業紀錄性質仍屬護理紀錄
2. 根據「專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法」，下列何者對醫師監督之敘述最適當？
 - (A) 必須全程在病人床邊監督
 - (B) 必須於同一病房內監督
 - (C) 不限於親自在場，可採指示、指導或督促方式
 - (D) 僅能採電話監督
3. 有關專師執行預立醫療流程中的「檢驗、檢查之開立」之法律規範限制，下列敘述何者正確？
 - (A) 只要醫師於事後 72 小時內補簽名即合法化
 - (B) 專師可不分科別開立任何檢驗項目
 - (C) 核對、簽署及記錄，護理機構得以資通訊或傳真方式為之
 - (D) 高輻射劑量檢查，如電腦斷層則禁止列入流程
4. 根據「專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法」，下列何者最不符合？
 - (A) 開立全靜脈營養輸液
 - (B) 執行病人鼻胃管置放
 - (C) 安排上消化道內視鏡
 - (D) 執行中央靜脈導管置放
5. 病人接受腹腔手術後，腹部引流管引流不順，疑有阻塞情形。根據「專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法」，下列何者不是專師得執行之業務？
 - (A) 腹腔引流液數值判讀
 - (B) 腹腔引流管置換
 - (C) 給予家屬病況說明
 - (D) 製作病歷相關紀錄
6. 有關專師進行癌末病人安寧緩和決策諮詢時的態度，下列何者不適當？
 - (A) 要求病人遵從醫囑，以降低病人家屬決策困難
 - (B) 應以坦誠的心態進行諮詢，增加互相理解
 - (C) 要有耐心，避免緊迫性的溝通
 - (D) 應評估適當時機給予病人家屬合理的情緒宣洩
7. 有關專師的自主專業定位與價值，下列敘述何者最適當？
 - (A) 依醫囑逐項理解交辦事項，並正確執行護理技術
 - (B) 負責病房排班、有效溝通及耗材管理等行政庶務
 - (C) 協助醫師安排檢查，並委婉轉達檢查結果給家屬
 - (D) 正確評估病人問題，擬定並追蹤個別化照護計畫
8. 病人家屬看到一名正在評估病情並執行醫療業務的專師，因其未配戴可辨識身分的識別證，遂向醫院反映醫療人員身分不明。護理部調查後發現，該專師當天因更換制服而未配戴識別證。根據「專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法」，下列何者最適當？
 - (A) 有執業執照，即使未配戴識別標誌亦不影響執行醫療業務
 - (B) 執行侵入性醫療處置時，才須配戴可識別身分之標誌
 - (C) 是否配戴身分標誌由各醫療機構自行決定，法規未明文規定
 - (D) 執行醫療業務時，應配戴或顯示足以識別其身分之標誌

9. 規劃糖尿病病人使用筆型胰島素之衛教計畫時，若依據 Bloom 的教學目標分類，「病人能表達對疾病自我管理之重視與正向態度」屬於下列哪一個領域？
(A) 社會領域 (B) 認知領域 (C) 技能領域 (D) 情意領域
10. 主治醫師上午查房時表示：「下午若引流量持續少於 50 mL，即可依預立醫療流程拔除胸管。」下午評估時，引流量為 30 mL，惟病人出現呼吸急促、血氧由 98% 下降至 88%，並主訴胸痛。此時專師最適當之處置為何？
(A) 引流量已符合標準，應依預立醫療流程拔除胸管
(B) 先拔除胸管，再回報醫師拔管前出現之新症狀
(C) 為維持醫療效率，可與護理師共同評估並拔除胸管
(D) 病人臨床狀況已改變，應停止執行流程並立即回報監督醫師
11. 病人因腦中風入院，目前重度昏迷，醫師評估已無醫療決策能力。大兒子主張「一定要插管、急救到底，不放棄任何希望！」而小女兒則痛哭表示「爸爸以前說過，如果變植物人絕對不要急救！」因家屬遲遲未能產生共識，身為專師，此時之首要處置何者最適當？
(A) 請家屬自行協調取得共識後再通知醫療團隊，期間仍給予相關維生治療
(B) 主動安排家庭會議，由醫療團隊及家屬共同參與，討論病人可能的意願
(C) 若家屬意見不一致時，即依照病人最佳利益給予最適切的相關治療
(D) 依照法律規定，當下應以其配偶之意見為考量
12. 專師經專業判斷認為使用親水性敷料較適合，但主治醫師仍堅持使用傳統換藥方式，雙方在病人傷口處置上意見分歧。下列哪一種溝通方式最符合正向、尊重與雙向溝通原則？
(A) 完全尊重醫師指示以避免團隊氣氛尷尬
(B) 私下鼓勵病人向主治醫師提出更換敷料
(C) 提出相關實證文獻與傷口評估紀錄討論
(D) 向病人說明兩種換藥方式讓其自行決定
13. 擬設計一套「慢性阻塞性肺病之定量噴霧/乾粉吸入器之操作」的教案，針對識字能力較低的高齡個案，下列何種教學方法最能達到學習目標？
(A) 可安排團體衛教口頭講述 (B) 可提供影音光碟影片觀看
(C) 使用回覆示教法進行指導 (D) 將衛教資料中的文字放大
14. 專師需符合「專科護理師分科及甄審辦法」之要求，接受繼續教育課程以提升能力，下列敘述何者**錯誤**？
(A) 各類進修課程(含研究所學分)之積分採計可完全折抵
(B) 一般護理師繼續教育課程積分不能抵專師的課程積分
(C) 感染控制及性別議題之課程積分應達 12 點以上
(D) 繼續教育課程包括專業、品質、醫事倫理及醫事法規四類
15. 根據台灣現行護理人員法及相關辦法，有關專師的角色定位與其得執行之業務範圍，下列敘述何者正確？
(A) 護理指導及諮詢屬醫療輔助行為，須經醫師同意
(B) 專師有別於進階護理師，從事醫療輔助行為不需醫師指示
(C) 醫院得將專師比照醫師排班值班，獨立執行醫師業務
(D) 專師得於醫師監督下執行護理業務外之部分醫療業務

16. 為社區長者規劃預防跌倒的健康教育方案，下列何者不屬於健康教育方案規劃架構中應納入的步驟？
- (A) 課程進行中全程採雙盲隨機分派，以符合嚴謹的臨床試驗設計
 - (B) 以健康信念模式等健康教育理論作為課程設計的理論依據
 - (C) 開辦前先調查長者跌倒經驗與居家環境風險，據以排定優先介入的問題
 - (D) 方案結束後測量長者跌倒發生率與自我防跌行為的改變，以檢視成效
17. 面對情緒激動、當面抱怨的病人家屬，下列何者為專師最優先的處置方式？
- (A) 立即承諾對方要求並著手處理
 - (B) 專注傾聽對方在意與擔憂之處
 - (C) 直接詢問對方期望的解決方式
 - (D) 提醒對方爭執無助於改善現況
18. 專師為高血壓病人規劃用藥自我管理衛教方案，有關教學評量模式的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 衛教結束後測驗病人能否正確說出服藥時間，屬總結性評量
 - (B) 衛教前先測試病人對高血壓藥物的既有認識，屬安置性評量
 - (C) 針對反覆記錯劑量的病人探究其學習困難所在，屬診斷性評量
 - (D) 於衛教中隨時觀察病人理解情形並調整教法，屬確定性評量
19. 病人因肺炎住院，夜班時突然出現呼吸困難且血氧飽和度下降至 88%。專師以 SBAR 技巧與值班醫師溝通，下列何者屬於「評估 (assessment)」的內容？
- (A) 目前呼吸 30 次/分，且有發燒 39°C 的情形
 - (B) 昨天剛從急診入院，過去有慢性阻塞性肺疾病病史
 - (C) 兩側肺底部有明顯爆裂音，懷疑有急性肺水腫狀況
 - (D) 建議您立即來看病人，並開立緊急胸部 X 光檢查與動脈血氣體分析
20. 80 歲女性病人因尿路感染合併敗血症住院，家屬在會客時情緒激動地抱怨：「為什麼我媽發燒這麼久都沒退？你們到底有沒有在治療？」專師運用同理心與溝通協調技巧，下列回應何者最適當？
- (A) 敗血症本來就會持續發燒，抗生素發揮作用需要時間，請您耐心等待
 - (B) 聽起來您對媽媽持續發燒感到焦慮，我們來討論目前的治療計畫與預期狀況
 - (C) 您先不要激動，我們已經給予最高階的抗生素，請相信醫療團隊的專業
 - (D) 不太能理解您的不滿，我會請主治醫師來向您解釋清楚以免產生誤會
21. 50 歲病人剛被主治醫師明確告知確診為晚期肺癌。主治醫師查房離開後，專師進入病房欲進行後續治療計畫的溝通與衛教。病人突然對專師大發雷霆，強烈抱怨病房冷氣太冷、護理人員動作太慢，並拒絕聽取任何衛教資訊。病人因不敢向權威的醫師表達憤怒，而將情緒發洩在專師身上，造成嚴重的溝通阻礙，此為何種心理防衛機轉？
- (A) 投射作用 (projection)
 - (B) 替代作用 (displacement)
 - (C) 反向作用 (reaction formation)
 - (D) 合理化 (rationalization)
22. 根據「菸害防制法」現行規定及部分條文修正草案，有關於類菸品管理之敘述，下列何者正確？
- (A) 未滿 20 歲者使用類菸品，處較成年人更高罰鍰
 - (B) 無償供應類菸品予親友，不受本法處罰
 - (C) 修正草案增訂違法類菸品沒入銷毀規定
 - (D) 網際網路業者無須管理違法類菸品資訊

23. 75 歲獨居個案前來衛生所進行長者健康整合式評估 (ICOPE)，專師發現其「認知功能」項目篩檢呈現異常，且自述近期常忘記服藥。與病人討論後續的用藥整合與轉介計畫，下列處置何者最適當？
- (A) 應請長者將醫院處方藥、自行購買的成藥、中藥及營養補充品，全部帶來檢視
 - (B) 考量其認知篩檢異常，應直接聯繫家屬代為管理，避免長者產生挫折感
 - (C) 說明後直接詢問：「我剛剛說明的內容，您都清楚了嗎？還有沒有任何問題？」
 - (D) 為保持邏輯完整，應將全部資訊一次講完後，再針對長者不懂的段落進行釐清
24. 為落實長期照顧十年計畫 3.0「在地安老、安寧善終」願景，並強化醫療與長照服務的連續性，關於整併「健保居家醫療照顧整合計畫」與「長照居家失能個案家庭醫師照護方案」之核心執行策略，下列何者正確？
- (A) 建立在宅責任醫師照顧網絡，強化醫療與長照服務之銜接
 - (B) 於居家環境全面導入租賃式智慧科技輔具，並以遠距醫療取代居家醫師訪視
 - (C) 針對住宿型照護機構，全面推動不分年齡的急性後期整合照護計畫 (PAC)
 - (D) 將居家醫療團隊改編為共生社區據點的專職人員，專責長者功能評估
25. 根據民國 110 年 1 月 20 日修正之「病人自主權利法」及其施行細則，關於預立醫療決定之啟動、撤回及醫療委任代理人權限，下列敘述何者正確？
- (A) 病人是否符合啟動預立醫療決定之特定臨床條件，僅需原主治醫師依其專業經驗判定
 - (B) 若家屬強烈反對執行該決定，醫療團隊應考量家屬感受而繼續使用維生醫療
 - (C) 意願人得隨時以書面向醫療機構撤回或變更預立醫療決定，並更新健保憑證註記
 - (D) 醫療委任代理人之法定權限，包含在意願人健康時依自身判斷代為修改意願人之預立醫療決定內容
26. 15 歲女性因腹部不適就醫，經評估發現懷孕 12 週，擔心父母責打，要求醫療人員保密，並詢問是否可自行決定人工流產。依據相關法規，下列處置何者正確？
- (A) 未成年人具有意思能力時，得自行簽署人工流產同意書
 - (B) 醫事人員應進行責任通報，至遲不得超過 24 小時
 - (C) 未取得法定代理人同意時，醫療機構得代為簽署同意書
 - (D) 病人與伴侶共同簽署同意書後，即可施行人工流產
27. 根據國民健康署現行公費癌症篩檢政策，55 歲已停經女性，無肺癌家族史且不吸菸，下列篩檢建議何者正確？
- (A) 每年補助 1 次子宮頸抹片檢查
 - (B) 每年補助 1 次糞便潛血檢查
 - (C) 每年補助 1 次乳房 X 光攝影檢查
 - (D) 每 2 年補助 1 次低劑量電腦斷層檢查
28. 發生醫療事故後，病人家屬情緒激動並表示將提起訴訟，根據民國 112 年 12 月 28 日發布之「醫療事故預防及爭議處理法」，下列處置原則何者正確？
- (A) 為避免日後訴訟不利，醫事機構得暫時拒絕提供病歷複製本，直到法院正式發函要求
 - (B) 未申請調解會調解而逕行提出醫療爭議民事訴訟者，法院應移付調解會先行調解
 - (C) 醫療機構應於事故發生後 1 個月內，向病人或家屬說明及提供關懷協助
 - (D) 醫師認定處置無疏失時，醫療機構得免除說明、溝通及關懷義務

29. 現行「急診檢傷分類基準」係由下列何機關公告？
(A) 台灣急診醫學會 (B) 中央健康保險署 (C) 內政部消防署 (D) 衛生福利部
30. 執行居家訪視時，合理懷疑失智長者遭同住兒子虐待，致其健康或自由發生危難；其子拒絕進一步評估。根據老人保護相關法規，下列處置何者正確？
(A) 應尊重其子拒絕評估之意願，並僅記錄於病歷
(B) 若合理懷疑有虐待情事，應於 24 小時內通報
(C) 應立即聯繫警政單位，並強制安置病人
(D) 可先與其子進行家庭諮商，暫緩行政通報
31. 某專師以 A 醫院為執業登記處所，晚間固定至 B 診所執行業務，未辦理執業處所變更、機構間支援或事先報准。衛生局稽查時發現此情形。依「護理人員法」規定，下列敘述何者最適當？
(A) 因兩處皆為合法醫療機構，護理人員可自由跨院執業
(B) 只要不支領薪資，即不受執業登記規範
(C) 應依執業登記規定，未依法完成相關程序不得於其他醫療機構執業
(D) 專師屬進階護理人員，不受一般護理人員執業登記規範
32. 某外科病房專師接獲醫師指示執行一項高風險侵入性處置，但該專師過去未接受相關訓練，也未具備獨立執行經驗。當班人力不足，資深同仁建議：「先照做，之後再補訓即可。」此時專師最符合專業倫理之作法為何？
(A) 因已獲醫師指示，應立即執行以避免延誤病人治療
(B) 請同仁代為完成紀錄，再自行觀察並學習操作流程
(C) 主動說明自身能力限制，尋求監督醫師或具資格人員協助
(D) 為維持團隊合作，避免提出能力不足問題
33. 某專師照護一名知名人士病人，非照護單位同仁因好奇詢問病情，並稱：「只是同事間聊天，不會傳出去。」此時最適當的回應為何？
(A) 不公開病人姓名，即可提供部分病情資訊
(B) 同為醫療人員，即可查看及討論病歷內容
(C) 病人資訊不得因好奇而查詢、使用或揭露
(D) 為維持同事關係，可私下分享部分資訊
34. 下列何者為醫療品質結果面指標？
(A) 專師 ACLS 證書比率 (B) 護理人員給藥正確率
(C) 專師病歷簽章完成率 (D) 住院病人跌倒發生率
35. 50 歲女性個案，抽菸 20 年、身高 155 cm、體重 70 kg、腰圍 85 cm、血壓 120/85 mmHg、空腹血糖 105 mg/dL、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C) 60 mg/dL、三酸甘油酯(TG) 175 mg/dL，根據國民健康署標準，其符合代謝症候群的診斷標準共幾項？
(A) 2 項 (B) 3 項 (C) 4 項 (D) 5 項
36. 根據國民健康署「成人肥胖防治實證指引」，有關肥胖與疾病關係之敘述，下列何者錯誤？
(A) 身體質量指數(BMI) 越低，罹癌風險越高
(B) 過重與肥胖增加男性及女性不孕症的機率
(C) 肥胖合併膝退化關節炎病人，減重 5-10% 可改善疼痛
(D) 減重可改善非酒精性脂肪肝炎之功能及肝纖維化

37. 根據國民健康署發表「成人肥胖防治實證指引」，有關飲食介入之敘述，下列何者正確？
(A) 早餐低熱量、晚餐高熱量，有利減重及代謝健康
(B) 為達減重目的，負能量平衡是必要策略
(C) 生酮飲食可在醫護人員監督下作為長期飲食介入
(D) 極低熱量飲食短期減重效果顯著，且不易復胖
38. 「飲食及運動介入減重是否能改善第 2 型糖尿病肥胖病人的血糖？」，此實證提問是屬於下列何者？
(A) 治療型問題 (B) 診斷型問題 (C) 預後型問題 (D) 病因型問題
39. 依美國醫學研究院 (IOM) 提出的可信賴臨床照護指引 (CPG) 八項準則，下列何者錯誤？
(A) 建立透明化機制、利益衝突聲明 (B) 成立發展小組、系統性文獻回顧
(C) 發展完成後，應接受外部評估 (D) 權益關係人不包含醫師及護理師
40. 針對社區長者每日補充高劑量維他命 D (> 700 IU) 是否能預防跌倒，形成一個臨床可回答的問題 (PICO)，有關 PICO 之敘述，下列何者錯誤？
(A) P (patient/problem)：成人
(B) I (intervention)：每日服用高劑量維他命 D (> 700 IU)
(C) C (comparison)：未每日服用高劑量維他命 D (> 700 IU)
(D) O (outcome)：跌倒發生率
41. 有關醫療品質成效測量指標之敘述，下列何者正確？
(A) 流程面：48 小時內非計畫性重返加護病房比率
(B) 結果面：住院病人手術死亡率
(C) 結構面：符合條件婦女接受乳房 X 光攝影篩檢之比率
(D) 結果面：門診病人平均候診時間
42. 有關醫療品質管理工具之敘述，下列何者正確？
(A) 直方圖：依問題發生頻率高低排序，適用於原因眾多而需聚焦於最重要項目時
(B) 檢查表：用來分析兩個變數的數據分布情形及之間的相關性
(C) 管制圖：針對欲了解之項目，收集其發生次數或頻率，進行資料記錄與檢核
(D) 特性要因圖：有助於識別、分類並呈現造成某特定結果之所有可能原因
43. 有關台灣病人安全通報系統 (TPR) 收集及分析的醫療異常事件項目，下列何者錯誤？
(A) 輸血事件、手術事件 (B) 公共意外事件、治安事件
(C) 院內預期心跳停止事件 (D) 管路事件
44. 根據我國「健康台灣」願景之規劃，預計於 2032 年達成之健康目標，下列何者正確？
(A) 平均餘命提升至 85 歲；不健康餘命占平均餘命之比率降至 12 %
(B) 平均餘命提升至 80 歲；不健康餘命占平均餘命之比率降至 10 %
(C) 平均餘命提升至 82 歲；不健康餘命占平均餘命之比率降至 8 %
(D) 平均餘命提升至 83 歲；不健康餘命占平均餘命之比率降至 5 %
45. 某糖尿病病人因收入不穩定、居住地交通不便且鄰近地區缺乏醫療資源，經常中斷回診。下列何者最能解釋影響其健康照護行為之因素？
(A) 個人健康動機與健康識能不足 (B) 社會健康決定因子之影響
(C) 醫療人員之溝通能力不佳造成 (D) 疾病本身之自然惡化所致

46. 根據1986年世界衛生組織渥太華憲章(Ottawa Charter)，下列何者最符合健康促進之定義？
(A) 增進人們對自身健康之控制並改善其健康的過程
(B) 透過疾病篩檢以降低特定疾病死亡率的策略
(C) 增加醫院及醫事人員醫療服務供給的政策
(D) 教導民眾遵從醫療專業人員建議的衛教方式
47. 35歲個案，未有三高疾病史，希望接受成人預防保健服務。依國民健康署114年成人預防保健升級方案，有關其接受服務之頻率，下列何者正確？
(A) 每5年1次
(B) 每3年1次
(C) 每1年1次
(D) 尚不符合服務資格
48. 一位社區高齡個案同時有糖尿病、失智症、行動不便及獨居等多重照護需求。下列何種照護安排最符合「健康台灣」整合性照護之理念？
(A) 分別安排門診，由各專科醫師個別照護
(B) 優先控制血糖，同時介入飲食與運動處置
(C) 因疾病複雜，建議直接住院觀察
(D) 個案管理，串聯社區醫療及長照資源
49. 根據代謝症候群防治計畫標準，個案腰圍與血壓均正常，健康檢查發現糖化血色素為6.1%，下列處理何者最適當？
(A) 屬糖尿病前期，可評估納入防治計畫追蹤管理
(B) 已確診糖尿病，應直接開始使用降血糖藥物
(C) 糖化血色素須達到6.5%以上，始能接受追蹤
(D) 未符合代謝症候群診斷指標，不能提供任何介入
50. 有關幽門螺旋桿菌除菌與胃癌預防之敘述，下列何者最正確？
(A) 須待發生胃潰瘍後除菌，始具預防效果
(B) 除菌後胃癌風險可立即完全降為零
(C) 人與人間不會傳染，除菌針對個案本人即可
(D) 在癌前病變前除菌，通常有較佳預防效果
51. 28歲女性，有多囊性卵巢症候群及慢性月經不規則病史，主訴最近一次月經約3個月前，並自述期間無性行為。此次因急性下腹痛至急診求治，下列何者為臨床上必須立刻執行的首要檢查？
(A) 陰道超音波檢查
(B) 尿液 β -hCG檢測
(C) 骨盆腔電腦斷層
(D) 血液黃體素濃度
52. 16歲男性，主訴昨晚出現突發性右側睪丸疼痛，身體診察發現陰囊明顯腫大，且輕托陰囊時疼痛加劇。下列何者為協助確認診斷之首選影像學檢查？
(A) 腹部X光攝影
(B) 都卜勒超音波
(C) 腹部電腦斷層
(D) 磁振造影檢查
53. 有關降低住院病人導尿管相關尿路感染之組合式照護措施，下列何者不正確？
(A) 減少不必要留置性導尿管，一旦適應症不存在應立即移除
(B) 置放導尿管前、後均應執行手部衛生
(C) 由醫師每7天評估1次是否可拔除導尿管
(D) 導尿管固定方式正確，集尿袋應維持在膀胱以下，不可置於地面

54. 有關成人呼吸窘迫之評估，下列敘述何者錯誤？
(A) 呼吸速率由30次/分降至10次/分，表示病情改善
(B) 發紺屬晚期徵象，出現時病情已相當嚴重
(C) 動用呼吸輔助肌代表呼吸功增加
(D) 三腳架姿勢有助於增加胸廓擴張
55. 有關叩診音之臨床推論，下列何者錯誤？
(A) 平坦音 (flatness) 可能為大量肋膜積液
(B) 濁音 (dullness) 可能為大葉性肺炎
(C) 鼓音 (tympany) 可能為大量氣胸
(D) 過度反響音 (hyperresonance) 為健康肺臟
56. 根據國家研究院全國性調查研究結果，中高齡族群最常見且盛行率最高之精神健康問題為下列何者？
(A) 思覺失調症 (B) 憂鬱症 (C) 失智症 (D) 酒精使用障礙症
57. 78歲獨居長者，近一個月情緒低落、食慾不振、睡眠不佳，並表示「活著沒有意思」，且停止參與原本喜愛之社區活動。下列何者為最優先之處置？
(A) 鼓勵長者多參與社區活動，以改善情緒
(B) 建議長者先自行觀察2-4週，症狀未改善再就醫
(C) 評估其自殺意念與自傷風險，並協助轉介精神醫療
(D) 告知高齡出現情緒低落屬正常老化，無須特別處理
58. 有關社區高齡者視力障礙之照護，下列何者錯誤？
(A) 青光眼多可於早期自行察覺，故可待出現症狀再就醫
(B) 糖尿病病人縱使無視力症狀，仍建議定期接受眼底檢查
(C) 視力障礙可能增加高齡者跌倒、憂鬱及失能之風險
(D) 白內障為高齡者常見且可治療之視力障礙原因之一
59. 根據 Rome IV 準則，下列何者為診斷腸躁症之必要條件？
(A) 反覆腹脹或腹部不適
(B) 反覆腹痛平均每週至少1天，持續近3個月
(C) 無痛性腹瀉持續6個月以上
(D) 大腸切片顯示黏膜淋巴球浸潤
60. 病人因急性肝炎住院，血清學檢查結果為HBsAg陰性、anti-HBs陰性、IgM anti-HBc陽性。下列何者為最合理之判讀？
(A) 已緩解之急性B型肝炎感染
(B) 接種B型肝炎疫苗後之免疫狀態
(C) 急性B型肝炎之空窗期
(D) 慢性B型肝炎帶原狀態
61. 40歲病人主訴喉部有異物感，感覺不論是否吞嚥皆持續存在，惟常於吞嚥動作後暫時緩解。有關病況之敘述，下列何者最有可能？
(A) 常見於焦慮或強迫症病人，與胃食道逆流相關
(B) 此為典型的吞嚥困難，應優先安排食道壓力測試
(C) 通常因迷走神經反射造成之唾液分泌過多所引起
(D) 通常為喉部感染所引起之吞嚥疼痛

62. 血尿病人接受尿液沉渣鏡檢，下列何項發現對「腎絲球疾病」之診斷最具意義？
(A) 鱗狀上皮細胞 (B) 透明圓柱體
(C) 白血球圓柱體 (D) 紅血球圓柱體
63. 有關攝護腺癌合併遠端轉移之敘述，下列何者正確？
(A) 骨轉移之典型病灶為溶骨性病變
(B) 最常見之遠端轉移部位為肺臟
(C) 攝護腺癌約 60–70% 源自攝護腺之移行區
(D) 若轉移至中軸骨，以腰椎最常受侵犯
64. 有關病人定向感之評估，下列何者為最早出現異常之項目？
(A) 地點 (B) 姓名
(C) 時間 (D) 計算能力
65. 75 歲病人因肺炎住院接受抗生素治療，過去曾有左側大腦中動脈梗塞病史，住院前已無明顯神經學缺損。住院第 3 天出現輕微構音障礙及右側肢體無力。腦部電腦斷層未見新的梗塞，電腦斷層血管攝影亦未見急性動脈阻塞。下列何者最能解釋此病人之臨床表現？
(A) 左側大腦中動脈供應區域出現新的血栓
(B) 新發生之出血性中風，惟電腦斷層血管攝影尚未顯示
(C) 癲癇發作後產生的麻痺症狀
(D) 全身性疾病影響使過去之神經學缺損再度顯現
66. 80 歲病人，2 天前突發右側膝關節紅、腫、熱、痛。X 光顯示膝關節軟骨呈線狀鈣化，關節液抽取檢查可見菱形結晶。此疾病與下列何種全身性疾病之關聯性最大？
(A) 副甲狀腺功能亢進 (B) 痛風
(C) 第 2 型糖尿病 (D) 乾癬
67. 病人接受右側乳癌根除術合併腋下淋巴結清除後，主訴右肩無力。請其面對牆壁，將手臂前舉並用力推牆時，右側肩胛骨內側緣明顯自後胸壁翹起。此翼狀肩胛最可能因下列何者受損所致？
(A) 腋神經 (B) 長胸神經
(C) 胸背神經 (D) 副神經
68. 根據 ATLS 第 11 版 (2025) 之外傷初級評估順序，下列何者正確？
A : airway ; B : breathing ; C : circulation ; D : disability ; E : exposure ;
x : eXsanguination ; M : mechanism ; I : injuries/information ;
S : signs and symptoms ; T : treatment
(A) ABCDE (B) xABCDE
(C) MIST (D) ABCDEMIST
69. 58 歲第 2 型糖尿病病人，eGFR 為 96 mL/min/1.73 m²，尿液常規檢查未見明顯蛋白尿，但 UACR 為 85 mg/g。下列敘述何者最適當？
(A) 腎功能正常，因此可排除慢性腎臟病
(B) 符合 CKD 第 1 期的腎臟損傷表現，應納入持續照護
(C) UPCR 須達 1000 mg/g 以上，始能診斷慢性腎臟病
(D) eGFR 高於 60 mL/min/1.73 m²，因此無須追蹤腎功能

70. 68 歲病人因左腳疼痛已持續 1 週，且行走時呈跛行而就醫。下列敘述何者正確？
(A) 若左足背動脈脈動微弱，且踝臂指數 (ABI) 大於 0.9，為左下肢動脈阻塞之典型表現
(B) 若腳痛侷限於左小腿，則為神經根病變之典型表現
(C) 若左小腿出現腫脹與水腫，可能為深部靜脈栓塞
(D) 間歇性跛行係指休息時出現腳痛，行走後可獲改善
71. 現行臺灣急診檢傷與急迫度分級量表 (TTAS) 將急診病人分為幾個等級？
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
72. 病人因呼吸不適 1 週前來就醫，下列敘述何者正確？
(A) 心臟超音波顯示左心室射出分率為 65%，即可排除心臟衰竭
(B) 無胸痛或胸悶，即可排除冠狀動脈疾病
(C) 主訴近日時常咳出濃痰，則大幅提升心臟衰竭之可能性
(D) 出現呼吸震顫增強與叩診濁音，可能為大葉性肺炎
73. 有關心肌炎之敘述，下列何者正確？
① 大部分是細菌感染引起，所以必須及時使用廣效性抗生素
② 大部分病人的病情會進展至心臟衰竭狀態
③ 心電圖可能出現 ST 節段上升情形
④ 可能併發急性腎衰竭情形
(A) ①② (B) ③④ (C) ①③ (D) ②④
74. 57 歲病人因右上腹持續疼痛 3 天就醫，下列敘述何者正確？
(A) Murphy sign 陽性，表示有膽管炎
(B) 發燒、右上腹痛與黃疸，為膽囊炎之典型表現
(C) 急性胰臟炎最常見之病因為膽固醇過高
(D) 若有總膽管結石，可能出現灰白色糞便
75. 有關急性闌尾炎身體診察徵象之敘述，下列何者正確？
(A) McBurney point 位於劍突與右側髂前上棘連線之中外三分之一交界處
(B) Rovsing sign 係指按壓右下腹時，病人出現左下腹疼痛
(C) psoas sign 係指固定病人左膝後請其抬起左大腿，引發腹痛加劇
(D) obturator sign 係指病人右髖與膝關節屈曲後，將右大腿內旋，引發腹痛加劇
76. 有關甲狀腺功能低下之敘述，下列何者正確？
(A) 因腸道蠕動加快，常出現腹瀉症狀
(B) 因代謝率上升，常有心悸與怕熱之表現
(C) 原發性者血中 T4 濃度降低，TSH 濃度上升
(D) 血中游離 T4 與 TSH 濃度均上升
77. 有關嗜鉻細胞瘤之敘述，下列何者正確？
① 典型症狀為頭痛、大量出汗與心悸
② 主要生長於腎上腺髓質，並分泌 bradykinin
③ 常引起高血壓，以藥物治療即可獲得良好控制
④ 收集 24 小時尿液定量分析香莢杏仁酸 (VMA)，為診斷方法之一
(A) ①③ (B) ②④ (C) ①④ (D) ②③

78. 有關頸部淋巴結腫大之敘述，下列何者正確？
(A) 感染所致者於感染痊癒後，多會逐漸縮小恢復
(B) 癌症所致者質地柔軟可移動，且多伴明顯壓痛
(C) Virchow's node 位於右側鎖骨下窩，與肺癌轉移有關
(D) 位於胸鎖乳突肌後方之腫大，一般以良性病灶居多
79. 有關外傷初級評估之優先原則，下列何者正確？
(A) 檢查並暢通呼吸道
(B) 確認病人之呼吸狀態
(C) 處理對生命最大威脅之傷害
(D) 建立周邊靜脈通路
80. 在計算成人燒燙傷急救輸液量時，其一度36%(含會陰1%)、二度20%、三度14%，採計之燒燙傷體表面積(TBSA)應為多少？
(A) 34% (B) 35% (C) 70% (D) 71%

【以下空白】

公告試題

僅供參考