

10 年來死亡年齡中位數增長 4 歲

99 年國人死亡者平均年齡為 70.3 歲，較上年增加 0.7 歲，亦較 89 年增加 4.5 歲；死亡年齡中位數為 75.0 歲；其中男性 73 歲，女性 78 歲，不管全體國人、男性或女性均較 89 年增加 4 歲。

國人十大死因死亡年齡中位數比較

單位：歲

| | 99 年 (A) | | | 89 年 (B) | | | 增減歲數 (A-B) | | |
|--------------|----------|----|----|----------|----|----|------------|---|----|
| | 全體 | 男 | 女 | 全體 | 男 | 女 | 全體 | 男 | 女 |
| 所有死亡原因 | 75 | 73 | 78 | 71 | 69 | 74 | 4 | 4 | 4 |
| 惡性腫瘤 | 69 | 69 | 70 | 68 | 68 | 67 | 1 | 1 | 3 |
| 心臟疾病 | 78 | 75 | 81 | 75 | 73 | 79 | 3 | 2 | 2 |
| 腦血管疾病 | 78 | 76 | 80 | 74 | 73 | 77 | 4 | 3 | 3 |
| 肺炎 | 82 | 81 | 84 | 79 | 77 | 82 | 3 | 4 | 2 |
| 糖尿病 | 76 | 73 | 78 | 72 | 71 | 74 | 4 | 2 | 4 |
| 事故傷害 | 54 | 51 | 62 | 45 | 44 | 49 | 9 | 7 | 13 |
| 慢性下呼吸道疾病 | 82 | 82 | 84 | 78 | 77 | 80 | 4 | 5 | 4 |
| 慢性肝病及肝硬化 | 58 | 54 | 72 | 58 | 52 | 69 | 0 | 2 | 3 |
| 高血壓性疾病 | 80 | 78 | 82 | 78 | 75 | 81 | 2 | 3 | 1 |
| 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 78 | 77 | 79 | 75 | 75 | 76 | 3 | 2 | 3 |

就男性而言，十大主要死因中有心臟疾病、腦血管疾病、肺炎、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病與腎炎、腎徵候群及腎性病變等 6 類死因死亡年齡中位數高於全國男性之平均值 73 歲，主要係該等死因多與慢性疾病有關，故死亡者平均年齡亦較高。另就女性觀察，其十大主要死因高於全國女性之平均值者與男性相同死因。

近年來，各主要死因中死亡年齡中位數皆呈增勢，其中又以事故傷害增加最為明顯，男性延長 9 歲，女性延長 13 歲，此與事故傷害長期防治成效顯著，及青少年事故傷害死亡降低有關。