


99 年男性標準化死亡率較 10 年前下降 1 成

99 年兩性死亡人數與標準化死亡率，均呈現男高於女之現象，其倍數比男性約為女性的 1.6 倍左右。

99 年男性死亡人數為 88,374 人，標準化死亡率為每十萬人口 576.2 人，較上年減少 1.8%；較 89 年則減少 16.3%。

99 年男性十大主要死因順位內容與上年相較，除第 4、5 順位之肺炎、事故傷害對調，原排名第 12 之高血壓性疾病列入第 10 位，原排名第 10 之腎炎腎病症候群及腎病數列入第 11 位外，餘均相同。



附 註：1.第一象限內各點表該死因不論成長率或占有率均在增加，其距離原點愈遠其影響力愈大。

2.第三象限表該死因不論成長率或占有率均在減少，其影響程度呈現萎縮。

3.各死因後括號()內數字係死因順位排名。


99 年男性十大主要死因分別為(1)惡性腫瘤占 29.4%；(2)心臟疾病占 10.6%；(3)腦血管疾病占 6.7%；(4)肺炎占 6.3%；(5)事故傷害占 5.5%；(6)糖尿病占 4.6%；(7)慢性下呼吸道疾病占 4.3%；(8)慢性肝病及肝硬化占 4.0%；(9)自殺占 3.0%；(10)高血壓性疾病占 2.4%。

99 年男性十大主要死因中，標準化死亡率與占有率均較上年增加者有肺炎、心臟疾病及高血壓性疾病，此三類死因影響程度皆呈擴張；標準化死亡率與占有率均較上年減少者有事故傷害、腦血管疾病、糖尿病、自殺與慢性肝病及肝硬化，此五類死因影響程度皆呈壓縮。

女性標準化死亡率較 10 年前下降 2 成 4

99 年女性死亡人數為 56,335 人，標準化死亡率為每十萬人口 339.9 人，較上年減少 3.0%；較 89 年則減少 23.5%。

99 年女性十大主要死因順位依序分別為：(1)惡性腫瘤占 26.7%；(2)心臟疾病占 11.2%；(3)腦血管疾病占 7.4%；(4) 糖尿病占 7.4%；(5) 肺炎占 5.9%；(6) 高血壓性疾病占 3.6%；(7) 腎炎、腎病症候群及腎病變占 3.6%；(8) 事故傷害占 3.3%；(9) 敗血症占 3.1%；(10) 慢性肝病及肝硬化占 2.5%。



附 註：1.第一象限內各點表該死因不論成長率或占有率均在增加，其距離原點愈遠其影響力愈大。
2.第三象限表該死因不論成長率或占有率均在減少，其影響程度呈現萎縮。
3.各死因後括號()內數字係死因順位排名。

99 年女性十大主要死因中，標準化死亡率與占有率均較上年增加者有高血壓性疾病、肺炎、腎炎腎病症候群及腎病變、敗血症，此四類死因影響程度皆呈擴張；標準化死亡率與占有率均較上年減少者有事故傷害、腦血管疾病、糖尿病、慢性肝病及肝硬化，此四類死因影響程度皆呈壓縮。