



衛生福利部

103 年內(外)科專科護理師甄審筆試

准考證號碼：
(請考生自行填寫)

進階專科護理 內科(精神科組)

【注意事項】


- 1.請核對考試科目與報考類(組)別是否相符。
- 2.請檢查答案卡、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
- 3.本試卷共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答錯不倒扣。
- 4.本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 2B 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
- 5.本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
- 6.請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試卷」一併繳回。
- 7.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。

- 下列何者是最常見的 nosocomial infection ?
(A) Urinary tract infection (B) Pneumonia
(C) Wound infection (D) Catheter related infection
- 下列哪些是院內 urinary tract infection (UTI)的常見菌種 ?
① *Enterococci* ② *Staphylococcus aureus* ③ *Candida* ④ *Clostridium botulinum*
(A) ① ② (B) ① ③ (C) ② ③ (D) ② ④
- 56 歲女性因陳舊性腦中風住在安養中心，長期放置導尿管，機構人員於例行性尿液檢查發現有白血球及細菌，但無發燒及泌尿道感染症狀，請問下列處置何者為最適當 ?
(A) 立即給予口服抗生素治療
(B) 立即送至急診室做進一步診治
(C) 送尿液細菌培養，若陽性則給予靜脈抗生素治療
(D) 可先行觀察，若有發燒或泌尿道感染症狀再處理
- 依傳染病防治法規定，病人經診斷為狂犬病，應於多少時間內通報主管機關 ?
(A) 24 小時內 (B) 3 天內 (C) 1 週內 (D) 1 個月內
- 關於氣喘藥物治療原則，下列描述何者最適當 ?
(A) 不宜長期使用吸入型類固醇，以免產生副作用
(B) 持續常規性使用短效型、吸入性乙二型交感神經興奮劑以緩解症狀
(C) 嚴重氣喘宜單獨使用白三烯酸藥物，以避免類固醇副作用
(D) 持續合併使用長效型、吸入性乙二型交感神經興奮劑和吸入型類固醇，以控制氣喘
- 下列何種止痛藥物較不適用於急性膽囊炎患者 ?
(A) ketoprofen (B) morphine sulfate (C) meperidine (D) indomethacin
- 女星安潔莉娜接受預防性切除雙側乳房，是由於考量哪一個致癌基因有關 ?
(A) BRCA1/BRCA2 變異 (mutation) (B) EGFR 變異 (mutation)
(C) K-RAS 變異 (mutation) (D) HER-2/neu 過度表現 (over-expression)
- 有關腫瘤引起的脊椎壓迫症，下列敘述何者錯誤 ?
(A) 脊椎 X ray 檢查是必要的，磁振造影亦為確定診斷的重要檢查
(B) 好發於肺癌、乳癌、攝護腺癌及淋巴癌
(C) 臨床疑似，但尚未經由磁振造影檢查確定前，不應給予類固醇治療
(D) 可手術治療者，應優先選擇手術治療
- 與癌症相關的病原，下列何者已有疫苗用以預防與其相關之癌症 ?
(A) Hepatitis C virus (C 型肝炎病毒)
(B) Human papillomavirus (人類乳突病毒)
(C) Varicella-zoster virus (水痘病毒)
(D) *Helicobacter pylori* (幽門螺旋桿菌)
- 有關癌症 TNM 分期，下列敘述何者正確 ?
(A) T 代表腫瘤大小，T1~T4 代表第 I 期到第 IV 期的癌症
(B) N 代表淋巴結侵犯，N0 指沒有淋巴結侵犯，N1~N3 數字愈高代表淋巴結侵犯程度愈嚴重(數目或區域等)
(C) M 代表轉移，M0 指沒有轉移，M1、M2...等數字愈高轉移愈遠或愈多處
(D) 適用於各種癌症，包括造血幹細胞惡性腫瘤(例如白血病)

11. 鴉片類止痛藥物 meperidine (Demerol[®])的代謝產物 normeperidine 會引發下列何項無法以 naloxone 回復的副作用？
 (A) 氣喘 (B) 抽搐 (C) 黃疸 (D) 呼吸抑制
12. 造成癌症末期病人常有便秘問題的可能原因不包括下列何者？
 (A) 癌症分泌荷爾蒙或癌症骨轉移相關的高血鈣症
 (B) 使用鴉片類藥物止痛
 (C) 腎功能不佳所致的高血鉀症
 (D) 因重病，身體活動度及進食受限
13. 李小姐至門診就醫，血壓為 94/68 mmHg、心跳 118 次/分、呼吸 17 次/分，心電圖如下，李小姐最可能是何種心率異常？



- (A) 心室心搏過速 (ventricular tachycardia) (B) 心房顫動 (atrial fibrillation)
 (C) 心房心搏過速 (atrial tachycardia) (D) 心房撲動 (atrial flutter)
14. 李先平日健康良好，深夜被家屬發現昏迷而送至急診室，體溫 36.7 °C，心跳 70 次/分，呼吸 12 次/分，血壓 120/80 mmHg，呼吸音正常無喘鳴或囉音，在 room air 狀況下所抽的動脈血氣體分析呈現 pH 7.20、PaCO₂ 85 mmHg、PaO₂ 40 mmHg、HCO₃⁻ 25 mEq/L、SaO₂ 70%。下列何者最可能是造成李先生低血氧的原因？
 (A) 支氣管氣喘急性惡化 (B) 急性呼吸窘迫症候群
 (C) 一氧化碳中毒 (D) 服用過量鎮靜安眠藥
15. 王同學 18 歲，自 12 歲起即常有頭痛，體檢時發現其血壓介於 148/88~176/114 mmHg，聽診肚臍右側腹部有血管嘈音，家人無高血壓病史，造成王同學血壓偏高的最可能原因為何？
 (A) 嗜鉻細胞瘤 (pheochromocytoma) (B) 腎上腺腫瘤 (adrenal adenoma)
 (C) 腎上腺增生 (adrenal hyperplasia) (D) 腎動脈狹窄 (renal artery stenosis)
16. 在胸部身體檢查時發現病人的右胸呼吸聲減弱、叩診 dullness、觸診 tactile fremitus 減弱，檢查結果最符合下列哪種疾病？
 (A) emphysema (B) pneumonia
 (C) pneumothorax (D) pleural effusion
17. 下列四個圖形中，哪一個最可能是氣喘急性發作病人的 flow - volume curve？



18. 下列何者不是慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 合併呼吸衰竭病人使用非侵入性正壓呼吸器 (non-invasive positive-pressure ventilation) 的禁忌症？
(A) 血行動力不穩定 (B) 神智昏迷或無法合作
(C) 高二氧化碳血症(PaCO₂ > 45 mmHg) (D) 大量痰液或不易清除痰液
19. 下列何者較不會導致低血鈣 (hypocalcemia) ？
(A) 急性胰臟炎 (acute pancreatitis) (B) 服用利尿劑 (thiazide)
(C) 副甲狀腺低下症 (hypoparathyroidism) (D) 慢性腎衰竭 (chronic renal failure)
20. 當肺炎病人的 sputum culture 培養出下列何種病原體時較能確診是由該病原體所引起的肺炎？
(A) *Staphylococcus epidermis* (B) Non-tuberculosis mycobacterium
(C) *Mycobacterium tuberculosis* (D) *Candida albicans*
21. 嚴重急性壞死性胰臟炎病人，理學檢查發現腰部呈現紅藍紫或綠棕色，此為何種徵象？
(A) 克尼格氏徵象 (Kernig's sign) (B) 寇倫氏徵象 (Cullen's sign)
(C) 特納氏徵象 (Turner's sign) (D) 霍曼斯氏徵象 (Homan's sign)
22. 李小姐主訴右上腹部疼痛，下列何者是墨菲氏徵象 (Murphy's sign) 的描述？
(A) 檢查者以手指壓迫病人腹部左下象限，會引起病人右下象限腹部疼痛
(B) 檢查者以右手手指於病人右肋骨緣下方與腹直肌右側緣交接點作深觸診，手指下壓後請病人深吸氣，此時病人因疼痛加劇而停止吸氣
(C) 請病人採趴蹲的姿勢，檢查者將聽診器的膜面置放在病人腹部最下垂處，再以手指輕彈腹部的側方，仔細聆聽聽診器傳來的聲音
(D) 請病人平躺，由腹部中央朝向周圍叩診，畫出濁音與鼓音的分界線，請病人側躺，再次叩診畫出濁音與鼓音的分界線
23. 下列何種肝炎病毒必須有其他肝炎病毒感染後才能入侵人體？
(A) HAV (B) HBV (C) HCV (D) HDV
24. 王先生懷疑是肝炎發作，其肝炎病毒血清標誌檢查報告如下：
Anti-HAV IgG positive；Anti-HAV IgM negative；HBsAg positive；Anti-HBc IgM positive；
HBeAg positive；Anti-HBs Ab negative；Anti-HCV Ab negative。下列何者是最可能的診斷？
(A) 急性 A 型肝炎 (B) 慢性 B 型肝炎 (C) 急性 B 型肝炎 (D) 慢性 C 型肝炎
25. 部份胃切除手術後的病人發生傾倒症候群 (dumping syndrome) 之描述，下列何者錯誤？
(A) 早期傾倒症候群通常發生在餐後 15 - 30 分鐘；晚期傾倒症候群通常發生在餐後 90 - 180 分鐘
(B) 早期傾倒症候群是胃內高滲透壓物質快速進入小腸，導致體液由血液循環系統移入腸道內，產生血漿容量減縮及急性腸道膨脹所致
(C) 晚期傾倒症候群是胰島素過度分泌造成續發性低血糖所引起的症狀
(D) 為減少傾倒症候群，宜使用富含碳水化合物的飲食
26. 遠端迴腸 (distal ileum) 切除後，最快及最容易造成下列何種維生素或礦物質缺乏？
(A) 維生素 B₁₂ (B) 鐵 (C) 鈣 (D) 葉酸

27. 吳先生使用呼吸器，放置中央靜脈導管與鼻胃管，發生呼吸困難，其胸部 X 光如下，應最優先執行下列何項處置？

- (A) 插上胸管
- (B) 更換強效抗生素使用
- (C) 安排胸部電腦斷層確認病因
- (D) 調高呼吸器給氣壓力以改善呼吸困難



28. 關於胃食道逆流的描述，下列何者錯誤？

- (A) 典型症狀是火燒心（亦稱為胸口灼熱感）及逆流，但也有可能會出現吞嚥困難及胸痛
- (B) 除了典型食道症狀外，尚可能發生咳嗽、喉炎、牙齒腐蝕、鼻竇炎、肺纖維化、反覆中耳炎等食道外症狀
- (C) 胃食道逆流的胸痛，通常不會放射到背部、手臂或下巴，故一定可以和缺血性心臟病所引起的胸痛做出明確區別
- (D) 使用質子幫浦抑制劑（proton pump inhibitor）後症狀改善可作為診斷標準之一

29. 陳先生因持續二至三天噁心、嘔吐、食慾不振到院求診。其生化檢驗報告 Na^+ 132 mmol/L， K^+ 5.1 mmol/L， Cl^- 104 mmol/L，BUN 24 mg/dL，Cr 1.2 mg/dL，Glu 78 mg/dL，Alb 3.5 gm/dL。動脈血氧分析 pH 7.30， PaCO_2 30 mmHg， HCO_3^- 16 mEq/L， PaO_2 93 mmHg。根據上述為下列何種狀況？

- (A) 代謝性酸中毒
- (B) 呼吸性酸中毒
- (C) 代謝性酸中毒合併呼吸性酸中毒
- (D) 呼吸性酸中毒合併代謝性鹼中毒

30. 發生高血鉀症時，下列何項處置可以有效排出體內的鉀離子？

- (A) IV infusion 20U regular insulin combined with 50g glucose
- (B) IV infusion calcium gluconate
- (C) oral sodium polystyrene sulfonate
- (D) oral adenosine

31. 治療細菌性肺炎前進行痰液培養，所收集到的「痰液檢體」符合下列哪一描述條件時，為較適當的檢體？（單位為 cells per low-power field）

- (A) > 25 neutrophils and > 10 squamous epithelial cells
- (B) > 25 neutrophils and < 10 squamous epithelial cells
- (C) < 25 neutrophils and > 10 squamous epithelial cells
- (D) < 25 neutrophils and < 10 squamous epithelial cells

32. 下列何者是叢集性頭痛（cluster headache）臨床表徵的描述？

- (A) 頭痛是緩慢發生的，程度會有所波動，可能是間斷的或持續很長時間，放鬆可以緩解
- (B) 中到重度的頭痛，搏動性，單側，每次持續 4-72 小時，伴隨噁心或嘔吐，畏光和畏聲
- (C) 劇烈頭痛，五分鐘內達到高峰，非搏動性，單側，持續 30 分鐘至 2 小時，伴隨同側流淚、眼紅、鼻塞、噁心
- (D) 急性劇烈頭痛，伴隨頸部僵硬、畏光、噁心、嘔吐和發燒

33. 下列抗憂鬱劑作用機轉之分類何者錯誤？
- (A) fluoxetine (Prozac[®])為選擇性血清素再吸收抑制劑 (SSRI)
 - (B) venlafaxine (Efexor[®])為去甲基腎上腺素及多巴胺再吸收抑制劑 (NDRI)
 - (C) mirtazapine (Remeron[®])為去甲基腎上腺素及血清素調整劑 (NaSSA)
 - (D) duloxetine (Cymbalta[®])為血清素及去甲基腎上腺素再吸收抑制劑 (SNRI)
34. 下列何者不是美國食品藥物署 (USA FDA) 核准使用選擇性血清素再吸收抑制劑 (SSRI) 之適應症？
- (A) 憂鬱症
 - (B) 強迫症
 - (C) 社交畏懼症
 - (D) 酒精戒斷症候群
35. 下列哪一項抗憂鬱劑可以使用於治療菸癮？
- (A) bupropion (Wellbutrin[®])
 - (B) fluoxetine (Prozac[®])
 - (C) sertraline (Zoloft[®])
 - (D) mirtazapine (Remeron[®])
36. 李先生為慢性肝硬化病患，近日焦慮失眠增加，如考慮使用 Benzodiazepine 來治療，下列何種藥物較適合？
- (A) flurazepam (Dalmadorm[®])
 - (B) lorazepam (Ativan[®])
 - (C) zolpidem (Stilnox[®])
 - (D) clonazepam (Rivotril[®])
37. 25 歲的王小姐被發現昏迷，但生命徵象正常。您可以使用下列哪項藥物來確認王小姐的昏迷是與 Benzodiazepine 的使用過量有關？
- (A) naloxone (Naloxone[®])
 - (B) biperiden (Akineton[®])
 - (C) acetylcysteine (Acet[®])
 - (D) flumazenil(Anexate[®])
38. 第二代抗精神病劑 (second generation antipsychotic drug) 較會引起代謝症候群，下列何者不是代謝症候群的指標？
- (A) 低密度脂蛋白 (LDL) 過高
 - (B) 高密度脂蛋白 (HDL) 過低
 - (C) 三酸甘油酯 (TG) 過高
 - (D) 空腹血糖過高
39. 關於 valproate (Depakine[®]) 治療躁症時，下列哪一項副作用較可能出現？
- (A) 肝臟酵素指數 (GOT / GPT) 下降
 - (B) 顆粒白血球增加
 - (C) 血氨濃度增高 (hyperammonia)
 - (D) 體重減輕
40. 針對 lamotrigine (Lamictal[®]) 所引起的皮膚過敏反應，下列敘述何者不正確？
- (A) 最常出現的皮膚過敏反應為嚴重的 Stevens-Johnson Syndrome
 - (B) 在兒童青少年更易出現皮膚過敏反應
 - (C) 以較低的劑量開始使用，會降低皮膚過敏反應的發生
 - (D) 減緩增加劑量的速度，會降低皮膚過敏反應的發生
41. 李小姐，27 歲，罹患精神分裂症，於接受 risperidone (Risperdal[®]) 治療後病情穩定，但她抱怨月經已經數個月沒有來，她很擔心這個情況。下列敘述何者較不適當？
- (A) 血液中的泌乳激素 (prolactin) 可能會上升
 - (B) 這和 risperidone 引發多巴胺阻斷有關
 - (C) 可以使用多巴胺促進劑如 bromocriptine 來處理改善
 - (D) 改換 paliperidone 可以有效減少 amenorrhea 的副作用

42. 關於 clozapine (Clozaril[®]) 的描述，下列何者較不適當？
(A) 較不易引發 EPS (extrapyramidal symptoms) 等副作用
(B) 需定期抽血檢查，以監測顆粒白血球下降之副作用
(C) 遇到嚴重不易治療的個案，可以和 carbamazepine (Tegretol[®]) 併用，以加強其效果
(D) 心肌炎是可能會致死的副作用
43. 鍾先生，60 歲，因長期失眠而使用 zolpidem (Stilnox[®]) 10 mg 約十年，近幾個月因失眠症狀嚴重，而自行增加 zolpidem 劑量，甚至高到一天 50 mg 的情形，請問下列敘述何者錯誤？
(A) 要考慮 zolpidem 藥物依賴的問題
(B) 戒除 zolpidem 時要先使用短效型的鎮靜安眠藥來取代，例如 alprazolam (Xanax[®])，再逐步減藥
(C) 可併用 carbamazepine (Tegretol[®]) 以預防抽搐等戒斷症候群之發生
(D) 要使用健保藥歷查詢介面，避免病人到其他醫院去拿類似藥物，而增加其依賴性
44. 關於不同類型抗憂鬱劑副作用的描述，下列何者錯誤？
(A) 三環類 (TCA) 抗憂鬱劑的副作用主要為抗乙醯膽鹼副作用，老年人較無法忍受
(B) 血清素再回收抑制劑 (SSRI) 的性功能障礙副作用較三環類抗憂鬱劑顯著
(C) 除了三環類抗憂鬱劑以外，其他類型的抗憂鬱劑都不需要監測血壓
(D) mirtazapine (Remeron[®]) 主要副作用為嗜睡、口乾，及食慾增加
45. 下列何者不是鋰鹽中毒後常見的徵候 (sign) ？
(A) 步伐共濟失調 (gait ataxia) (B) 口齒不清 (dysarthria)
(C) 大量腹瀉 (profuse diarrhea) (D) 手部細動作的顫抖 (fine tremor)
46. 關於慢性情感性精神疾病患者長期服用鋰鹽，下列敘述何者錯誤？
(A) 鋰鹽濃度維持在 0.6-1.0 mmol/L 比較有預防效果
(B) 腎功能及甲狀腺功能應定期監測
(C) 要衛教病人大量喝水，以避免鋰鹽中毒
(D) 若有併用利尿劑，要特別注意鋰鹽中毒的可能性
47. 關於抗精神病藥物惡性症候群 (neuroleptic malignant syndrome)，下列敘述何者錯誤？
(A) 使用 haloperidol 發生的比率較 risperidone 為高
(B) 臨床症狀為全身僵硬、意識障礙、發燒
(C) 最常使用的藥物治療有 dantrolene 和 bromocriptine
(D) 實驗室檢查最重要的是白血球數目增多及 CK-MB 的升高
48. 甲先生 30 歲為精神分裂症患者，過去以 risperidone 4 mg / day 治療可使其精神病症狀穩定，但近日甲先生被害妄想加劇、躲在家中不肯外出、同時將家人納入系統化妄想，由家人協助後住院治療。住院後藥物調整為 risperidone 6 mg / day，此時甲先生出現不停踱步、來回走動、坐立不安，請問最可能的原因為何？
(A) 靜坐不能 (akathisia) (B) 肌肉緊張異常 (dystonia)
(C) 巴金森氏症 (Parkinsonism) (D) 遲發性不自主運動 (tardive dyskinesia)

49. 關於失眠症狀的治療和處置，下列敘述何者正確？
(A) 如果是身體症狀引起的失眠，只要處理身體症狀即可，不需處理失眠問題
(B) 只要有失眠症狀，病人又希望能服用藥物幫忙睡眠，就可以開立安眠藥
(C) 大部分的失眠症狀，是屬於原發性睡眠障礙，需要安眠藥的幫忙
(D) 病患若有焦慮症狀，日間使用輕微的抗焦慮藥物，也可以減緩晚上的失眠症
50. 下列何者非 benzodiazepine 之常見藥理功能？
(A) 抗焦慮 (B) 抗痙攣 (C) 降低食慾 (D) 肌肉鬆弛
51. 關於精神科藥物所致的血液系統副作用，下列描述何者正確？
(A) SSRI 抗憂鬱劑常會使紅血球過度增生
(B) benzodiazepine 常會抑制血小板的凝血功能
(C) clozapine 會造成顆粒性白血球缺乏症
(D) lithium 會造成嗜伊紅性白血球缺乏症
52. 當服用第二代抗精神病藥物的病人出現強迫症狀時，下列處置何者最適當？
(A) 可以使用 SSRI 抗憂鬱劑治療 (B) 可以使用鋰鹽治療
(C) 可以使用抗痙攣藥治療 (D) 應該立即停藥
53. 一位老年個案就診時，主訴近一個月失眠，要求醫師開安眠藥協助入睡。以下處置何者最不正確？
(A) 應該先詳細評估是否有身體因素或人際因素造成失眠
(B) 老年人使用低劑量 benzodiazepine 不會造成失智的表現，所以可以開給病人服用
(C) 精神因素（如憂鬱）通常是造成老年人失眠的主要原因，最好能評估其壓力來源
(D) 應該建議老年人多運動以及多曬太陽
54. 王先生，66 歲，過去健康情況良好，20 年前喪偶，半年前發生骨折，恢復後心情卻逐漸低落，近一個月來失眠漸漸嚴重，食慾不振，行動緩慢，終日不出門，體重減輕 7 公斤，並有自殺意念，故住院接受治療，診斷為晚發型憂鬱症。以下敘述何者最正確？
(A) 和早發型憂鬱症的老人相比，晚發型的老人比較少有憂鬱症家族史
(B) 若個案吃得很少，為了協助盡快恢復，應強制餵食並補充點滴，以避免生命危險
(C) 晚發型憂鬱症不會是腦血管病變所造成的
(D) 雖然病情嚴重，拒絕進食，終日沈默臥床，但因年紀大仍不可以考慮做電痙攣治療 (electroconvulsive therapy ; ECT)
55. 李先生，78 歲，因為尿道感染發燒而住院治療。住院當天晚上出現急性意識不清、視幻覺、躁不安等現象。下列描述和處置原則何者較不適當？
(A) 李先生極有可能出現譫妄 (delirium) (B) 立即安排電腦斷層檢查
(C) 可以使用 haloperidol 治療視幻覺 (D) 譫妄常發生於老年人
56. 張先生，38 歲，於 25 歲時開始被診斷為精神分裂病，過去有二次住院的紀錄，持續在精神科門診接受追蹤治療。最近無明顯的幻覺或妄想症狀；但衛生習慣相當不好，經常不洗澡，也不修邊幅，生活型態日夜顛倒。父母與家人經常批評指責他的行為，所以常發生爭執造成不愉快。晚上因不願意洗澡而與父母親發生衝突，出現情緒激動及破壞物品，家人將他送到急診要求緊急的處理。以下處理何者最適當？
(A) 對個案給予長效針劑
(B) 給予個案以及家屬精神衛生教育
(C) 將病人強制住院，以保安全
(D) 立刻將口服精神病藥物的劑量調至建議劑量的最大值

57. 根據 DSM-IV-TR 精神疾病診斷準則，心因性厭食症 (anorexia nervosa) 的診斷標準之一為病患拒絕維持標準體重，並使體重下降導致低於預期體重的百分之幾以下？
(A) 60% (B) 75% (C) 85% (D) 90%
58. 王先生在一場大地震發生後三天從坍塌的瓦礫堆中被救出。事隔一週後，王先生來到精神科門診求助。他提到即便事發已經一星期，他仍然感到心有餘悸，整天無法放鬆，只要有風吹草動就會驚駭萬分，害怕到拔腿就跑，無法安睡，因為只要一闔眼就會浮現天花板垮下來的畫面，即便勉強睡著也是惡夢連連。王先生現在的狀況最適合用以下哪種臨床診斷來描述？
(A) 急性壓力症候群 (acute stress disorder)
(B) 創傷後壓力症候群 (post-traumatic stress disorder)
(C) 解離性失憶症 (dissociative amnesia)
(D) 強迫症 (obsessive-compulsive disorder)
59. 根據 DSM-IV-TR 精神疾病診斷準則，下列何者不是重鬱發作時的「憂鬱病性特質」 (melancholic features specifier) 的症狀？
(A) 憂鬱心情在早晨特別嚴重 (B) 顯著的精神運動性遲滯
(C) 顯著缺乏食慾或體重下降 (D) 鉛樣癱瘓 (leaden paralysis)
60. 對特殊人格特質者之面談技巧，下列描述何者最不正確？
(A) 對於強迫型 (obsessive ; controlling) 病人，醫療人員應有系統且仔細地詳加說明
(B) 對於自戀型 (superior , narcissistic) 病人，醫療人員除了需對自己的能力有信心外，也可以稱讚病人的成就，以滿足他的一部份心理需求
(C) 對於歇斯底里型 (histrionic) 病人，醫療人員應該詳細提供醫療資訊以及相關的醫學數據
(D) 對於依賴型 (dependent) 病人，醫療人員可以考慮滿足病人部分要求，假如需對病人設限，要婉轉地向病人解釋設限之緣由
61. 關於變異性症 (transsexualism) 之敘述，下列何者最適當？
(A) 心理治療通常即可有效改變原發性變異性症的症狀
(B) 變異性症通常要到青春期後才會發生
(C) 變性手術僅限於原發性變異性症，故需先排除內分泌、精神病、重大壓力等因素造成的次發性變異性症
(D) 變異性症患者愛好異性打扮，目的是尋求性興奮
62. 診斷阿茲海默失智症 (dementia of the Alzheimer's type) 首先需排除以下中樞神經系統及全身系統性狀況，下列何者無法以電腦斷層 (CT) 或核磁共振檢查 (MRI) 確立診斷？
(A) 硬腦膜下血腫 (B) 神經性梅毒症 (C) 腦腫瘤 (D) 腦血管疾病
63. 下列何種診斷不屬於 DSM-IV 中的情感性疾患 (mood disorders) ？
(A) 重鬱症，重覆發作 (major depressive disorder , recurrent)
(B) 低落性情感疾患 (dysthymic disorder)
(C) 第一型雙極性疾患 (bipolar I disorder)
(D) 分裂情感性疾患 (schizoaffective disorder)

64. 關於妄想症 (delusional disorder) 的敘述，下列何者為非？
(A) 妄想症狀持續最少一個月以上，其存在是相當個人性而非屬於次文化的一部分
(B) 較常見的妄想症類型為被害型妄想
(C) 妄想症病人也可能會合併憂鬱症狀
(D) 妄想症病人通常有思考流程障礙
65. 關於精神分裂症，下列描述何者錯誤？
(A) 發病年齡越早，預後越好
(B) 精神分裂症之正性症狀的發生可能與多巴胺過多有關
(C) 約有一半的病人一生中曾有出現自殺行為
(D) 發病期間要大於六個月方符合診斷標準
66. 注意力缺損合併過動疾患 (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD) 與其他疾病共病的機率相當高，最常見的是何種疾患？
(A) 憂鬱症 (depressive disorder)
(B) 雙極性疾患 (bipolar disorder)
(C) 對立性反抗疾患 (oppositional defiant disorder)
(D) 焦慮症 (anxiety disorder)
67. 一位男性廚師兩年前開始出現反覆檢查水龍頭及馬桶是否漏水，又時常盯著指縫，看是否有指垢，每天為此耗去大量時間。半年後出現在家要用油煎雙手的重複念頭，因而怕見油鍋，家人勸其就醫，其卻不予理會。近一個月聲稱聽見對面大樓有一女子向他表示情愛，但過幾天又稱那女子罵他流氓，要叫人來教訓他，為此惶惶不安，有時喃喃自語，故由家屬陪來就診。該病患目前最可能的診斷是：
(A) 廣泛性焦慮症 (generalized anxiety disorder)
(B) 雙極性疾患 (bipolar disorders)
(C) 強迫症 (obsessive-compulsive disorder)
(D) 精神分裂症 (schizophrenia)
68. 專科護理師對病人說：「你還記得剛住院的時候，經常留在病室，不願出來和大家一起活動，那時候你認為醫師、護理師和病友們，都在盯著你，你很害怕。你現在與剛住院的時候已經不同，你是怎麼改變的？」，此為應用下列何項溝通技巧：
(A) 面質 (B) 鼓勵評價 (C) 指出事實 (D) 給予認可
69. 下列何者是飲食障礙病人常出現的身體問題？
(A) 血鉀過高 (B) 腹瀉問題
(C) 骨質疏鬆症 (D) 體溫過高及心跳過快
70. 給予厭食症病人營養過程時，需注意再灌食症候群 (re-feeding syndrome)，以下敘述何者錯誤？
(A) 住院病人體重增加速度是每週 1~1.5 Kg 較理想
(B) 神經肌肉問題導致痙攣
(C) 血磷濃度上升
(D) 出現水腫和脹氣

71. 關於護理師與病人建立治療性人際關係中所出現的互動問題，下列敘述何者錯誤？
- (A) 情感轉移如能妥善加以運用，可藉此關係改善病人的行為
 - (B) 情感反轉移的關係都是屬於負向感受，並會破壞護病關係
 - (C) 試探行為是病人試探或考驗護理人員是否值得信任
 - (D) 抗拒行為包含有不耐煩、避重就輕、表淺的談話內容或沉默等
72. Ellis 的理情治療所提出的 A-B-C-D-E 理論中，A-B-C 是指：
- (A) 行動 (action)、行為 (behavior)、和諧 (congruence)
 - (B) 前提 (antecedent)、信念 (belief)、結果 (consequence)
 - (C) 情感 (affect)、行為 (behavior)、認知 (cognitive)
 - (D) 誘發事件 (activating event)、信念 (belief system)、情緒或行為結果 (consequence)
73. 有多位精神病患成員於工作適應團體治療活動中，提到找工作很不容易，護理師引導每位成員都說出自己找工作時曾經出現的難題與經驗，讓成員間有同舟共濟的感受，此時護理師主要運用團體治療的因子為何？
- (A) 發展社交技巧
 - (B) 普遍性
 - (C) 利他
 - (D) 寄予希望
74. 社區獨居之已婚、58 歲林女士，診斷為精神分裂症。否認自己有病，無法規則服藥，去年入住急性病房 4 次。目前因妄想干擾易與鄰居及家人起口角，導致家人無法同住，但是生活尚可自理。依林女士之情況，居家護理師最優先之照護目標為何？
- (A) 改善與家人之關係
 - (B) 支持性就業
 - (C) 參與社區活動
 - (D) 促進服藥結盟行為
75. 依據精神衛生法，精神疾病強制住院須經由審查會通過，此規範主要的精神為何？
- (A) 保障病人之基本人權
 - (B) 尊重不同專業人員之意見
 - (C) 避免醫療資源浪費
 - (D) 提供家屬喘息服務
76. 精神病患彭小姐，20 歲，現為社區復健中心之學員。平日常因上網玩電腦遊戲而晚睡，生活作息不規律，常遲到或缺席，參與復健活動時也精神不濟，無法集中注意力。彭小姐目前最需要的處置措施為何？
- (A) 確認規律生活作息的困難
 - (B) 促進病人的疾病適應
 - (C) 與醫師討論調整藥物
 - (D) 轉介較近的社區復健中心
77. 對於潛在性暴力傾向之處置，以下何者錯誤？
- (A) 當病人出現來回走動、拍門等行為，宜採取預防暴力行為的策略
 - (B) 和病人於病房內互動時，應使病人接近病室出口，以緩和其緊張情緒
 - (C) 需有足夠的人力支援
 - (D) 告知病人適當而明確的指引及限制
78. 王女士，66 歲，為慢性精神分裂症病患，精神症狀穩定但自我照顧能力差，需生活之協助。無子女，原主要照顧者為先生，但上個月去世，有住所之需求。依王女士的狀況，最優先考慮之精神醫療服務為何？
- (A) 社區復健中心
 - (B) 康復之家
 - (C) 居家治療
 - (D) 精神衛生護理之家

79. 一位日間留院的病人抱怨說：「我的家人都很少理我，還常罵我擺一張臭臉」。專科護理師建議她由外面回到家時，能主動先向家人打招呼，並說我回來了。一週後，病人又向專科護理師抱怨說：「我每天都有先和家人打招呼，可是他們對我都不公平，分了好多家事要我做。」，病人的媽媽向專科護理師表示家事都由姐姐負擔，此時病人出現的認知錯誤 (cognitive distortions) 是屬於下列何者？
(A) 選擇性負面注意 (B) 外化的自我價值 (C) 解讀別人的想法 (D) 情緒推理
80. 李先生，40 歲，診斷為精神分裂症。目前於日間病房進行復健，可規則服藥，精神症狀穩定且生活規律。哥哥固定提供生活花費，但個案不斷有想求職的想法，希望可以多賺些零用金，但根據過去的工作經驗，他會於面對工作壓力時都默默承受，少主動求助。目前李先生最優先之照護目標為何？
(A) 協助疾病之適應 (B) 連結社區經濟資源
(C) 激發工作動機 (D) 促進工作適應

【以下空白】

公告試題
僅供參考