

吩坦尼止痛藥 正確用才安全

報告人:劉佳萍科長


管制藥品組

106年11月22日



衛生福利部
食品藥物管理署
Food and Drug Administration

管制藥品



吩坦尼(Fentanyl)

背景

- 合成類鴉片藥物，用於手術麻醉、癌症末期病患、重度疼痛、慢性頑固性疼痛，止痛效力比嗎啡高50至100倍。
- 國內核發之藥品許可證共有21張。


副作用

- 噁心、嘔吐、便秘、暈眩、嗜睡等，嚴重者會因呼吸抑制導致病患死亡。

目前吩坦尼(Fentanyl)使用劑型

劑型	照片	包裝規格	適應症
注射劑		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 0.05毫克/毫升, 2毫升/安瓿 ➢ 0.05毫克/毫升, 10毫升/安瓿 	<p>麻醉和麻醉前給藥、急性疼痛之緊急治療。</p>
貼片		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 12 微公克/小時 ➢ 25 微公克/小時 ➢ 50 微公克/小時 ➢ 75 微公克/小時 	<p>需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。</p>
口頰溶片		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 200微公克 ➢ 600微公克 	<p>癌症病患突發性疼痛之處置，且適用對象僅限於18歲以上且正在使用類鴉片藥物治療其潛在持續性癌疼痛並具耐受性者。</p>

吩坦尼(Fentanyl)使用情形



民眾使用吩坦尼(Fentanyl)貼片的三大提醒

遵醫囑

- 屬醫師處方用藥，切勿任意更改劑量
- 不可剪開或破壞貼片後使用
- 使用紀錄表登錄病人使用情形(病人姓名、病歷號碼、貼上貼片的日期、時間及操作人員、撕下貼片的日期、時間及操作人員)

小心貼

- 應貼在腰部以上清潔、乾燥的皮膚(最好是無毛髮處)，勿貼於傷口處
- 移除貼片後，新的貼片要貼在不同位置
- 避免將Fentanyl貼片部位靠近高熱的環境中，以避免發生副作用及藥物過量致死

藥回收

- 使用過之貼片劑，切勿隨意棄置，應對折後放回原包裝袋，連同使用紀錄繳回藥局
- 剩餘未曾使用之貼片劑，應退還(醫院)藥局

感謝聆聽



衛生福利部
食品藥物管理署
Food and Drug Administration

<http://www.fda.gov.tw/>