




中藥

販賣業零售服務
指引（參考）



衛生福利部
中華民國 105 年 12 月

架構圖



目錄

壹、引言	1
貳、定義（釋義）	1
參、人員	3
一、中藥材零售商的責任	3
二、中藥材零售商應具備的知識及職責	4
肆、處所	5
一、營業場所	5
二、飲片藥斗	6
三、貯存倉	6
伍、業務範圍	6
一、販賣中藥材	7
二、採購中藥材	8
三、驗收及貯存中藥材	8
四、標籤	10
陸、中藥材交易客訴及回收系統	11
一、交易客訴系統	11
二、回收系統	11
柒、保存紀錄	12
捌、結語	12
附錄 1 《臺灣中藥典》第二版毒劇類中藥一覽表	13
附錄 2 《臺灣中藥典》第二版收載之中藥材品項	14
附錄 3 重量的計量換算表	18
附錄 4 中藥販賣業服務藍圖	19
附錄 5 中藥基準方 200 方	20

壹 引言

衛生福利部制定本服務指引（參考）之目的，係為促進中藥販賣業服務品質，提升中藥從業人員能力，保障民眾的用藥安全。

本服務指引可提供有關人士參考，手冊並不包括從業業務全部事項，而僅就一些有需要的事項進行指引。有關中藥商販賣業者規範管理，依《藥事法》、《藥事法施行細則》及相關規定。


貳 定義（釋義）

1. 「中藥材」指源自於自然界，得供藥物使用之植物、動物與礦物及其經加工、炮製而成之飲片。
2. 「毒劇類中藥材」指《臺灣中藥典》第二版毒劇中藥一覽表之中藥材，如附錄 1。



3. 「中藥販賣業者/零售」指將中藥（材）直接銷售予消費者或其他零售通路。
4. 「標籤」指裝載中藥材的容器或包裝上，用以記載文字、圖畫或記號之標示物。

5. 「批次編號」指一系列的數字、英文字母或其他符號的組合，用以識別藥材批次。
6. 「回收」指「中藥販賣業」對已販售而被確定有品質或安全問題的中藥材所作出的補救行動，以防止該等被發現屬危險、危害健康，或不適宜民眾服用的中藥材繼續被銷售或使用。
7. 「妊娠禁忌」指妊娠期間，服用藥物時應注意的禁忌，因為某些藥物可引起胎動不安，甚至流產。這類藥物通常分為禁用和慎用兩類。
8. 「配伍禁忌」指兩種或以上的藥物合用時，會降低、喪失藥效，或產生毒副作用。
9. 「性狀」指中藥材的形狀、大小、色澤、表面特徵、質地、斷面特徵和氣味等能用感官直接檢查的特徵。
10. 「容器」指貯存中藥材而與中藥材直接接觸之容器（盛器），不得影響內容物之品質。
11. 「貯存溫度」所稱「陰涼處」，指溫度為小於 20°C ，「冷藏」溫度為 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 。貯存溫度如無特別規定指常溫而言。
12. 「蟲蛀」指害蟲入侵後，將中藥材中的蛋白質、醣類、脂肪、澱粉等營養素，作為其生長發育的食物，因而破壞外形及所含有效成分，降低藥效；常見於紅棗、薏仁、杏仁、山藥等。一般而言，中藥材含水量高，約 10%以上、室溫 $15\sim 35^{\circ}\text{C}$ 及濕度 60%以上，是害蟲最適宜合生長發育



的條件，因此控制貯存環境溫度、濕度，保持乾燥，可減少蟲蛀。

- 13 「黴變」指空氣中真菌的孢子，掉落在受潮的中藥材上，引起黴菌滋生，產生毒素，則為發霉，常見如黃麴毒素、赭麴毒素。如延胡索、陳皮、黃耆等。



參 人員

中藥材的銷售，是一項專業的工作，從事本行業的人員，應具備與其職務有關的基本知識，並謹守職責，配合適當的藥店管理，以保障民眾的健康。中藥販賣業者可按其業務範圍及性質，決定員工的人數及工作的分配。



一、 中藥材零售商的責任

1. 不應販賣品質有問題的中藥材，品質應符合國家相關公告或藥典規範；

2. 應提供顧客中藥材的正確資料，不得作出引人誤解的虛假宣傳；
3. 確實遵守《藥事法》、《藥事法施行細則》、消保法及相關營業衛生等規定。
4. 確保營業處所在各方面均適合進行中藥材販賣業務，例如提供足夠的空間及適當的計量器具。同時，亦應確保營業處所附近沒有可污染中藥材的源頭；
5. 於營業處所內的明顯位置，懸掛其中藥販賣業藥商許可執照；及妥善管理中藥店。

二、中藥材零售商應具備的知識及其職責

1. 具備的知識

- (1) 中藥材辨識：如名稱、基原、效用和應用等知識；
- (2) 中藥材鑑定：利用人的感官，用看、摸、聞、嘗等方法，觀察藥材的形狀、大小、色澤、表面特徵、質地及折斷面特徵，並辨別其氣味，以鑑定其中藥材真偽、優劣。



2. 職責

- (1) 檢定所採購及販賣的中藥材，確保品質良好及適宜使用；
- (2) 向顧客解釋中藥材的煎煮及使用方法、禁忌和注意事項；



- (3) 檢查所購入和販賣中藥材的品質；
- (4) 負責中藥材的收發和貯存；及保持處所清潔衛生。

肆 處所

中藥販賣業者應提供合適處所，經營中藥材販賣業務，並就其業務的需要，設置必需的設施。處所的環境設施應與業務性質及規模相配合，一般可分為三部分—營業場所、飲片藥斗或貯存倉。但中藥販賣業者亦可根據其實際運作情況，作出適當的空間安排。

一、營業場所

保持整潔衛生，走道通暢，門戶具有防蟲、防鼠等病媒之適當設施。

1. 店面

為顧客駐足的地方，有適當採光，維持空氣流通，且不應存放雜物。

2. 販賣櫃台

- (1) 設有堅固而大小適中的展品櫃；及設有適當發放中藥材的空間；
- (2) 櫃台有充裕的空間，走道保持適當寬度。

3. 調配中藥（材）處所

- (1) 場地的走道留有一定寬度，以便秤取中藥材；
- (2) 備有足夠和適當的設施；及設有適當貯存設施，存放已經配妥但顧客未領取的中藥（材）。





二、飲片藥斗

藥斗的排列應有一定規律、標示清楚；一般是根據中藥材的使用率和性質而安排。下列基本原則可供參考：

1. 治療作用相近的中藥材，應放在相近的藥斗內；
2. 經常使用的中藥材，宜放在便於提取的位置；
3. 質重的中藥材（如礦物類中藥材），宜放在下層；
4. 質輕的中藥材（如全草類中藥材），宜在比較大的藥斗內，或佔用兩個藥斗；
5. 屬於配伍禁忌的中藥材，不能放在同一個藥斗或相近的藥斗內；
6. 性狀相似而功效不同的中藥材，不能放在同一個藥斗內；及氣味較重的中藥材，不能和其他中藥材放在同一個藥斗內。

三、貯存倉

1. 依所經營的中藥材品種與數量，設置適當的貯存倉；
2. 保持衛生、陰涼、乾燥和通風，並有防蟲、防鼠、防霉、防潮和防污染的設施。

伍 業務範圍

中藥販賣業者的業務範圍，包括中藥（材）的採購、驗收及貯存，以及調配、覆核、包裝和交付藥品等。



一、販賣中藥材

中藥販賣業者於販售單味或多味中藥材之前，應仔細審視中藥材有無毒性相剋，並告知顧客服用注意事項。在任何情況下，必須考慮妊娠禁忌；如屬多味中藥材，並應考慮其配伍禁忌。

1. 供應中藥材，須注意的事項包括一

- (1) 應留意中藥材有否變質，例如受蟲蛀、霉變或混有雜質；
- (2) 應使用適當的計量器具，務求秤量準確，不可以手代秤。同時亦應定期校驗計量器具；
- (3) 秤量後的中藥材，應分隔排放，不可混成一堆，以便復核；及須搗碎的中藥材，應用適當的器具搗碎。

2. 覆檢

為了避免錯誤和確保用藥安全，應盡量設立一個覆檢制度，內容包括：

- (1) 檢查中藥材是否正確、品項是否齊全，及數量正確與否；
- (2) 檢查中藥材的品質，例如有否受蟲蛀、霉變或混有雜質；及檢查是否已分開包裝須先煎、後下、包煎、另煎或沖服等的中藥材。

3. 包裝及交付藥品

- (1) 應將中藥材盛載在適當的包裝或容器內；
- (2) 內服藥和外用藥應分開包裝，不可放在同一包裝內，並在包裝上清楚地註明內服或外用；及向顧客清楚地解釋中藥材的煎煮及使用方法、禁忌和注意事項。



4. 煎煮藥材


- (1) 煎煮室環境設備及相關使用器具應潔淨通風防蟲防積水；
- (2) 煎煮室應有適當之煎藥設備如儲藥、冷藏設施、耐溫量杯（筒）、過濾設備及計時器等，以確保中藥材煎煮的正確及品質；
- (3) 煎藥容器應當以陶瓷、不銹鋼等材料製作的器皿為宜；
- (4) 操作中藥材煎煮流程前後需確實執行相關設備、器具及人員之清潔工作；
- (5) 依中藥材特性及所選擇之效用不同選用適當之煎煮水量、煎煮時間及煎煮方式；
- (6) 需特殊煎煮方式之藥材如包煎、另煎、先煎、後下沖服及烱化..等應依其適當之操作流程執行之；
- (7) 煎藥溫度一般不超過 100°C，並防止藥液溢出、藥材黏鍋、糊鍋、煮焦等現象以確保品質；
- (8) 煎煮好的藥液需妥適包裝，並有完善標示，如:姓名、內容物及妥善正確貯存以防污染、酸敗等，確保藥液品質直至顧客取藥。

二、採購中藥材

為確保中藥材的品質，應向領有販賣業藥商許可證照之中藥材販賣批發商採購；並根據需求及銷存情況，採購適量中藥材。

三、驗收及貯存中藥材

1. 驗收中藥材

- 
- (1) 驗收時，應確保中藥材的容器或包裝上，已清楚註明中藥材品名及供應商提供的批次編號；
 - (2) 驗收時，應確保中藥材的規格及形態，與其標籤所示相同；
 - (3) 分辨中藥材的品質，如發現品質不符合規格的中藥材，如黴變、蟲蛀，不應收受貨品；
 - (4) 檢查並核對中藥材的規格和數量；進貨時應當面驗收及點算，以防止錯收、少收或混入不良品等。



2. 貯存中藥材


- (1) 貯存倉庫依經營規模而有適當貯存空間，溫濕度適宜，防蟲、防鼠等病媒。
- (2) 中藥材使用以「先進先出」的原則；
- (3) 一般中藥材與毒劇類中藥材應分開貯存，並有適當標籤，以防止混淆；

- (4) 具揮發性精油類及蜜漬類中藥材應貯存於具有介碗（蓋凹）之容器；
- (5) 配合中藥材的性質和分類，貯存在獨立的容器或包裝內，並註明中藥材名，以防止混淆；
- (6) 確保每個容器及包裝的堅固程度，均足以防止因處理該中藥材所涉及的一般風險而引致的滲漏和污染。同時，應根據中藥材的性質，選擇最適宜的包裝材料；
- (7) 定期清理藥斗，防止交叉污染。同時，藥斗上亦附有清楚的中藥材名，以資識別；
- (8) 根據中藥材的特性，經常進行品質檢查，一旦發現質變，立即處理。並依個別特性，貯存於適當溫度、濕度，如冷藏。

四、標籤

依衛生福利部 104 年 6 月 30 日衛部中字第 1041860988 號令「中藥材飲片之標籤或包裝應標示事項處理原則」，市售中藥材飲片之標籤或包裝應標示品名、重量、廠商名稱及地址、製造日期及有效期間或保存期限、批號、類別、炮製方式（屬毒劇中藥材之應標示項目）、產地（國家）、保存方法與使用建議注意事項。後續如有修正依據衛生福利部公告之規定辦理。





陸 中藥材交易客訴及回收系統

中藥販賣業者應建立和維持交易客訴及回收系統，俾利某種中藥材一旦被發現有重大危害或重大損害之虞者，能將已銷售或分銷的中藥材迅速及在確實可行範圍內全部回收（參考《藥事法》藥物回收處理辦法）。

一、交易客訴系統

1. 建立交易客訴機制並記錄客訴內容，依消保法適當處理；
2. 交易客訴機制包括：
 - (1) 透明性--讓顧客容易得知客訴的途徑和方法，如提供客訴專線電話。
 - (2) 可行性--讓顧客方便地提出客訴。
 - (3) 回應--適時回應顧客的抱怨。
 - (4) 持續改善--於客訴處理過程中，持續改善產品與服務品質。
3. 如發現問題重複發生，須進行調查；及有需要時將有關資料通知相關中藥材的供應商。

二、回收系統

為維護民眾健康及確保藥物的品質與安全，經公告禁止輸入、依法認定為偽藥、劣藥或禁藥、有損害使用者安全、健康或其他權益之虞產品，應依「藥物回收處理辦法」儘速回收市售品。

1. 中藥販賣業者建立適當的回收制度，能迅速地從市面上，收回被確定有品質或安全問題的中藥材。合適的回收制度包括：

- (1) 建立中藥材的回收程序，能有效及迅速地回收；
- (2) 掌握中藥材的資料、流通管道及其他與回收有關的資料；
- (3) 及時通知顧客；及妥善貯存收回的中藥材，並作出適當處理，例如退回或銷毀。
- (4) 每次回收留有紀錄。

柒 保存紀錄

中藥販賣業者應確實保存交易文件及紀錄，以便有需要時，可追溯追蹤懷疑有問題的中藥材來源及流通通路。

1. 交易文件

- (1) 妥善保存進貨中藥材之交易文件，保存期建議自該批中藥材完售後一年；
- (2) 有關交易文件，載有以下：
 - i. 交易日期；
 - ii. 所進貨中藥材的名稱及數量；

2. 中藥材盤點與銷毀之文件（紀錄）

建議應定期盤點庫存中藥材，維持一定安全庫存量，每次盤點留有紀錄。

捌 結語

本服務指引力求周延供業界參考，然會因實際運作經驗與社會情況改變，可做適當修正，冀望提高中藥販賣業之服務品質和知識，進而達到保障民眾健康之目的。

附錄 1 《臺灣中藥典》第二版毒劇類中藥一覽表

生千金子	生川芎	生天仙子	生巴豆	生半夏	生甘遂
生白附子	生附子	生南星	生狼毒	生草烏	生馬錢子
生藤黃	白降丹	芫花	洋金花	砒石	砒霜
斑蝥	雄黃	蟾酥			



附錄 2 《臺灣中藥典》第二版收載之中藥材品項

二劃

丁香	人參	八角茴香
----	----	------

三劃

三七	三稜	千年健	土茯苓	大青葉	大棗
大黃	大腹皮	大薊	女貞子	小茴香	小薊
山豆根	山柰	山茱萸	山楂	山藥	川木香
川木通	川牛膝	川烏	川楝子		

四劃

丹參	五味子	五倍子	五靈脂	化橘紅	升麻
天竺黃	天門冬	天南星	天麻	太子參	巴豆
巴戟天	木瓜	木香	木通	木賊	水蛭
火麻仁	牛黃	牛蒡子	牛膝	王不留行	

五劃

代赭石	仙茅	仙鶴草	冬瓜子	冬葵果	冬蟲夏草
北沙參	北板藍根	半枝蓮	半夏	玄參	玉竹
甘草	甘遂	白及	白朮	白芍	白果
白花蛇舌草	白芥子	白芷	白前	白扁豆	白茅根
白頭翁	白薇	白鮮皮	白殭蠶	白蘘	石決明
石南葉	石韋	石斛	石菖蒲	石榴皮	石膏

六劃

全蠍	冰片	合歡皮	地骨皮	地黃	地榆
地膚子	地龍	百合	百部	竹茹	肉豆蔻
肉桂	肉蓯蓉	艾葉	血竭	西洋參	



七劃

佛手柑	何首烏	伸筋草	吳茱萸	忍冬藤	杜仲
沙苑蒺藜	沉香	決明子	沒藥	牡丹皮	牡蠣
皂角刺	皂莢	芒硝	豆蔻	赤小豆	赤芍
車前子	車前草	辛夷	防風	芎藭	

八劃

乳香	使君子	佩蘭	兒茶	卷柏	延胡索
昆布	枇杷葉	狗脊	知母	羌活	花椒
虎杖	金銀花	金錢草	金櫻子	附子	青皮
青葙子	青蒿	青黛	芡實		

九劃

前胡	南沙參	南板藍根	苘麻子	厚朴	威靈仙
柿蒂	枸杞子	柏子仁	砂仁	紅花	紅耆
胡麻仁	胡椒	苦杏仁	苦參	韭菜子	首烏藤
香附	香薷	枳殼	枳實		

十劃

茺蔚子	夏枯草	射干	桂枝	桔梗	桑白皮
桑枝	桑寄生	桑葉	桑螵蛸	柴胡	桃仁
海金沙	海螵蛸	浙貝母	浮小麥	烏梅	烏藥
益母草	益智	秦皮	秦艽	粉萆薢	臭椿皮
荊芥	草豆蔻	草果	草烏	茵陳	馬齒莧
馬錢子	高良薑	栝樓仁	栝樓根	茜草	茯苓



十一劃

乾薑	側柏葉	密蒙花	旋覆花	梔子	淡竹葉
淡豆豉	淫羊藿	牽牛子	細辛	荷葉	蛇床子
通草	連翹	陳皮	魚腥草	麥芽	麥門冬
麻黃	莢朮				

十二劃

款冬花	番紅花	番瀉葉	紫花地丁	紫草	紫菀
紫蘇子	紫蘇梗	紫蘇葉	絡石藤	萊菔子	鉤藤
菊花	菟絲子	蛤蚧	蛤殼	訶子	黃芩
黃耆	黃連	黃精	黃蘗		

十三劃

滑石	當歸	葛根	補骨脂	路路通	葶藶子
----	----	----	-----	-----	-----

十四劃

槐米	漏蘆	蒲公英	蒲黃	蒼朮	蒼耳子
遠志	酸棗仁	蒺藜	豨薟草		

十五劃

廣金錢草	廣藿香	穀芽	穀精草	蓮子	蔓荊子
豬牙皂	豬苓	墨旱蓮	槲寄生		

十六劃

橘紅	澤瀉	澤蘭	燈心草	獨活	龍膽
----	----	----	-----	----	----

十七劃

薄荷	薑黃	薏苡仁	薤白		
----	----	-----	----	--	--

十八劃

藁本	檳榔	瞿麥	蟬蛻	覆盆子	鎖陽
雞內金	雞血藤				

十九劃

羅漢果	藕節
-----	----

二十劃

蘆根	蘇木	黨參	藿香
----	----	----	----

二十一劃

續斷

二十四劃

蠶砂	鼈甲
----	----

二十九劃

鬱金



附錄 3 重量的計量換算表

臺灣所慣用的重量計量單位與中國大陸市場所採用的重量計量單位是有區別的，目前臺灣中藥材市場亦慣用斤、兩、錢、分等作為計量單位。

十進制單位與臺灣慣用單位重量換算

$$1 \text{ 公斤} = 1.65347 \text{ 斤}$$

$$100 \text{ 克} = 2.64555 \text{ 兩}$$

$$10 \text{ 克} = 0.264555 \text{ 兩}$$

$$1 \text{ 克} = 0.0264555 \text{ 兩}$$

$$\text{目前台灣：一斤} = \quad \text{十六兩} \quad = 600\text{g}。$$

$$\text{一兩} = \quad \text{十錢} \quad = 37.5\text{g}。$$

$$\text{一錢} = \quad \text{十分} \quad = 3.75\text{g}。$$

註：上述重量換算的詳情請參閱臺灣《度量衡法》。

附錄 4 中藥販賣業服務藍圖

店鋪環境展示	座椅服務指示	陳列櫃服務指示				
顧客行為	入店	需求說明	需求確認	瀏覽藥斗商品	商品確認	結帳付款
前台接觸人員	招呼引導就座	建議供樣品	價金核算顧客確認	建議供樣品	價金核算顧客確認	收款包裝
後台接觸人員	供茶水	補充茶水				
支援程序	預約紀錄	會員邀約	會員確認			

註：當執行業務程序前，應先確認及保持手部清潔。

附錄 5 中藥基準方 200 方

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
1	六味地黃丸	小兒藥證直訣	熟地黃 8、山茱萸 4、山藥 4、澤瀉 3、牡丹皮 3、茯苓 3 (一日飲片量 25 公克)。	滋陰補腎。	肝腎不足、腰痛足痠、頭暈目眩、消渴、舌燥喉痛、足跟作痛。
2	八味地黃丸	醫方集解	茯苓 3、牡丹皮 3、澤瀉 3、熟地黃 8、山茱萸 4、山藥 4、炮附子 1、肉桂 1 (一日飲片量 27 公克)。	溫補腎陽。	腎陽虛弱、命門火衰、夜尿、自汗、耳鳴。
3	知柏地黃丸	醫方集解	熟地黃 8、山茱萸 4、茯苓 3、山藥 4、牡丹皮 3、澤瀉 3、知母 2、黃柏 2 (一日飲片量 29 公克)。	滋陰降火。	頭暈耳鳴、舌燥咽痛、腰脊痠痛。
4	杞菊地黃丸	中國醫學大辭典	枸杞子 2、甘菊花 2、熟地黃 8、山茱萸 4、山藥 4、茯苓 3、牡丹皮 3、澤瀉 3 (一日飲片量 29 公克)。	滋腎養肝。	肝腎陰虛、頭暈目眩、視物不清、眼睛澀痛、迎風流淚。
5	參苓白朮散	太平惠民和劑局方	白扁豆 2.3、人參 3、茯苓 3、白朮 3、甘草 3、山藥 3、蓮子肉 1.5、桔梗 1.5、薏苡仁 1.5、砂仁 1.5、大棗 1.5 (一日飲片量 24.8 公克)。	補氣健脾、滲濕和胃。	脾胃虛弱、食少便溏。
6	四君子湯	醫方集解	人參 6、茯苓 6、炙甘草 3、白朮 6、生薑 3、大棗 2 (一日飲片量 26 公克)。	益氣健脾。	脾胃氣虛、消化不良、面色蒼白、食少便溏。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
7	四物湯	太平惠民和劑局方	熟地黃 7.5、白芍 7.5、當歸 7.5、川芎 7.5（一日飲片量 30 公克）。	補 血 調 血。	氣血兩虛、疲勞體弱。
8	補中益氣湯	脾胃論	黃耆 6、人參 4、白朮 2、炙甘草 4、當歸 2、陳皮 2、升麻 1、柴胡 1、生薑 3、大棗 2（一日飲片量 27 公克）。	補 中 益 氣、調補 脾胃。	勞倦、食少無味、脾胃虛弱、元氣不足。
9	六君子湯	太平惠民和劑局方	人參 5、白朮 5、茯苓 5、半夏 5、炙甘草 2.5、陳皮 2.5、生薑 2.5、大棗 2.5（一日飲片量 30 公克）。	補 氣 和 中。	脾胃虛弱、食慾不振、消化不良、大便溏泄、氣虛有痰。
10	歸脾湯	校註婦人良方	人參 3、龍眼肉 3、黃耆 3、炙甘草 1.5、白朮 3、茯苓 3、木香 1.5、當歸 3、酸棗仁 3、遠志 3、生薑 2、大棗 2（一日飲片量 31 公克）。	健 脾 寧 心、益氣 補血。	心脾兩虛、氣血不足、心悸、不眠、食少體倦、月經不調。
11	養心湯	證治準繩	炙黃耆 3、茯神 3、茯苓 3、半夏麴 3、當歸 3、川芎 3、遠志 2、酸棗仁 2、肉桂 2、柏子仁 2、五味子 2、人參 2、炙甘草 1、生薑 1、大棗 1（一日飲片量 33 公克）。	補 血 養 心、安神 定志。	心血不足、心神不寧、失眠多夢。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
12	人參養榮湯	太平惠民和劑局方	白芍 4、當歸 2.5、桂心 2.5、炙甘草 2.5、陳皮 2.5、人參 2.5、白朮 2.5、黃耆 2.5、熟地黃 2、五味子 2、茯苓 2、遠志 1.5、生薑 3、大棗 1 (一日飲片量 33 公克)。	補氣血。	脾肺氣虛、營血不足、食少無味、身倦肌瘦。
13	百合固金湯	醫方集解	生地黃 4、熟地黃 6、麥門冬 3、百合 2、白芍 2、當歸 2、貝母 2、甘草 2、玄參 1.6、桔梗 1.6 (一日飲片量 26.2 公克)。	養陰清熱，潤肺化痰。	肺腎陰虧、虛火上炎、咽喉燥痛、咳嗽氣喘。
14	紫菀湯	醫方集解	紫菀 4、阿膠 4、知母 4、貝母 4、桔梗 2、人參 2、茯苓 2、炙甘草 2、五味子 1.5 (一日飲片量 25.5 公克)。	補肺止咳，清熱化痰。	勞熱久咳、痰中帶血、肺痿、肺癰。
15	秦艽鼈甲散	衛生寶鑑	鼈甲 5、秦艽 2.5、知母 2.5、當歸 2.5、柴胡 5、地骨皮 5、烏梅 2、青蒿 1.5 (一日飲片量 26 公克)。	滋陰養血，清熱除蒸。	骨蒸潮熱，唇紅頰赤，盜汗咳嗽。
16	益氣聰明湯	醫方集解	黃耆 6、甘草 1.2、人參 6、升麻 1.8、葛根 3.6、蔓荊子 3.6、白芍 2.4、黃柏 2.4 (一日飲片量 27 公克)。	益氣升陽，散風清熱	風熱上擾，頭痛眩暈，內障初起，耳鳴耳聾。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
17	八珍湯	證治準繩	當歸 3、川芎 3、白芍 3、熟地黃 3、人參 3、白朮 3、茯苓 3、炙甘草 1.5、生薑 3、大棗 2（一日飲片量 27.5 公克）。	雙 補 氣 血。	氣血兩虛、神疲 肢倦、食慾不 振、面黃肌瘦。
18	濟生腎 氣丸	濟生方	熟地黃 8、山茱萸 4、 山藥 4、茯苓 6、牡丹 皮 3、澤瀉 3、炮附子 1、肉桂 1、牛膝 2、 車前子 2（一日飲片 量 34 公克）。	溫 腎 化 氣，利水 消腫。	腎陽不足、腰膝 痠重、小便不 利。
19	十全大 補湯	太平惠民 和劑局方	茯苓 3、白朮 3、人參 3、熟地黃 3、白芍 3、 炙甘草 3、黃耆 3、肉 桂 3、當歸 3、川芎 3、 生薑 3、大棗 2（一日 飲片量 35 公克）。	補 血 益 氣。	氣血兩虛、肢體 倦怠。
20	還少丹	楊氏家藏 方	山藥 3、牛膝 3、茯苓 2、山茱萸 2、楮實 2、 杜仲 2、五味子 2、巴 戟天 2、肉蓯蓉 2、遠 志 2、小茴香 2、石菖 蒲 1、熟地黃 1、枸杞 子 1、大棗 1（一日飲 片量 28 公克）。	補 心 腎 脾 胃 虛 損。	脾腎虛寒、血氣 虛損、體虛盜 汗、遺精尿濁。
21	黃耆五 物湯	刪補名醫 方論	黃耆 10、白芍 5、桂 枝 5、生薑 5、大棗 3 （一日飲片量 28 公 克）。	補 氣 血、和營 衛。	營衛氣血不足、 風邪入侵、營血 痺阻、肌肉麻木、手足無力。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
22	麻黃湯	傷寒論	麻黃 9、桂枝 6、炙甘草 3、杏仁 5 (一日飲片量 23 公克)。	發汗解表，宣肺平喘。	外感風寒，發熱惡寒，頭痛身疼，無汗而喘。
23	桂枝湯	傷寒論	桂枝 6、白芍 6、炙甘草 4、生薑 6、大棗 5 (一日飲片量 27 公克)。	解肌發表，調和營衛。	外感風寒，發熱頭痛，汗出惡風，鼻鳴乾嘔。
24	小青龍湯	傷寒論	麻黃 4、白芍 4、五味子 1.5、乾薑 4、炙甘草 4、桂枝 4、半夏 4、細辛 1.5 (一日飲片量 27 公克)。	解表散寒，溫肺化飲。	外感風寒，內停水飲，惡寒發熱，無汗，咳嗽氣喘，痰白清稀。
25	葛根湯	傷寒論	葛根 6、麻黃 4.5、桂枝 3、白芍 3、炙甘草 3、生薑 4.5、大棗 4 (一日飲片量 28 公克)。	發汗解肌。	外感風寒，頭痛發熱，惡寒無汗，項背強急。
26	柴葛解肌湯	中國醫學大辭典	柴胡 2.5、葛根 2.5、羌活 2.5、白芷 2.5、黃芩 2.5、白芍 2.5、桔梗 2.5、甘草 1.5、石膏 2.5、生薑 2、大棗 2 (一日飲片量 25.5 公克)。	解肌清熱。	頭痛發熱、心煩不眠、眶痛鼻燥、咽乾耳聾、惡寒無汗。
27	九味羌活湯	此事難知	羌活 3、防風 3、蒼朮 3、細辛 1、川芎 2、白芷 2、生地黃 2、黃芩 2、甘草 2、生薑 3、蔥白 3 (一日飲片量 26 公克)。	解表、祛濕、清裏熱。	外感風寒濕邪、頭痛、項強、四肢痠痛。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
28	人參敗毒散	太平惠民和劑局方	人參 3、茯苓 3、甘草 1.5、前胡 3、川芎 3、羌活 3、獨活 3、桔梗 3、柴胡 3、枳殼 3、生薑 3、薄荷 0.5 (一日飲片量 32 公克)。	益氣解表、散風祛濕。	外感風寒濕邪、惡寒發熱無汗、頭項強痛、肢體煩疼、胸膈痞悶、鼻塞聲重、咳嗽有痰。
29	川芎茶調散	太平惠民和劑局方	白芷 2、甘草 2、羌活 2、荊芥 4、川芎 4、細辛 1、防風 1.5、薄荷 8 (一日飲片量 24.5 公克)。	祛風、止痛	偏正頭痛。
30	荊防敗毒散	奇效良方	荊芥 3、防風 3、羌活 3、獨活 3、柴胡 3、前胡 3、川芎 3、枳殼 3、桔梗 3、茯苓 3、甘草 1.5、生薑 3、薄荷 1 (一日飲片量 35.5 公克)。	發汗解表、散風祛濕。	外感風寒濕邪、惡寒發熱、頭痛項強、肢體痠痛、腮腫。
31	麻杏甘石湯	傷寒論	麻黃 8、杏仁 6、炙甘草 4、石膏 16 (一日飲片量 34 公克)。	辛涼宣泄、清肺平喘。	熱邪壅肺，發熱，咳嗽氣喘。
32	麻杏薏甘湯	金匱要略	麻黃 5、炙甘草 10、薏苡仁 5、杏仁 4 (一日飲片量 24 公克)。	發汗解表，祛風濕。	風濕身痛發熱，日晡甚者。
33	麻黃附子細辛湯	傷寒論	麻黃 8、炮附子 5、細辛 8 (一日飲片量 21 公克)。	發散表邪、溫經散寒。	少陰病始得之，反發熱、脈沈者。
34	大承氣湯	傷寒論	大黃 8、厚朴 16、枳實 3、芒硝 6 (一日飲片量 33 公克)。	峻下熱結、消痞除滿。	陽明實熱、腸中燥屎堅結、腹中痞滿。
35	小陷胸湯	傷寒論	黃連 3、半夏 12、栝樓實 12 (一日飲片量 27 公克)。	清熱化痰、寬胸散結。	痰熱塞胸、心下痞痛。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
36	五積散	太平惠民和劑局方	陳皮 2、枳殼 2、麻黃 2、白芍 1、川芎 1、當歸 1、炙甘草 1、茯苓 1、半夏 1、肉桂 1、白芷 1、厚朴 1.5、炮乾薑 1.5、桔梗 4、蒼朮 8、生薑 2（一日飲片量 31 公克）。	解表散寒、溫中消積。	外感寒邪、內傷生冷、肢節疼痛。
37	參蘇飲	太平惠民和劑局方	陳皮 2、枳殼 2、桔梗 2、甘草 2、木香 2、半夏 3、紫蘇葉 3、葛根 3、前胡 3、人參 3、茯苓 3、生薑 2、大棗 1（一日飲片量 31 公克）。	益氣解表、宣肺化痰。	體虛感冒、惡寒發熱、頭痛鼻塞、咳嗽痰多。
38	香蘇散	太平惠民和劑局方	陳皮 4、香附 8、紫蘇葉 8、炙甘草 2、生薑 3、蔥白 3（一日飲片量 28 公克）。	理氣和中，解表散寒。	外感風寒，內有氣滯，形寒身熱，頭痛無汗，胸脘痞悶。
39	逍遙散	太平惠民和劑局方	炙甘草 2、白芍 4、當歸 4、茯苓 4、白朮 4、柴胡 4、煨薑 4、薄荷 2（一日飲片量 28 公克）。	疏肝解鬱、養血健脾。	血虛勞倦、頭目昏重、月經不調、神疲食少、榮衛不和。
40	加味逍遙散	證治準繩	當歸 4、白朮 4、白芍 4、柴胡 4、茯苓 4、炙甘草 2、牡丹皮 2.5、山梔子 2.5、煨薑 4、薄荷 2（一日飲片量 33 公克）。	疏肝解鬱、清熱涼血。	肝鬱血虛發熱、月經不調、怔忡不寧。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
41	藿香正氣散	太平惠民和劑局方	大腹皮 3、茯苓 3、白芷 3、紫蘇葉 3、陳皮 2、桔梗 2、白朮 2、厚朴 2、半夏麴 2、炙甘草 1、藿香 3、生薑 3、大棗 1（一日飲片量 30 公克）。	解表化濕、理氣和中。	外感風寒、胃腸不適、消化不良、吐瀉、食滯、中暑、不服水土。
42	烏藥順氣散	太平惠民和劑局方	麻黃 4、陳皮 4、烏藥 4、川芎 2、白僵蠶 2、枳殼 2、白芷 2、甘草 2、桔梗 2、乾薑 1、生薑 3、大棗 1（一日飲片量 29 公克）。	順氣宣散，祛風化痰。	遍身頑麻、骨節疼痛、步履艱難、語言蹇澀、口眼喎斜、筋脈拘攣。
43	蘇子降氣湯	太平惠民和劑局方	當歸 2、甘草 2、厚朴 2、前胡 2、陳皮 3、肉桂 3、蘇子 5、半夏 5、生薑 2、大棗 1（一日飲片量 27 公克）。	降氣平喘，溫化痰濕。	痰涎壅盛，咳喘短氣，胸膈滿悶，咽喉不利。
44	定喘湯	證治準繩	白果仁 6、麻黃 4、款冬花 4、桑白皮 4、半夏 4、蘇子 2.5、杏仁 2、黃芩 2、甘草 1.5（一日飲片量 30 公克）。	宣肺平喘、清熱化痰。	熱症喘咳。
45	越鞠丸	丹溪心法	蒼朮 5、香附 5、川芎 5、神麴 5、炒梔子 5（一日飲片量 25 公克）。	行氣解鬱	氣、血、痰、火、濕、食之鬱結所致的胸膈滿悶、脘腹脹痛、嘈雜吞酸、飲食不化、噯氣嘔吐。
46	槐花散	普濟本事方	炒槐花 6、側柏葉 6、荊芥穗 6、枳殼 6（一日飲片量 24 公克）。	清腸熱，疏風，行氣，止血。	腸風臟毒、痔漏便血。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
47	疏經活血湯	萬病回春	甘草 1、當歸 2、白芍 2.5、生地黃 2、蒼朮 2、牛膝 2、陳皮 2、桃仁 2、威靈仙 2、川芎 1、防己 1、羌活 1、防風 1、白芷 1、龍膽 1、茯苓 1、生薑 3(一日飲片量 27.5 公克)。	疏經、活血、祛風	關節痛、腰痛、筋肉痛、遍身走痛。
48	抵當湯	傷寒論	水蛭 10、蝨蟲 1、桃仁 2、酒大黃 10(一日飲片量 23 公克)。	攻逐瘀血。	下焦蓄血、少腹硬滿、經水不利
49	血府逐瘀湯	醫林改錯	當歸 4.5、生地黃 4.5、桃仁 6、紅花 4.5、枳殼 3、赤芍 3、柴胡 1.5、甘草 1.5、桔梗 2.3、川芎 2.3、牛膝 4.5(一日飲片量 37.6 公克)。	活血化瘀，行氣止痛。	胸中血瘀，日晡潮熱、經年胸痛、頭痛、或呃逆不止、或內熱煩悶、心悸失眠。
50	補陽還五湯	醫林改錯	黃耆 20、歸尾 1、赤芍 1、地龍 0.5、川芎 0.5、桃仁 0.5、紅花 0.5(一日飲片量 24 公克)。	補氣、活血、通絡。	半身不遂、口眼歪斜、語言蹇澀、中風後遺症。
51	正骨紫金丹	醫宗金鑑	丁香 2、木香 2、血竭 2、兒茶 2、熟大黃 2、紅花 2、當歸 4、蓮肉 4、茯苓 4、白芍 4、牡丹皮 1、甘草 0.6(一日飲片量 29.6 公克)。	活血、祛瘀、止痛。	跌撲損傷、瘀血停滯。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
52	桃紅四物湯	醫宗金鑑	桃仁 5、紅花 2.5、當歸 5、川芎 2.5、白芍 5、熟地黃 5 (一日飲片量 25 公克)。	活血行瘀。	月經不調、痛經、經行不暢有血塊。
53	消風散	外科正宗	當歸 2.5、生地黃 2.5、防風 2.5、蟬蛻 2.5、知母 2.5、苦參 2.5、胡麻 2.5、荊芥 2.5、蒼朮 2.5、牛蒡子 2.5、石膏 2.5、甘草 1.25、木通 1.25 (一日飲片量 30 公克)。	潤血祛風、除濕清熱。	風濕浸淫血脈之瘡疥搔癢，及風熱隱症。
54	上中下通用痛風丸	丹溪心法	天南星 4、蒼朮 4、黃柏 4、川芎 2、白芷 2、神麴 2、桃仁 2、威靈仙 1、羌活 1、防己 2、桂枝 1、紅花 0.5、龍膽 2 (一日飲片量 27.5 公克)。	疏風祛痰、清熱燥濕、活血止痛。	感受風寒濕邪、挾痰熱、血脈不暢、骨節疼痛。
55	蠲痺湯	中國醫學大辭典	當歸 4、赤芍 4、黃耆 4、薑黃 4、羌活 4、炙甘草 1.5、生薑 3、大棗 2、防風 4 (一日飲片量 30.5 公克)。	益氣和營，祛風除濕。	風痺，身體煩疼，項背拘急，肩肘痛重，舉動艱難，手足冷痺。
56	三痺湯	婦人良方	續斷 1.5、杜仲 1.5、防風 1.5、肉桂 1.5、細辛 1.5、人參 1.5、茯苓 1.5、當歸 1.5、白芍 1.5、黃耆 1.5、川牛膝 1.5、甘草 1.5、秦艽 1.5、生地黃 1.5、川芎 1.5、獨活 1.5、生薑 1.5、大棗 1.5 (一日飲片量 27 公克)。	補氣血、祛風濕、止痺痛。	氣血凝滯、手足拘攣、風寒濕痺。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
57	獨活寄生湯	千金方	獨活 3、桑寄生 2、杜仲 2、川牛膝 2、細辛 2、秦艽 2、茯苓 2、桂心 2、防風 2、川芎 2、人參 2、甘草 2、當歸 2、白芍 2、生地黃 2（一日飲片量 31 公克）。	祛風濕、止痹痛、補氣血。	風寒濕痺、腰膝冷痛、腿足屈伸不利。
58	鉤藤散	普濟本事方	鉤藤 2、陳皮 2、半夏 2、麥門冬 2、茯苓 2、茯神 2、人參 2、甘菊花 2、防風 2、炙甘草 1、石膏 4、生薑 3（一日飲片量 26 公克）。	祛風痰、清頭目。	肝厥頭暈、嘔吐、昏眩。
59	小續命湯	醫方集解	麻黃 2、桂枝 2、甘草 2、生薑 6、人參 2、川芎 2、杏仁 2、炮附子 1、防己 2、白芍 2、黃芩 2、防風 3、大棗 1（一日飲片量 29 公克）。	補氣散寒、疏風祛濕。	中風、口眼歪斜、筋脈拘急、半身不遂、舌強不能語或神情悶亂。
60	吳茱萸湯	傷寒論	吳茱萸 7.5、人參 4.5、生薑 9、大棗 6（一日飲片量 27 公克）。	溫中補虛、降逆止嘔。	脾胃虛寒、食穀欲嘔、吐利煩躁、手足厥冷、乾嘔吐涎頭痛。
61	附子理中湯	太平惠民和劑局方	人參 5、炮附子 5、炮乾薑 5、炙甘草 5、白朮 5（一日飲片量 25 公克）。	溫中散寒。	脾胃虛寒、飲食不化、四肢厥冷、腸鳴腹痛、嘔吐泄瀉。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
62	清暑益氣湯	脾胃論	黃耆 3、蒼朮 3、升麻 3、人參 1.5、澤瀉 1.5、神麴 1.5、陳皮 1.5、白朮 1.5、麥門冬 1、當歸 1、炙甘草 1、青皮 1、黃柏 1、葛根 1、五味子 0.5、生薑 3、大棗 2（一日飲片量 28 公克）。	清暑除濕、益氣生津。	長夏濕熱蒸炎、四肢困倦、身熱心煩、自汗口渴、便黃、溺赤、脈虛者。
63	竹葉石膏湯	傷寒論	竹葉 2、石膏 16、半夏 4、人參 3、炙甘草 2、粳米 6、麥門冬 6（一日飲片量 39 公克）。	清熱生津、益氣和胃。	熱病後期、氣陰兩傷、乾嘔少氣口渴、脈虛大無力者。
64	香薷飲	太平惠民和劑局方	香薷 12、白扁豆 6、厚朴 6（一日飲片量 24 公克）。	祛暑解表、化濕和中。	暑季乘涼飲冷、外感於寒、內傷於濕、身熱惡寒、頭重頭痛、腹痛吐瀉。
65	五皮飲	太平惠民和劑局方	五加皮 6、地骨皮 6、生薑皮 6、大腹皮 6、茯苓皮 6（一日飲片量 30 公克）。	健脾化濕、理氣消腫。	水病腫滿、上氣喘急、小便不利。
66	八正散	太平惠民和劑局方	車前子 3、瞿麥 3、滑石 3、大黃 3、山梔子 3、篇蓄 3、木通 3、甘草梢 3、燈心草 2（一日飲片量 26 公克）。	清熱瀉火、利水通淋。	膀胱結熱、小便澀痛。
67	萆薢分清飲	丹溪心法	益智仁 6、萆薢 6、石菖蒲 6、烏藥 6、甘草梢 3、茯苓 3（一日飲片量 30 公克）。	溫腎利濕、分清去濁。	膏淋白濁，小便頻數。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
68	茵陳五苓散	金匱要略	茵陳蒿 16、澤瀉 2.5、豬苓 1.5、茯苓 1.5、白朮 1.5、桂枝 1 (一日飲片量 24 公克)。	利濕清熱。	黃疸、小便不利、煩渴。
69	五淋散	太平惠民和劑局方	赤茯苓 6、當歸 4.8、甘草 4.8、山梔子 4、赤芍 4、燈心草 2 (一日飲片量 25.6 公克)。	清熱利濕、通淋和血。	治五淋、腎氣不足、膀胱有熱、小便淋瀝不通、臍腹急痛。
70	導水茯苓湯	奇效良方	赤茯苓 4.8、麥門冬 4.8、澤瀉 4.8、白朮 4.8、桑白皮 1.6、紫蘇葉 1.6、檳榔 1.6、木瓜 1.6、大腹皮 1.2、陳皮 1.2、砂仁 1.2、木香 1.2、燈心草 1 (一日飲片量 31.4 公克)。	行氣化濕，利水消腫。	遍身水腫、喘滿倚息、不得平臥、飲食不下、小便秘澀。
71	木防己湯	金匱要略	木防己 6、石膏 12、桂枝 4、人參 8 (一日飲片量 30 公克)。	鎮虛逆、散支飲。	膈間支飲、喘滿、心下痞堅。
72	雞鳴散	證治準繩	檳榔 8、陳皮 5、木瓜 5、吳茱萸 1.5、紫蘇葉 1.5、桔梗 2.5、生薑 2.5 (一日飲片量 26 公克)。	溫宣降濁。	腳氣疼痛、風濕流注、足痛筋脈浮腫。
73	炙甘草湯	傷寒論	炙甘草 3、生薑 2.5、桂枝 2.5、人參 1.5、生地黃 12、阿膠 1.5、麥門冬 2.5、火麻仁 3、大棗 3 (一日飲片量 31.5 公克)。	益氣補血、滋陰復脈。	氣虛血少脈結代、心動悸、氣短胸悶、虛勞肺痿。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
74	清燥救肺湯	醫宗金鑑	桑葉 7.5、石膏 6.5、甘草 2.5、胡麻仁 2.5、阿膠 2、人參 2、麥門冬 3、杏仁 2、枇杷葉 2（一日飲片量 30 公克）。	清燥潤肺。	燥邪傷肺、頭痛身熱、乾咳無痰、氣逆而喘、口渴心煩。
75	甘露飲	太平惠民和劑局方	熟地黃 2.5、麥門冬 2.5、枳殼 2.5、炙甘草 2.5、茵陳蒿 2.5、枇杷葉 2.5、石斛 2.5、黃芩 2.5、生地黃 2.5、天門冬 2.5（一日飲片量 25 公克）。	滋陰、清濕熱。	胃經濕熱、口臭咽痛、口舌生瘡、牙宣齦腫。
76	黃連解毒湯	外台秘要	黃連 6、黃芩 6、黃柏 6、山梔子 6（一日飲片量 24 公克）。	清熱解毒。	口燥咽乾、小便赤澀、大便秘結、治一切火熱之症。
77	白虎湯	傷寒論	知母 6、石膏 16、炙甘草 2、粳米 8（一日飲片量 32 公克）。	清熱生津。	陽明經証或溫病氣分大熱，症見口大渴、身大熱、脈洪大、汗大出者。
78	涼膈散	太平惠民和劑局方	大黃 4、芒硝 4、甘草 4、連翹 8、山梔子 2、黃芩 2、薄荷 2、竹葉 2（一日飲片量 28 公克）。	清熱解毒、瀉火通便。	臟腑積熱、煩躁多渴、口舌生瘡、咽喉腫痛、便秘尿赤。
79	龍膽瀉肝湯	李東垣方	龍膽 4、黃芩 2、山梔子 2、澤瀉 4、木通 2、車前子 2、當歸 2、生地黃 2、柴胡 4、甘草 2（一日飲片量 26 公克）。	瀉肝火、利濕熱。	臟腑積熱、耳鳴耳聾、耳腫疼痛、小便澀滯。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
80	清胃散	蘭室秘藏	當歸 3.6、黃連 3.6、生地黃 3.6、牡丹皮 6、升麻 12（一日飲片量 28.8 公克）。	清胃火、涼血熱。	胃火所致的牙痛、面熱、唇口頰腮腫痛生瘡、牙宣出血、牙齦潰爛。
81	甘露消毒丹	醫效秘傳	滑石 6、黃芩 4、茵陳蒿 4.4、藿香 1.6、連翹 1.6、石菖蒲 2.4、白豆蔻 1.6、薄荷 1.6、木通 2、射干 1.6、川貝母 2（一日飲片量 28.8 公克）。	化濁利濕、清熱解毒。	暑濕時疫、發熱倦怠、胸悶腹脹、咽腫口渴、溺赤便閉。
82	清心蓮子飲	太平惠民和劑局方	石蓮肉 4.5、茯苓 4.5、黃耆 4.5、人參 4.5、麥門冬 3、地骨皮 3、黃芩 3、炙甘草 3、車前子 3（一日飲片量 33 公克）。	清心火、益氣養陰。	上盛下虛、心火上炎、口苦咽乾、膀胱濕熱、遺精淋濁。
83	導赤散	小兒藥證直訣	生地黃 6、甘草 6、木通 6、竹葉 6（一日飲片量 24 公克）。	清心火、利小便。	口糜舌瘡、小便赤澀、熱淋不利。
84	玉女煎	景岳全書	生石膏 10、熟地黃 10、麥門冬 5、知母 4、牛膝 4（一日飲片量 33 公克）。	清胃滋陰。	陰虛胃熱、煩熱口渴、頭痛牙痛。
85	荊芥連翹湯	沈氏尊生書	當歸 2、白芍 2、川芎 2、黃芩 2、山梔子 2、連翹 2、荊芥 2、防風 2、枳殼 2、甘草 1.5、白芷 2、桔梗 2、柴胡 2（一日飲片量 25.5 公克）。	清熱解毒。	治風熱耳腫疼痛。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
86	滋陰降火湯	沈氏尊生書	白芍 2.5、當歸 2.5、熟地黃 2、白朮 2、天門冬 2、麥門冬 2、生地黃 1.5、陳皮 1.5、知母 1、黃柏 1、炙甘草 1、生薑 3、大棗 2（一日飲片量 24 公克）。	滋陰降火。	陰虛發熱，痰咳喘急，盜汗口乾。
87	當歸龍薈丸去麝香	丹溪心法	當歸 3、龍膽 3、蘆薈 1.5、山梔子 3、黃連 3、黃芩 3、黃柏 3、大黃 1.5、木香 0.75、青黛 1.5、麝香 0.15（一日飲片量 23.25 公克）。	瀉肝膽實火、通便。	肝膽火旺、驚悸不寧、大便秘結。
88	辛夷清肺湯	外科正宗	辛夷 2、黃芩 3、山梔子 3、麥門冬 3、百合 3、石膏 3、知母 3、甘草 1.5、枇杷葉 3、升麻 1（一日飲片量 25.5 公克）。	清肺熱。	鼻塞、鼻生瘰肉。
89	華蓋散	太平惠民和劑局方	麻黃 4、蘇子 4、桑白皮 4、杏仁 4、赤茯苓 4、陳皮 4、甘草 2（一日飲片量 26 公克）。	宣肺平喘、止咳化痰。	肺感寒邪、咳嗽上氣。胸膈煩滿、頭昏目眩。
90	清肺湯	增補萬病回春	甘草 0.6、黃芩 3、桔梗 2、茯苓 2、陳皮 2、當歸 2、貝母 2、桑白皮 2、天門冬 1.5、山梔子 1.5、杏仁 1.5、麥門冬 1.5、五味子 0.4、生薑 3、大棗 2、竹茹 2（一日飲片量 29 公克）。	清肺、化痰、止咳	咳嗽、上焦痰盛



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
91	止嗽散	醫學心悟	桔梗 5、荊芥 5、紫菀 5、百部 5、白前 5、甘草 2、陳皮 2.5 (一日飲片量 29.5 公克)。	疏風解表、化痰止咳	外感咳嗽，咯痰不暢
92	金沸草散	太平惠民和劑局方	荊芥 6、前胡 4.5、麻黃 4.5、旋覆花 4.5、甘草 1.5、半夏 1.5、赤芍 1.5、生薑 3、大棗 1 (一日飲片量 28 公克)。	解表散寒、治風化痰	肺感風寒、咳嗽多痰
93	香砂六君子湯	刪補名醫方論	人參 2.5、白朮 5、茯苓 5、甘草 2、陳皮 2、半夏 2.5、砂仁 2、木香 2、生薑 5 (一日飲片量 28 公克)。	健脾養胃	氣虛痰飲、嘔吐痞悶、腹脹噯氣
94	治濁固本丸	醫學正傳	蓮鬚 4、黃連 4、茯苓 2、砂仁 2、益智仁 2、半夏 2、黃柏 2、炙甘草 6、豬苓 5 (一日飲片量 29 公克)。	清熱、利濕	濕熱下注、頻尿白濁
95	當歸六黃湯	蘭室秘藏	當歸 3.5、生地黃 3.5、熟地黃 3.5、黃柏 3.5、黃芩 3.5、黃連 3.5、黃耆 7 (一日飲片量 28 公克)。	滋陰清熱、固表止汗	陰虛有火、盜汗、發熱



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
96	散腫潰堅湯	蘭室秘藏	黃芩 4、龍膽 2.5、枯樓根 2.5、黃柏 4、知母 2.5、桔梗 2.5、昆布 2.5、柴胡 2.5、炙甘草 1.5、荊三稜 1.5、莪朮 1.5、連翹 1.5、葛根 1.5、白芍 1、當歸尾 1、黃連 1、升麻 0.5(一日飲片量 34 公克)。	清熱解毒、破結潰堅	瘰癧、馬刀
97	排膿散	金匱要略	枳實 18、白芍 6、桔梗 2 (一日飲片量 26 公克)。	排膿止痛	內癰膿從便出
98	如意金黃散 (只用於傳統製劑)	外科正宗	枯樓根 25、黃柏 12.5、大黃 12.5、薑黃 12.5、白芷 12.5、厚朴 5、陳皮 5、甘草 5、蒼朮 5、生天南星 5 (適量調敷)。	消腫、解毒、止痛	癰瘍、疔腫、乳癰、丹毒、漆瘡、燙傷、跌撲損傷
99	完帶湯	傅青主女科	白朮 10、山藥 10、人參 2、白芍 5、車前子 3、蒼朮 3、甘草 1、陳皮 0.5、荊芥炭 0.5、柴胡 0.6 (一日飲片量 35.6 克)。	健脾燥濕，疏肝理氣	白帶
100	調經丸	六科準繩	香附 4、杜仲 4、川芎 2、白芍 2、當歸 2、生地黃 2、陳皮 2、小茴香 2、延胡索 2、肉蓯蓉 2、青皮 2、烏藥 2、黃芩 2、海螵蛸 2 (一日飲片量 32 克)。	活血調經、行氣止痛	月經不調、痛經、產後瘀血腹痛

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
101	聖愈湯	醫宗金鑑	熟地黃 5、川芎 2.5、人參 5、當歸 2.5、黃耆 5、白芍 5 (一日飲片量 25 公克)。	補 氣 養 血	氣血俱虛、煩渴燥熱、睡臥不寧、體倦少食
102	十神湯	太平惠民和劑局方	陳皮 2、麻黃 2、川芎 2、炙甘草 2、香附 2、紫蘇葉 2、白芷 2、升麻 2、葛根 7、赤芍 2、生薑 3 (一日飲片量 28 公克)。	解 肌 發 表、理氣 通陽	感冒風寒，發熱惡寒頭痛無汗，咳嗽鼻塞
103	升麻葛根湯	醫方集解	葛根 6、升麻 9、白芍 6、甘草 3、生薑 3 (一日飲片量 27 公克)。	解 肌 透 疹、痘疹 熱毒	麻疹初發，或發而未透，發熱惡風，噴嚏咳嗽
104	辛夷散	醫方集解	辛夷 2.5、細辛 2.5、藁本 2.5、升麻 2.5、川芎 2.5、木通 2.5、防風 2.5、甘草 2.5、白芷 2.5、茶葉 2.5 (一日飲片量 25 公克)。	散 風 寒，祛濕 邪，通鼻 竅	感冒初期引起之鼻塞不通，鼻涕清涕
105	小承氣湯	傷寒論	大黃 14、厚朴 7、枳實 7 (一日飲片量 28 公克)。	泄 熱 通 便，消痞 除滿	陽明實熱，腹滿便秘
106	調胃承氣湯	傷寒論	大黃 8、炙甘草 4、芒硝 16 (一日飲片量 28 公克)。	通 便 軟 堅，和胃 泄熱	陽明熱結，口渴心煩，腹滿便秘
107	桃仁承氣湯 (桃核承氣湯)	傷寒論	桃仁 5、桂枝 5、大黃 10、芒硝 5、炙甘草 5 (一日飲片量 30 公克)。	通 便 下 瘀	下焦蓄血，少腹急結，小便自利，血瘀經閉
108	大柴胡湯	傷寒論	柴胡 8、黃芩 3、白芍 3、半夏 5、生薑 5、枳實 2、大棗 2、大黃 2 (一日飲片量 30 公克)。	和 解 少 陽，瀉下 熱結	傷寒入陽明，少陽未盡，寒熱往來，心下鞭滿，嘔吐不止，心煩便秘



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
109	防風通聖散	醫方集解	防風 1、荊芥 1、連翹 1、麻黃 1、薄荷 1、川芎 1、當歸 1、白芍 1、白朮 1、山梔子 1、大黃 1、芒硝 1、黃芩 2、石膏 2、桔梗 2、甘草 4、滑石 6、生薑 2、蔥白 2（一日飲片量 32 公克）。	解表通裡、疏風清熱	表裏三焦俱實、大便秘結、小便短赤、瘡瘍腫毒
110	葛根黃芩黃連湯	傷寒論	葛根 12、炙甘草 3、黃芩 4.5、黃連 4.5（一日飲片量 24 公克）。	清熱、解表	表證未解誤下，熱邪入裏，身熱下利，胸脘煩熱，喘而汗出
111	桑菊飲	溫病條辨	杏仁 5、連翹 4、薄荷 2、桑葉 6、菊花 2.5、桔梗 5、甘草 2、蘆根 5（一日飲片量 31.5 公克）。	疏風清熱、宣肺止咳	風溫初起，咳嗽，身熱口渴
112	杏蘇散	溫病條辨	紫蘇葉 3、半夏 3、茯苓 3、前胡 2、桔梗 2、枳殼 2、甘草 1、生薑 2、大棗 2、橘皮 1、杏仁 3（一日飲片量 24 公克）。	溫散風寒、宣肺化痰。	感冒、發熱、頭痛、痰嗽。
113	銀翹散	溫病條辨	連翹 5、金銀花 5、桔梗 3、薄荷 3、淡竹葉 2、甘草 2.5、荊芥 2、淡豆豉 2.5、牛蒡子 3、蘆根 2（一日飲片量 30 公克）。	辛涼透表、清熱解毒。	溫病初起，發熱微惡風寒，頭痛口渴，咳嗽咽痛。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
114	柴胡桂枝湯	傷寒論	桂枝 3、黃芩 3、人參 3、炙甘草 2、半夏 5、白芍 3、大棗 2、生薑 3、柴胡 8 (一日飲片量 32 公克)。	表裏雙解。	少陽證兼太陽表證，發熱，微惡寒，肢節煩疼，微嘔，心下支結。
115	小柴胡湯	傷寒論	柴胡 8、黃芩 3、人參 3、炙甘草 3、半夏 5、生薑 3、大棗 2 (一日飲片量 27 公克)。	和解少陽。	少陽證，往來寒熱，胸脇苦滿，默默不欲飲食，心煩喜嘔，口苦，咽乾，目眩。
116	芍藥甘草湯	傷寒論	白芍 12、炙甘草 12 (一日飲片量 24 公克)。	緩急止痛。	腹中疼痛，腿腳攣急。
117	柴陷湯	沈氏尊生書	半夏 9、栝樓仁 6、柴胡 6、黃連 3、黃芩 3、人參 2、甘草 1.5、生薑 3、大棗 2 (一日飲片量 35.5 公克)。	清熱滌痰，寬胸散結。	痰熱互結，胸痺咳嗽。
118	黃連湯	傷寒論	黃連 4.5、炙甘草 4.5、乾薑 4.5、桂枝 4.5、人參 3、半夏 6、大棗 3 (一日飲片量 30 公克)。	調和寒熱，和胃降逆。	胸中有熱，胃中有寒，腹中痛，欲嘔吐。
119	四逆散	傷寒論	甘草 6、枳實 6、柴胡 6、白芍 6 (一日飲片量 24 公克)。	疏肝理脾。	手足厥逆、或欬或悸、小便不利、腹中痛、泄利下重。
120	旋覆代赭石湯	傷寒雜病論	旋覆花 4.5、人參 3、生薑 7.5、半夏 7.5、代赭石 1.5、大棗 4、炙甘草 4.5 (一日飲片量 32.5 公克)。	扶正益胃，降逆化痰。	汗吐下解之後，心下痞鞭，噫氣不除。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
121	半夏厚朴湯	金匱要略	半夏 8、厚朴 4.5、茯苓 6、生薑 7.5、紫蘇葉 3（一日飲片量 29 公克）。	行氣開鬱、降逆化痰。	梅核氣（咽中如有物阻，咯吐不出，吞嚥不下）、胸脘滿悶、或咳嗽、或嘔吐。
122	橘皮竹茹湯	濟生方	赤茯苓 3、陳皮 3、枇杷葉 3、麥門冬 3、竹茹 3、半夏 3、人參 1.5、甘草 1.5、生薑 3、大棗 2（一日飲片量 26 公克）。	理氣清熱，和中降逆。	胃熱多渴、嘔噦不食。
123	橘核丸	濟生方	橘核 4、海藻 4、昆布 4、海帶 4、川楝子 4、桃仁 4、厚朴 1、木通 1、枳實 1、延胡索 1、桂心 1、木香 1（一日飲片量 30 公克）。	行氣破滯，消堅散結。	疝氣，睪丸腫脹，偏有大小，或堅硬如石，或上引臍腹絞痛，陰囊腫脹。
124	復元活血湯 去穿山甲	醫學發明	柴胡 5、當歸 3、栝樓根 3、穿山甲 2、甘草 2、紅花 2、桃仁 2、大黃 10（一日飲片量 27 公克）。	活血祛瘀。	跌打損傷、瘀血留於脇下、痛不可忍者。
125	大黃牡丹皮湯	金匱要略	大黃 10、牡丹皮 2.5、桃仁 2.5、冬瓜仁 6、芒硝 7（一日飲片量 28 公克）。	泄熱破瘀，散結消腫。	腸癰、少腹腫痞、按之痛甚、發熱惡寒。
126	芍藥湯	病機氣宜保命集	白芍 7、當歸 3.5、黃芩 3.5、黃連 3.5、大黃 2、木香 1.5、檳榔 1.5、炙甘草 1.5、肉桂 1（一日飲片量 25 公克）。	清濕熱，理氣血。	痢疾，便膿血，腹痛，裏急後重。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
127	桂枝茯苓丸	金匱要略	桂枝 6、茯苓 6、牡丹皮 6、桃仁 6、赤芍 6 (一日飲片量 30 公克)。	活血化瘀，緩消癥塊。	婦人宿有癥塊，妊娠胎動，漏下不止，瘀血痛經，經閉。
128	當歸拈痛湯	李東垣方	當歸 1.5、人參 1.5、茵陳蒿 3.5、羌活 3.5、防風 2、升麻 1.5、葛根 1.5、蒼朮 1.5、白朮 2、甘草 3.5、炒黃芩 3.5、苦參 1.5、知母 2、豬苓 2、澤瀉 2 (一日飲片量 33 公克)。	燥濕清熱，活血止痛。	濕熱走注、遍身骨節煩痛、肩背沉重及一切濕熱。
129	四逆湯	傷寒論	炙甘草 10、乾薑 7.5、炮附子 10 (一日飲片量 27.5 公克)。	溫經救陽。	陰盛陽虛，手足厥冷，下利清穀，嘔吐腹痛。
130	當歸四逆湯	傷寒論	當歸 4.5、桂枝 4.5、白芍 4.5、細辛 4.5、大棗 6、炙甘草 3、木通 3 (一日飲片量 30 公克)。	溫經散寒、養血通脈。	寒入厥陰，手足厥冷，脈微欲絕。
131	真武湯	傷寒論	茯苓 7.5、白芍 7.5、生薑 7.5、白朮 5、炮附子 3 (一日飲片量 30.5 公克)。	溫腎散寒、健脾利水。	脾腎陽虛、水氣內停。
132	小建中湯	傷寒金匱方	桂枝 4.5、炙甘草 3、大棗 4.5、白芍 9、生薑 4.5、膠飴 1 (一日飲片量 26.5 公克)。	溫中補虛、和裏緩急。	脾胃虛寒、裏急腹痛。
133	大建中湯	金匱要略	蜀椒 4、乾薑 16、人參 8、膠飴 1 (一日飲片量 29 公克)。	溫中補虛，降逆止痛。	膈間支飲、喘滿、心下痞滿。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
134	黃耆建中湯	金匱要略	桂枝 4.5、炙甘草 3、大棗 4.5、白芍 9、生薑 4.5、膠飴 1、黃耆 2.5（一日飲片量 29 公克）。	溫中補虛、和裏緩急。	虛勞不足、脾胃虛寒腹痛、自汗、短氣、肢體困倦、及陽虛身痛。
135	六一散	醫方集解	滑石 24、甘草 4（一日飲片量 28 公克）。	清暑利濕。	暑濕身熱，心煩口渴，小便不利。
136	五苓散	傷寒論	豬苓 4.5、澤瀉 7.5、茯苓 4.5、桂枝 3、白朮 4.5（一日飲片量 24 公克）。	化氣利水，健脾祛濕。	內停水濕，外有表證，小便不利，煩渴欲飲，水入即吐，泄瀉。
137	豬苓湯	傷寒論	豬苓 6、茯苓 6、阿膠 6、滑石 6、澤瀉 6（一日飲片量 30 公克）。	滋陰清熱利水。	水熱互結，內熱傷陰，發熱，渴欲飲水，小便不利，心煩不得眠。
138	越婢加朮湯	金匱要略	麻黃 6、石膏 8、生薑 3、甘草 2、大棗 3、白朮 4（一日飲片量 26 公克）。	疏風泄熱，發汗行水。	皮水，四肢腫，小便不利。
139	羌活勝濕湯	內外傷辨惑論	羌活 7、獨活 7、藁本 3.5、防風 3.5、炙甘草 3.5、川芎 3.5、蔓荊子 2（一日飲片量 30 公克）。	發汗、祛風、勝濕。	濕氣在表、頭痛、頭重、腰脊重痛，或一身盡痛，微熱昏倦。
140	茵陳蒿湯	傷寒論	茵陳蒿 18、大黃 6、山梔子 6（一日飲片量 30 公克）。	清熱利濕。	陽黃發熱、頭汗出、身無汗、口渴、腹微滿，小便短赤。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
141	薏苡仁湯	張氏醫通	薏苡仁 20、白芍 3、當歸 3、麻黃 1.5、桂枝 1.5、蒼朮 2、炙甘草 1.5、生薑 3 (一日飲片量 35.5 公克)。	祛濕通痺。	濕痺，關節腫脹，痠痛重著。
142	苓桂朮甘湯	金匱要略	茯苓 10、桂枝 7.5、白朮 7.5、炙甘草 5 (一日飲片量 30 公克)。	健脾滲濕，溫化痰飲。	痰飲為病，胸脇脹滿，眩暈心悸，短氣而咳。
143	小半夏加茯苓湯	金匱要略	半夏 12、生薑 12、茯苓 6 (一日飲片量 30 公克)。	行水消痞。	卒嘔吐、心下痞、膈間有水、眩悸者。
144	腎著湯	金匱要略	甘草 4、白朮 4、乾薑 8、茯苓 8 (一日飲片量 24 公克)。	溫脾祛濕。	寒濕傷脾，身體重者，腰及腰以下冷痛。
145	潤腸湯	萬病回春	當歸 2.5、熟地黃 2.5、生地黃 2.5、火麻仁 2.5、桃仁 2.5、杏仁 2.5、枳實 2.5、黃芩 2.5、厚朴 2.5、大黃 2.5、甘草 1.5 (一日飲片量 26.5 公克)。	潤腸通便。	腸胃燥熱，大便秘結。
146	響聲破笛丸	萬病回春	連翹 4、桔梗 3、川芎 4、砂仁 1.5、訶子 1.5、兒茶 3、薄荷 6、大黃 1.5、甘草 3 (一日飲片量 27.5 公克)。	清肺潤喉。	喉痛聲啞、失音。
147	半夏瀉心湯	傷寒論	半夏 7.5、黃芩 4.5、乾薑 4.5、人參 4.5、黃連 1.5、大棗 3、炙甘草 4.5 (一日飲片量 30 公克)。	和胃降逆。	傷寒下早，心下痞滿，嘔而腸鳴。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
148	瀉白散	小兒藥證直訣	地骨皮 10、桑白皮 10、甘草 1、粳米 8（一日飲片量 29 公克）。	瀉肺清熱。	肺熱咳嗽，甚則氣喘，皮膚蒸熱，日晡尤甚。
149	普濟消毒飲	東垣試效方	黃芩 5、黃連 5、玄參 2、柴胡 2、桔梗 2、甘草 2、連翹 1、牛蒡子 1、板藍根 1、馬勃 1、白殭蠶 0.7、升麻 0.7、薄荷 1、陳皮 2（一日飲片量 26.4 公克）。	疏風散邪、清熱解毒。	大頭瘟症，頭面，咽喉腫痛。
150	三黃瀉心湯	金匱要略	大黃 12、黃連 6、黃芩 6（一日飲片量 24 公克）。	瀉火解毒。	三焦實熱，口舌生瘡，吐血衄血，膈胸煩熱，大便秘結，小便赤澀。
151	清心利膈湯	中國醫學大辭典	防風 3、荊芥 3、薄荷 3、桔梗 3、黃芩 3、黃連 3、山梔子 1.5、連翹 1.5、玄參 1.5、大黃 1.5、芒硝 1.5、牛蒡子 1.5、甘草 1.5、金銀花 2、淡竹葉 4（一日飲片量 34.5 公克）。	清熱解毒。	心脾蘊熱，咽喉腮舌腫痛。
152	半夏天麻白朮湯	脾胃論	半夏 4.5、黃柏 0.5、乾薑 0.5、天麻 1.5、蒼朮 1.5、茯苓 1.5、黃耆 1.5、澤瀉 1.5、人參 1.5、白朮 3、神麴 3、麥芽 4.5、陳皮 4.5（一日飲片量 29.5 公克）。	補脾燥濕、化痰熄風。	痰厥頭痛，咳痰稠粘，頭眩煩悶，噁心吐逆，身重肢冷。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
153	安中散	太平惠民和劑局方	甘草 6、延胡索 3、良薑 3、乾薑 3、茴香 3、肉桂 3、牡蠣 3（一日飲片量 24 公克）。	溫 中 散寒止痛。	脾胃寒凝氣滯、脘腹疼痛、口吐酸水、停積不消、脹滿不適。
154	玉屏風散	世醫得效方	黃耆 15、防風 5、白朮 5、生薑 3、大棗 2（一日飲片量 30 公克）。	益 氣 固表止汗。	表虛自汗、虛人外感。
155	乙字湯	驗方	當歸 6、柴胡 6、黃芩 3、甘草 3、升麻 2、大黃 1.5（一日飲片量 21.5 公克）。	清熱、通便。	便秘痔痛。
156	消痔丸	瘍醫大全	生 地 黃 4.8、黃 芩 1.8、金銀花 1.2、枳殼 1.2、秦艽 1.2、防風 2.4、大黃 2.4、當歸 2.4、蒼朮 2.4、地龍 2.4、槐花 2.4、赤芍 2.4（一日飲片量 27 公克）。	清熱、涼血、通便。	痔漏，便秘。
157	紫雲膏 （只用於傳統製劑）	外科正宗	紫草 5、當歸 5、蜜蠟 15、胡麻油 13、油質基劑適量（外用，每次適量塗抹於患處，一日數次）。	潤膚、止癢、生肌。	皮膚燥癢、手足皸裂、燙傷、凍傷。
158	八味帶下方	驗方	當歸 5、川芎 3、茯苓 3、木通 3、陳皮 2、土茯苓 6、金銀花 3、大黃 1（一日飲片量 26 公克）。	清 熱 解毒。	濕熱帶下、熱淋。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
159	溫經湯	金匱要略	吳茱萸 3、當歸 2、川芎 2、白芍 2、人參 2、桂枝 2、阿膠 2、牡丹皮 2、生薑 2、甘草 2、半夏 3、麥門冬 4(一日飲片量 28 公克)。	溫經養血、活血調經。	婦人少腹寒冷、脹急不舒、經期不順、淋漓不止。
160	芎歸膠艾湯	金匱要略	川芎 2.5、阿膠 2.5、甘草 2.5、艾葉 4、當歸 4、白芍 5、生地黃 8(一日飲片量 28.5 公克)。	補血調經、安胎止崩。	流產後出血不淨，月經過多。
161	當歸芍藥散	金匱要略	當歸 2、白芍 10、茯苓 2.5、白朮 2.5、澤瀉 5、川芎 5(一日飲片量 27 公克)。	補血養肝，健脾滲濕。	月經不調，妊娠腰疼痛，頭暈，腰腳冷感。
162	生化湯	傅青主女科	當歸 16、川芎 6、桃仁 3、黑薑 1、炙甘草 1(一日飲片量 27 公克)。	生新血、化瘀血、溫中散寒。	產後惡露不行，少腹疼痛。
163	玉泉丸	古今醫統	栝樓根 4.5、葛根 4.5、麥門冬 3、人參 3、茯苓 3、烏梅 3、甘草 3、生黃耆 1.5、炙黃耆 1.5(一日飲片量 27 公克)。	生津止渴、益氣養陰。	消渴多飲、小便頻數、大便稀溏、精神疲乏。
164	黃連上清丸	中國醫學大辭典	黃連 3、黃芩 3、黃柏 3、山梔子 3、菊花 1.5、當歸尾 1.5、桔梗 0.8、葛根 0.8、薄荷 0.8、玄參 0.8、栝樓根 0.8、川芎 0.8、薑黃 2.2、連翹 2.2、大黃 4.4(一日飲片量 28.6 公克)。	疏風、清熱、解毒。	上焦積熱、眼痛咽痛、口舌生瘡、心膈煩熱、肺火上升、風熱鼻赤。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
165	梔子豉湯	傷寒論	山梔子 10、淡豆豉 15 (一日飲片量 25 公克)。	清熱除煩。	汗吐下後、邪熱客胸，身熱懊惱，虛煩不眠。
166	桔梗湯	傷寒論	桔梗 8、甘草 16 (一日飲片量 24 公克)。	排膿解毒。	肺癰吐膿，其氣腥臭，咽喉腫痛。
167	清肺飲	醫方集解	杏仁 5、貝母 5、茯苓 5、桔梗 2.5、甘草 2.5、五味子 2.5、橘紅 2.5、生薑 3 (一日飲片量 28 公克)。	化痰，潤燥。	痰濕氣逆而咳嗽。
168	栝樓枳實湯	萬病回春	栝樓 3、枳實 3、桔梗 3、茯苓 3、貝母 3、陳皮 3、黃芩 3、山梔子 3、當歸 2、砂仁 1.5、木香 1.5、甘草 1、生薑 3 (一日飲片量 33 公克)。	清肺化痰，行氣利膈。	久咳、痰結胸膈，痰迷心竅，不能言語。
169	不換金正氣散	太平惠民和劑局方	厚朴 4、藿香 4、陳皮 4、半夏 4、蒼朮 4、炙甘草 4、生薑 3、大棗 2 (一日飲片量 29 公克)。	行氣化濕，和胃止嘔。	四時傷寒，瘴疫時氣，頭痛寒熱，霍亂吐瀉。
170	健脾丸	證治準繩	白朮 5、木香 1.5、黃連 1.5、甘草 1.5、茯苓 4、人參 3、神麴 2、陳皮 2、砂仁 2、麥芽 2、山楂 2、山藥 2、肉豆蔻 2 (一日飲片量 30.5 公克)。	益氣健脾，和胃消食。	脾胃虛弱，飲食不化，脘腹脹滿。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
171	連翹敗毒散	醫方集解	羌活 2、獨活 2、柴胡 2、前胡 2、川芎 2、枳殼 2、桔梗 2、茯苓 2、金銀花 2、連翹 2、甘草 1、生薑 2、薄荷 2（一日飲片量 25 公克）。	解表清熱，消腫解毒。	傷寒頭痛，瘡瘍初起。
172	補陰湯	萬病回春	當歸 2、白芍 2、生地黃 2、熟地黃 2、陳皮 2、茴香 2、補骨脂 2、懷牛膝 2、杜仲 2、茯苓 2、人參 1、黃柏 1.5、知母 1.5、炙甘草 1、大棗 2（一日飲片量 27 公克）。	滋陰補腎。	腎虛腰痛。
173	麥味地黃丸	醫方集解	熟地黃 8、山茱萸肉 4、山藥 4、茯苓 3、牡丹皮 3、澤瀉 3、五味子 2、麥門冬 3（一日飲片量 30 公克）。	斂肺滋陰。	肺腎陰虛，咳嗽虛喘，潮熱盜汗。
174	滋陰地黃丸（熟乾地黃丸）	蘭室秘藏	人參 1、炙甘草 1、天門冬 1.5、地骨皮 1.5、五味子 1.5、枳殼 1、黃連 1.5、當歸 2.5、黃芩 2.5、生地黃 4、柴胡 4、熟地黃 5（一日飲片量 27 公克）。	養陰清熱，益肝明目。	肝腎不足，陰虛有熱，頭暈目眩，視物昏花。
175	當歸補血湯	內外傷辨惑論	黃耆 25、當歸 5（一日飲片量 30 公克）。	補氣生血。	脈大而虛，氣弱血虛，勞倦內傷。
176	大補陰丸	丹溪心法	黃柏 6、知母 6、熟地黃 9、龜板 9（一日飲片量 30 公克）。	滋陰降火。	陰虧火旺，肺痿欬血，呃逆煩熱，骨蒸盜汗，足膝疼熱。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
177	七寶美髯丹	醫方集解	製何首烏 12、茯苓 3、懷牛膝 3、當歸 3、枸杞子 3、菟絲子 3、補骨脂 1.5(一日飲片量 28.5 公克)。	滋 腎 養 血。	腎陰虧損，筋骨無力，鬚髮早白。
178	斑龍丸	古今醫統	鹿角霜 5、鹿角膠 5、菟絲子 5、柏子仁 5、熟地黃 5、茯苓 2.5、補骨脂 2.5(一日飲片量 30 公克)。	養 氣 血，益筋骨。	腎陽不足，腰膝酸軟，頻尿肢冷。
179	再造散	傷寒六書	黃耆 3、人參 3、桂枝 3、甘草 3、附子 1.5、細辛 1.5、羌活 2.5、防風 2.5、川芎 2.5、煨薑 3、白芍 3、大棗 3(一日飲片量 31.5 公克)。	溫 陽 益 氣。	外感風寒，熱清寒重，無汗肢冷。
180	養肝丸	濟生方	當歸 3.5、車前子 3.5、白芍 3.5、防風 3.5、薤仁 3.5、熟地黃 3.5、川芎 3.5、楮實子 3.5(一日飲片量 28 公克)。	養 血 明 目。	肝血不足，眼目昏花，或生眵淚，久視無力。
181	清涼散	萬病回春	山梔子 3、連翹 3、黃芩 3、防風 3、枳殼 3、黃連 3、當歸 3、生地黃 3、甘草 3、桔梗 1.5、薄荷 1.5、燈心草 1、細茶 1、山豆根 1(一日飲片量 33 公克)。	清 熱 瀉 火，消腫止痛。	一切實火，咽喉腫痛。
182	甘麥大棗湯(甘草小麥大棗湯)	金匱要略	甘草 6、小麥 12、大棗 6(一日飲片量 24 公克)。	養 心 安 神，和中緩急。	婦人臟躁，善悲欲泣，小兒夜啼，不眠。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
183	柴胡加龍骨牡蠣湯	傷寒雜病論	半夏 3、大棗 2、柴胡 5、生薑 2、人參 2、龍骨 2、桂枝 2、茯苓 2、大黃 2.5、牡蠣 2、黃芩 2（一日飲片量 26.5 公克）。	和解少陽，鎮驚安神。	傷寒誤下後，胸滿，煩驚，譫語，一身儘重，不能轉側。
184	保產無憂方	驗方新編	厚朴 1.4、艾葉 1.4、當歸 3、川芎 3、荊芥 1.6、川貝母 2、菟絲子 2、羌活 1、甘草 1、枳殼 1.2、白芍 4、生薑 3、黃耆 1.6（一日飲片量 26.2 公克）。	補氣養血，安胎保產。	胎動不安。
185	當歸飲子	證治準繩	當歸 3、白芍 3、川芎 3、生地黃 3、白蒺藜 3、防風 3、荊芥 3、何首烏 1.5、黃耆 1.5、甘草 1.5、生薑 4.5（一日飲片量 30 公克）。	補氣益血，疏風除濕。	瘡疥風癬，濕毒搔癢。
186	寧嗽丸	中國醫學大辭典	桔梗 3、川石斛 3、半夏 3、川貝母 3、蘇子 3、茯苓 3、薄荷 2.3、杏仁 2.3、桑白皮 2.3、橘紅 1.5、穀芽 1.5、甘草 0.8（一日飲片量 28.7 公克）。	止咳寧嗽，清肺化痰。	咳嗽痰多氣急，痰白黏或色黃。
187	二陳湯	太平惠民和劑局方	半夏 8、陳皮 8、茯苓 5、炙甘草 2.5、生薑 2.5（一日飲片量 26 公克）。	燥濕化痰，理氣和中。	濕痰咳嗽，痰多色白，胸膈脹滿，噁心嘔吐，脾胃不和。

順序	方名	出典	處方	效能	適應症
188	桂枝芍藥知母湯	金匱要略	桂枝 4、白芍 3、甘草 2、麻黃 2、生薑 5、白朮 5、知母 4、防風 4、炮附子 2（一日飲片量 31 公克）。	祛風勝濕，溫經止痛。	風濕痺證，肢節腫痛，腳腫麻木，頭眩短氣，心煩欲吐。
189	蒼耳散	證治準繩	辛夷 8、蒼耳子 4、白芷 16、薄荷 1、蔥白 3、細茶 2（一日飲片量 34 公克）。	疏風，清熱。	鼻淵（鼻流濁涕不止）
190	柴胡清肝湯	醫宗金鑑	柴胡 3、生地黃 3、當歸 4、赤芍 3、川芎 2、連翹 2、牛蒡子 3、黃芩 2、山梔子 2、桔樓根 2、甘草節 2、防風 2（一日飲片量 30 公克）。	清肝疏風，瀉火解毒。	鬚疽初起，肝膽三焦風熱怒火之症。
191	托裏消毒飲	外科正宗	人參 3、川芎 3、白芍 3、黃耆 3、當歸 3、白朮 3、金銀花 3、茯苓 3、白芷 1.5、甘草 1.5、皂角刺 1.5、桔梗 1.5（一日飲片量 30 公克）。	補氣益血，托裏消毒。	瘡瘍氣血俱虛，托膿生肌。
192	桑螵蛸散	本草衍義	桑螵蛸 3、遠志 3、菖蒲 3、龍骨 3、人參 3、茯苓 3、當歸 3、龜板 3（一日飲片量 24 公克）。	調補心腎，固精止遺。	小便頻數，遺尿，滑精，精神恍惚，健忘。
193	溫清飲（解毒四物湯）	醫學入門	黃連 3.5、黃柏 3.5、黃芩 3.5、山梔子 3.5、當歸 3.5、川芎 3.5、白芍 3.5、熟地黃 3.5（一日飲片量 28 公克）。	清熱化濕，養血和營。	經水不止，面色萎黃，臍腹刺痛，崩漏。



順序	方名	出典	處方	效能	適應症
194	金鎖固精丸	醫方集解	沙苑蒺藜 6、芡實 6、蓮鬚 6、龍骨 3、牡蠣 3、蓮子 6（一日飲片量 30 公克）。	固 腎 濇 精。	腎虛，遺精，盜汗，腰痠耳鳴，四肢倦怠。
195	保和丸	丹溪心法	山楂 12、神麴 4、半夏 4、茯苓 4、陳皮 2、連翹 2、萊菔子 2（一日飲片量 30 公克）。	消 積 和 胃。	食積飲停，胸膈痞滿，噯氣吞酸，腹痛泄瀉。
196	胃苓湯	中國醫學大辭典	蒼朮 3、厚朴 3、陳皮 3、白朮 3、茯苓 3、澤瀉 2、豬苓 2、甘草 1.2、肉桂 1、生薑 3、大棗 2（一日飲片量 26.2 公克）。	祛 濕 化 滯，健脾和中。	中暑傷濕，停飲挾食，腹痛泄瀉，嘔吐肢痛，小便短少。
197	平胃散	太平惠民和劑局方	陳皮 5、厚朴 5、炙甘草 3、蒼朮 8、生薑 3、大棗 2（一日飲片量 26 公克）。	燥 濕 健 脾，理氣和中。	滯阻脾胃，脘腹脹滿，噯心嘔吐，噯氣吞酸。
198	白虎加人參湯	傷寒論	知母 6、石膏 16、炙甘草 2、粳米 8、人參 3（一日飲片量 35 公克）。	清熱、益氣、生津。	津氣兩傷、煩渴、中暑、身熱而渴，汗出惡寒。
199	抑肝散	證治準繩	柴胡 2.5、甘草 2.5、川芎 4、當歸 5、白朮 5、茯苓 5、鉤藤 5（一日飲片量 29 公克）。	清肝熱。	肝經虛熱、驚悸抽搐，嘔吐痰涎，腹脹少食，睡臥不安。
200	溫膽湯	中國醫學大辭典	半夏 5、竹茹 5、枳實 5、陳皮 7.5、生薑 5、甘草 2.5、茯苓 4、大棗 1（一日飲片量 35 公克）。	溫 膽 和 胃，除痰止嘔。	膽虛不眠，痰熱上擾，虛煩驚悸，口苦嘔涎。