



衛生福利部 109 年度內(外)科專科護理師甄審

【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

科目：進階專科護理（兒科組）

題號	47
題目	<p>關於法洛氏四重症(Tetralogy of Fallot)嬰兒出現高度發紺(hypoxic spells)時，下列處置何者最<u>不</u>適當？</p> <p>(A) 給予復甦姿勢(recovery posture)</p> <p>(B) 給予氧氣(oxygen support)</p> <p>(C) 注射 morphine 以減少過度換氣</p> <p>(D) 注射 propranolol 以減緩心跳</p>
公告答案	D
會議決議	<p>(A)給予復甦姿勢(recovery posture)對高度發紺幫助不大，應擺成 knee-chest position，可增加 SVR、讓血留在下肢，暫時減少全身回心血流，此外亦可使嬰兒可以被安撫下來減少耗氧</p> <p>(B)給予氧氣以改善氧合</p> <p>(C)給予 Morphine 藥物注射: 抑制呼吸中樞及減少過度換氣</p> <p>(D)注射 propranolol 可減緩心跳，減少耗氧，並增加回心血流</p> <p>出處： Nelson Textbook of Pediatrics (2020), 21th edition. p. 2396-2400.</p>
確認答案	A