

中華民國 97 年
臺北市生命(死因)統計

臺北市政府衛生局

中華民國 98 年 8 月編印

目 錄

壹、提要分析

貳、人口統計指標

表A・臺北市人口統計指標 — 行政區別.....	1
表B・臺北市歷年市民平均餘命一覽表.....	2
表C・臺北市歷年各年齡組年中人口數.....	3
表D・臺北市歷年各年齡組年中人口數 — 男性.....	4
表E・臺北市歷年各年齡組年中人口數 — 女性.....	5
表F・臺北市歷年各行政區年底人口數.....	6
表G・臺北市各行政區年齡別年底人口數	7
表H・臺北市歷年各行政區年中人口數.....	8
表I・臺北市各行政區年齡別年中人口數.....	9

參、97年死因統計

一、主要死因統計

表 1・臺北市、全國、高雄市主要死亡原因比較.....	11
表 2・ICD-10 全國縣市別死亡概況.....	12
表 3・ICD-10 臺北市主要死亡原因.....	13
表 4・ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況.....	14
表 5・ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況.....	15
表 6・ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況.....	16

表 7 · ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因	17
表 8 · ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因	18
表 9 · ICD-10 臺北市少年 (1-14歲)主要死亡原因	19
表10 · ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因	20
表11 · ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因	21
表12 · ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因	22
表13 · ICD-10 臺北市老年(65歲以上)主要死亡原因	23
表14 · ICD-10 臺北市意外事故死亡原因	24
表15 · ICD-10 臺北市男性意外事故死亡原因	25
表16 · ICD-10 臺北市女性意外事故死亡原因	26
表17 · ICD-10 臺北市運輸意外事故死亡原因	27
表18 · ICD-10 臺北市男性運輸意外事故死亡原因	28
表19 · ICD-10 臺北市女性運輸意外事故死亡原因	29
表20 · ICD-10 臺北市自殺死亡方式	30
表21 · ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式	31
表22 · ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式	32
表23 · ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因	33
表24 · ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況	34
表25 · ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況	35
表26 · ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況	36

二、行政區別死因統計

表 27-1～ 27-12・ICD-10 臺北市十二區主要死亡原因.....	37
表 28-1～ 28-12・ICD-10 臺北市十二區意外事故死亡原因.....	49
表 29-1～ 29-12・ICD-10 臺北市十二區自殺死亡方式.....	61
表 30-1～ 30-12・ICD-10 臺北市十二區主要癌症死亡原因.....	73

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表31・臺北市歷年主要死亡原因	85
表32・臺北市歷年男性主要死亡原因	88
表33・臺北市歷年女性主要死亡原因	91
表34・臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率.....	94
表35・臺北市歷年年齡結構別死亡率.....	95
表36・臺北市歷年意外事故死亡原因	96
表37・臺北市歷年男性意外事故死亡原因.....	98
表38・臺北市歷年女性意外事故死亡原因	100
表39・臺北市歷年自殺死亡方式.....	102
表40・臺北市歷年男性自殺死亡方式.....	104
表41・臺北市歷年女性自殺死亡方式.....	106
表42・臺北市歷年主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	108
表43・臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	110
表44・臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	112

表45・臺北市歷年主要癌症死亡原因	114
表46・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因	117
表47・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因	120
表48・臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	123
表49・臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	125
表50・臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準.....	127

二、行政區別死因統計

表51-1～51-12・臺北市十二區歷年主要死亡原因	129
表52-1～52-12・臺北市十二區歷年主要癌症死亡原因	165

伍、歷年主要癌症發生率

表53・臺北市歷年男性主要癌症發生率.....	201
表54・臺北市歷年女性主要癌症發生率.....	203

陸、附錄

【附錄1】推動抹片篩檢及早發現治療，子宮頸癌標準化死亡率較10年前降低四成.....	205
【附錄2】乳癌是臺北市女性最好發的癌症，發生率全臺最高.....	208
【附錄3】臺北市口腔癌死亡率，10年成長近七成.....	211
【附錄4】臺北市十大死因分類改採WHO第十版，慢性下呼吸道疾病首度進榜.....	215
【附錄5】ICD-10 臺北市、全國、高雄市及日本主要死亡原因比較.....	218
【附錄6】97年臺北市行政區別衛生統計指標.....	225


壹、提要分析

97 年臺北市主要死因提要說明

一、標準化死亡率較上年增加 0.74%，較 88 年則減少 15.63%

97 年臺北市市民死亡人數 1 萬 5,119 人，首度突破 1 萬 5 千人，平均每 34 分 46 秒就有一人死亡；粗死亡率為每十萬人口 575.72 人，分別較上(96)年增加 633 人、4.55%；如依世界衛生組織(WHO)編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 366.18 人，較上年增加 0.74%，較 88 年則減少 15.63%。若與全國相較，97 年臺北市標準化死亡率較全國低 24.4%，並在全國 25 縣市中，僅高於金門縣、連江縣，為死亡率第三低的縣市。

依近 10 年資料觀察，臺北市市民標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但死亡人數與粗死亡率則逐年增加，主要與臺北市人口結構日趨老化有關。88 年臺北市 64 歲以下人口 239 萬人，逐年遞減至 97 年 230 萬人，減幅為 3.9%，而 65 歲以上老年人口，則由 88 年 25 萬人，增至 97 年 32 萬人，增幅高達 29.6%；相對的 88 年 64 歲以下死亡人數為 3,799 人，至 97 年時略增為 3,915 人，增幅為 3.1%，而 65 歲以上死亡人數，則由 88 年 8,625 人，增至 97 年 1 萬 1,204 人，增幅高達 29.9%，顯示老年人口的增加為臺北市市民死亡人數成長之主因。(詳圖 1)




二、臺北市市民十大死因惡性腫瘤蟬連 36 年榜首

97 年臺北市市民死因分類配合衛生署改採 WHO 國際疾病傷害及死因分類標準第十版(ICD-10)，十大死因中惡性腫瘤仍蟬居榜首，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、敗血症、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病、意外事故及高血壓性疾病；十大死因之死亡人數占總死亡人數 76.45%，其中仍以惡性腫瘤占 29.55% 最多，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)占 13.32%、腦血管疾病占 7.93%。(詳表 1、圖 2)

表 1 ICD-10 97 年臺北市十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	15,119	100.00
1	惡性腫瘤	4,467	29.55
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2,014	13.32
3	腦血管疾病	1,199	7.93
4	肺炎	950	6.28
5	糖尿病	716	4.74
6	敗血症	513	3.39
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	491	3.25
8	慢性下呼吸道疾病	446	2.95
9	意外事故	389	2.57
10	高血壓性疾病	374	2.47
	其他	3,560	23.55



三、死亡年齡平均數較 88 年增加 4.3 歲

97 年臺北市市民死亡年齡平均數為 72.6 歲，較全國高 3.3 歲，與 88 年比較則增加 4.3 歲，其中男性死亡年齡平均數為 71.4 歲，女性為 74.2 歲，男性較女性低 2.8 歲；十大死因中死亡年齡平均數以慢性下呼吸道疾病 81.7 歲最高，肺炎 80.8 歲次之，最低為意外事故 56.4 歲。

若以死亡年齡中位數來看，97 年臺北市市民死亡年齡中位數為 77 歲，較全國高 3 歲，與 88 年比較則增加 4 歲，其中男性死亡年齡中位數為 76 歲，女性為 79 歲，男性較女性低 3 歲；十大死因中死亡年齡中位數以肺炎及慢性下呼吸道疾病 83 歲最高，敗血症 81 歲次之，最低為意外事故 59 歲。

表 2 ICD-10 97 年臺北市十大死因死亡年齡平均數、中位數

		單位：歲										
死因別		所有死因	惡性腫瘤	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	腦血管疾病	肺炎	糖尿病	敗血症	腎炎、腎病症候群及腎病變	慢性下呼吸道疾病	意外事故	高血壓性疾病
		死亡年齡平均數	死亡年齡平均數	死亡年齡平均數	死亡年齡平均數	死亡年齡平均數	死亡年齡平均數	死亡年齡平均數	死亡年齡平均數	死亡年齡平均數	死亡年齡平均數	死亡年齡平均數
死亡年齡平均數	兩性	72.6	69.2	74.9	76.3	80.8	75.2	79.0	76.2	81.7	56.4	78.0
	男性	71.4	69.9	72.6	74.1	79.8	73.1	77.3	75.4	81.3	54.2	74.9
	女性	74.2	68.1	78.9	79.2	82.6	77.3	80.8	77.0	83.1	61.4	81.7
死亡年齡中位數	兩性	77	72	79	79	83	77	81	79	83	59	80
	男性	76	73	78	77	82	75	80	79	83	55	79
	女性	79	70	82	82	85	78	83	79	86	67	82


四、臺北市男性十大死因慢性下呼吸道疾病首度進入為第 6 名

97 年臺北市男性死亡人數為 8,992 人，死亡率為每十萬男性人口 705.67 人，較上年增加 4.64%，標準化死亡率為每十萬男性人口 449.24 人，亦較上年增加 0.77%，較 88 年則減少 11.97%。

97 年男性十大死因之首仍為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、意外事故、敗血症、腎炎、腎病症候群及腎病變、蓄意自我傷害(自殺)；男性十大死因之死亡人數占男性總死亡人數 77.43%，其中仍以惡性腫瘤占 30.00%最多，其次為心臟疾病占 14.21%。(詳表 3、圖 3)

表 3 ICD-10 97 年臺北市男性十大死因

順位	死因	單位：人、%	
		死亡人數	死亡百分比
	所有死因	8,992	100.00
1	惡性腫瘤	2,698	30.00
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,278	14.21
3	腦血管疾病	677	7.53
4	肺炎	619	6.88
5	糖尿病	352	3.91
6	慢性下呼吸道疾病	337	3.75
7	意外事故	269	2.99
8	敗血症	263	2.92
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	240	2.67
10	蓄意自我傷害(自殺)	231	2.57
	其他	2,028	22.57



五、臺北市女性十大死因骨骼肌肉系統及結締組織之疾病首度進入為第 9 名


97 年臺北市女性死亡人數為 6,127 人，死亡率為每十萬女性人口 453.23 人，較上年增加 4.59%，標準化死亡率為每十萬女性人口 291.00 人，亦較上年增加 0.96%，較 88 年則減少 17.98%。

97 年女性十大死因之首亦為惡性腫瘤，其次依序為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、糖尿病、肺炎、腎炎、腎病症候群及腎病變、敗血症、高血壓性疾病、骨骼肌肉系統及結締組織之疾病、蓄意自我傷害(自殺)；女性十大死因死亡

人數占女性總死亡人數 76.39%，其中亦以惡性腫瘤占 28.87% 最多，其次為心臟疾病占 12.01%。(詳表 4、圖 4)

表 4 ICD-10 97 年臺北市女性十大死因

單位：人、%			
順位	死因	死亡人數	死亡百分比
	所有死因	6,127	100.00
1	惡性腫瘤	1,769	28.87
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	736	12.01
3	腦血管疾病	522	8.52
4	糖尿病	364	5.94
5	肺炎	331	5.40
6	腎炎、腎病症候群及腎病變	251	4.10
7	敗血症	250	4.08
8	高血壓性疾病	170	2.77
9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	149	2.43
10	蓄意自我傷害(自殺)	139	2.27
	其他	1,446	23.61



六、嬰兒(未滿 1 歲)死因之首為源於周產期的特定病況，占 5 成 1

97 年臺北市未滿 1 歲嬰兒死亡人數為 95 人，死亡率為每十萬人口 459.14 人，分別較上年增加 6 人、11.53%。男嬰死亡率為每十萬人口 475.97 人，較上年減少 7.17%；女嬰死亡率為 441.06 人，則較上年大幅增加 44.77%。嬰兒主要死因前 3 項分別為(1)源於周產期的特定病況 48 人占 50.53%，(2)先天性畸形變形及染色體異常 16 人占 16.84%，(3)肺炎 5 人占 5.26%，3 者合占嬰兒死亡人數的 72.63%。

七、少年(1-14 歲)意外事故居首位死因，占 2 成 5

97 年臺北市 1-14 歲少年死亡人數為 64 人，死亡率為每十萬人口 16.20 人，分別較上年增加 8 人、17.99%。少年主要死因前 3 項分別為(1)意外事故 16 人占 25.00%，(2)惡性腫瘤 11 人占 17.19%，(3)先天性畸形變形及染色體異常 9 人占 14.06%，3 者合占少年死亡人數的 56.25%。

八、青年(15-24 歲)意外事故仍居死因首位，占 3 成 1

97 年臺北市 15-24 歲青年死亡人數為 106 人，死亡率為每十萬人口 32.59 人，分別較上年減少 4 人、0.97%。青年主要死因前 3 項分別為(1)意外事故 33 人占 31.13%，(2)惡性腫瘤 16 人占 15.09%，(3)蓄意自我傷害(自殺)14 人占 13.21%，3 者合占青年死亡人數的 59.43%。

九、壯年(25-44 歲)死因之前二位仍為惡性腫瘤、自殺

97 年臺北市 25-44 歲壯年死亡人數為 798 人，死亡率為每十萬人口 96.39 人，分別較上年增加 38 人、6.18%。壯年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 228 人占 28.57%，(2)蓄意自我傷害(自殺)144 人占 18.05%，(3)心臟疾病(高血壓性疾病除外)88 人占 11.03%，3 者合占壯年死亡人數的 57.65%。

十、中年(45-64 歲)惡性腫瘤仍居死因首位，占 4 成 5


97 年臺北市 45-64 歲中年死亡人數為 2,852 人，死亡率為每十萬人口 386.04 人，與上年比較，死亡人數雖增加 63 人，但死亡率減少 0.28%。中年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 1,286 人占 45.09%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)334 人占 11.71%，(3)腦血管疾病 175 人占 6.14%，3 者合占中年死亡人數的 62.94%。

十一、老年(65 歲以上)死亡率仍以惡性腫瘤為首，占 2 成 6

97 年臺北市 65 歲以上老年死亡人數為 1 萬 1,204 人，占總死亡人數的 74.11%，死亡率為每十萬人口 3,515.04 人，較上年增加 2.17%。老年主要死因前 3 項分別為(1)惡性腫瘤 2,926 人占 26.12%，(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)1,577 人占 14.08%，(3)腦血管疾病 992 人占 8.85%，3 者合占老年死亡人數的 49.05%。

十二、12 行政區以大同區標準化死亡率最高，萬華區次之

97 年臺北市 12 行政區死亡率以萬華區每十萬人口 784.68 人最高，大同區 712.18 人次之，內湖區 444.46 人最低；標準化後則以大同區每十萬人口 452.82 人最高，萬華區 450.30 人次之，大安區 288.84 人最低。(詳圖 5)



十三、惡性腫瘤

(一)肺癌、肝癌、結腸直腸癌續居主要癌症死因前三位


97 年臺北市惡性腫瘤死亡人數為 4,467 人，占總死亡人數之 29.55%，死亡率為每十萬人口 170.10 人，較上年減少 1.99%；

標準化死亡率為每十萬人口 112.87 人，較上年亦減少 4.49%，較 88 年則減少 8.66%。

97 年臺北市十大癌症死因中肺癌續居榜首，其次依序為肝癌、結腸直腸癌、女性乳癌、胃癌、攝護腺癌、胰臟癌、子宮頸癌、口腔癌、非何杰金淋巴瘤；十大癌症死因死亡人數占總癌症死亡人數 75.87%，其中仍以肺癌占 20.77%最多，其次為肝癌占 15.69%、結腸直腸癌占 12.69%。（詳表 5、圖 6）

表 5. ICD-10 97 年臺北市十大癌症死因

單位：人、%			
順位	癌症死因	死亡人數	死亡百分比
	所有癌症死因	4,467	100.00
1	肺癌	928	20.77
2	肝癌	701	15.69
3	結腸直腸癌	567	12.69
4	女性乳癌	228	5.10
5	胃癌	312	6.98
6	攝護腺癌	124	2.78
7	胰臟癌	192	4.30
8	子宮頸癌	75	1.68
9	口腔癌	131	2.93
10	非何杰金淋巴瘤	131	2.93
	其他	1,078	24.13



(二)男性癌症標準化死亡率為女性 1.60 倍，但死亡年齡平均數女性較男性年輕 1.8 歲

97 年臺北市惡性腫瘤死亡人數男性 2,698 人、女性 1,769 人，標準化死亡率每十萬男性人口為 140.18 人、每十萬女性人口為 87.54 人，男性標準化死亡率為女性之 1.60 倍。

與上年相較，惡性腫瘤死亡人數男性減少 2.14%、女性減少 2.21%，標準化死亡率男性減少 4.33%，女性減少 4.58%。

97 年臺北市癌症死亡年齡平均數為 69.2 歲，較全國高 2.5 歲，與 88 年比較則增加 2.5 歲，其中男性死亡年齡平均數為 69.9 歲，女性為 68.1 歲。值得注意的是，男性癌症死亡率一向較女

性高，但女性癌症死亡年齡平均數卻反較男性低。97 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡平均數以攝護腺癌 79.5 歲最高，肺癌及非何杰金淋巴瘤 71.7 歲次之，最低為女性乳癌 59.1 歲。

若以癌症死亡年齡中位數來看，97 年臺北市癌症死亡年齡中位數為 72 歲，較全國高 3 歲，與 88 年比較則增加 2 歲，其中男性死亡年齡平均數為 73 歲，女性為 70 歲。97 年臺北市十大癌症死因中死亡年齡平均數以攝護腺癌 81 歲最高，胃癌及非何杰金淋巴瘤 76 歲次之，最低為女性乳癌 57 歲。（詳表 6）

表 6. ICD-10 97 年臺北市十大癌症死因死亡年齡平均數、中位數
單位：歲

死因別		所有癌症死因	肺癌	肝癌	結腸直腸癌	女性乳癌	胃癌	攝護腺癌	胰臟癌	子宮頸癌	口腔癌	非何杰金淋巴瘤
死亡年齡平均數	兩性	69.2	71.7	68.0	71.3	59.1	72.4	79.5	70.6	64.9	62.3	71.7
	男性	69.9	72.8	66.8	71.6	--	73.2	79.5	69.2	--	60.7	73.6
	女性	68.1	69.9	70.7	70.9	59.1	70.4	--	72.6	64.9	74.1	69.0
死亡年齡中位數	兩性	72	74	70	74	57	76	81	72	66	60	76
	男性	73	75	68	74	--	77	81	70.5	--	57	78
	女性	70	72	72	73	57	72	--	73	66	77.5	72

貳、人口統計指標

表A・臺北市人口統計指標——行政區別

中華民國97年

項 目		臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積 (平方公里)		271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度 (人/平方公里)		9,650	22,621	20,323	27,624	15,995	20,946	21,940	21,504	8,306	5,204	8,449	4,587	4,395
年底人口數(人)		2,622,923	210,097	227,770	313,848	218,841	159,337	124,653	190,361	261,719	113,672	266,808	286,065	249,752
男		1,270,948	99,694	110,435	148,315	103,630	77,129	61,723	95,729	127,422	56,354	129,257	139,660	121,600
女		1,351,975	110,403	117,335	165,533	115,211	82,208	62,930	94,632	134,297	57,318	137,551	146,405	128,152
男女性比例		94.01	90.30	94.12	89.60	89.95	93.82	98.08	101.16	94.88	98.32	93.97	95.39	94.89
出生數(人)		20,691	1,551	1,885	2,249	1,752	1,109	959	1,617	2,126	1,018	2,196	2,205	2,024
粗出生率(‰)		7.88	7.37	8.26	7.15	8.01	6.96	7.65	8.45	8.12	8.95	8.25	7.69	8.10
死亡數(人)		15,606	1,087	1,383	1,783	1,321	1,011	928	1,565	1,428	639	1,203	1,677	1,581
粗死亡率(‰)		5.94	5.16	6.06	5.67	6.04	6.34	7.40	8.18	5.46	5.62	4.52	5.85	6.33
人口增加率 (‰)		-2.41	-4.21	-4.80	-3.42	1.64	-0.93	-11.69	-10.96	0.20	-0.39	4.86	-3.42	-0.90
自然增加率		1.94	2.20	2.20	1.48	1.97	0.61	0.25	0.27	2.67	3.33	3.73	1.84	1.77
社會增加率		-4.35	-6.42	-7.00	-4.90	-0.33	-1.55	-11.94	-11.23	-2.46	-3.72	1.13	-5.27	-2.67
14歲以下 (年底)(a)	人口數	408,163	35,462	32,080	50,585	29,964	28,165	17,963	24,089	44,424	17,395	46,425	42,415	39,196
	%	15.56	16.88	14.08	16.12	13.69	17.68	14.41	12.65	16.97	15.30	17.40	14.83	15.69
15-64歲 (年底)(b)	人口數	1,891,785	147,953	165,897	218,362	161,109	109,306	90,021	137,658	187,620	83,783	198,083	209,518	182,475
	%	72.13	70.42	72.84	69.58	73.62	68.60	72.22	72.31	71.69	73.71	74.24	73.24	73.06
65歲以上 (年底)(c)	人口數	322,975	26,682	29,793	44,901	27,768	21,866	16,669	28,614	29,675	12,494	22,300	34,132	28,081
	%	12.31	12.70	13.08	14.31	12.69	13.72	13.37	15.03	11.34	10.99	8.36	11.93	11.24
扶養比(%)	(a+c)/b	38.65	42.00	37.30	43.73	35.83	45.77	38.47	38.29	39.49	35.67	34.70	36.53	36.87
扶幼比	a/b	21.58	23.97	19.34	23.17	18.60	25.77	19.95	17.50	23.68	20.76	23.44	20.24	21.48
扶老比	c/b	17.07	18.03	17.96	20.56	17.24	20.00	18.52	20.79	15.82	14.91	11.26	16.29	15.39
老化指數	c/a	79.13	75.24	92.87	88.76	92.67	77.64	92.80	118.78	66.80	71.83	48.03	80.47	71.64

附註:本表粗出生率、粗死亡率、自然增加率、社會增加率分母為年中人口數，人口增加率分母為年底人口數。

表B・臺北市歷年市民平均餘命一覽表

單位：歲

年	全國平均餘命			臺北市平均餘命		
	兩性	男	女	兩性	男	女
76	73.39	71.09	76.31	76.73	74.79	79.04
77	73.32	70.99	76.21	76.89	74.71	79.51
78	73.54	71.10	76.47	76.81	74.91	79.00
79	73.79	71.33	76.75	77.11	75.23	79.75
80	74.26	71.83	77.14	77.59	75.88	80.22
81	74.26	71.78	77.19	77.85	75.95	80.54
82	74.28	71.61	77.52	78.01	75.99	80.83
83	74.50	71.81	77.76	78.20	76.18	80.94
84	74.53	71.85	77.74	78.36	76.18	81.07
85	74.95	72.38	78.05	78.74	76.62	81.24
86	75.54	72.97	78.61	79.01	77.16	81.05
87	75.76	73.12	78.93	79.56	77.39	82.11
88	75.90	73.33	78.98	79.87	77.86	82.17
89	76.46	73.83	79.56	80.12	78.07	82.44
90	76.75	74.07	79.92	80.25	78.21	82.52
91	77.19	74.58	80.24	80.70	78.74	82.82
92	77.35	74.77	80.33	80.91	78.99	82.95
93	77.48	74.68	80.75	81.36	79.03	83.85
94	77.42	74.50	80.80	81.21	78.77	83.86
95	77.90	74.86	81.41	81.79	79.40	84.32
96	78.38	75.46	81.72	82.00	79.69	84.42

資料來源：內政部。

表C・臺北市歷年各年齡組年中人口數

年 別	總 計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
				人	數	(人)		
81年	2,707,032	34,635	154,184	456,370	436,626	1,000,272	433,644	191,300
82年	2,674,659	31,655	148,364	442,810	430,118	989,990	432,846	198,876
83年	2,653,412	28,568	142,276	426,584	426,730	982,886	438,998	207,368
84年	2,643,220	29,588	137,968	410,023	423,759	973,080	451,476	217,327
85年	2,619,118	32,054	137,613	389,940	417,197	949,857	467,310	225,148
86年	2,601,934	33,440	140,594	371,846	411,205	925,845	487,380	231,622
87年	2,619,216	31,972	146,107	360,210	410,841	917,777	512,987	239,322
88年	2,640,626	30,322	147,656	353,184	410,947	912,922	539,258	246,338
89年	2,643,893	32,020	143,268	347,754	407,015	898,031	563,238	252,566
90年	2,640,138	29,318	138,255	346,070	396,896	882,758	587,962	258,878
91年	2,637,829	25,358	130,436	345,995	385,390	871,742	612,566	266,343
92年	2,634,497	23,872	122,373	340,662	376,934	860,954	635,342	274,360
93年	2,624,805	22,098	115,610	333,386	365,398	849,821	656,319	282,174
94年	2,619,424	20,858	106,020	329,182	354,222	841,903	676,350	290,888
95年	2,624,309	20,255	97,844	322,973	344,320	839,559	698,492	300,867
96年	2,630,756	20,497	93,288	314,682	334,216	837,173	720,426	310,474
97年	2,626,096	20,251	90,589	304,529	325,271	827,928	738,785	318,745
				百	分	比	(%)	
81年	100.00	1.18	5.55	16.56	16.08	37.01	16.18	7.44
82年	100.00	1.08	5.36	16.08	16.08	37.04	16.54	7.82
83年	100.00	1.12	5.22	15.51	16.03	36.81	17.08	8.22
84年	100.00	1.22	5.25	14.89	15.93	36.27	17.84	8.60
85年	100.00	1.22	5.25	14.89	15.93	36.27	17.84	8.60
86年	100.00	1.29	5.40	14.29	15.80	35.58	18.73	8.90
87年	100.00	1.22	5.58	13.75	15.69	35.04	19.59	9.14
88年	100.00	1.15	5.59	13.38	15.56	34.57	20.42	9.33
89年	100.00	1.21	5.42	13.15	15.39	33.97	21.30	9.55
90年	100.00	1.11	5.24	13.11	15.03	33.44	22.27	9.81
91年	100.00	0.96	4.94	13.12	14.61	33.05	23.22	10.10
92年	100.00	0.91	4.65	12.93	14.31	32.68	24.12	10.41
93年	100.00	0.84	4.40	12.70	13.92	32.38	25.00	10.75
94年	100.00	0.80	4.05	12.57	13.52	32.14	25.82	11.11
95年	100.00	0.77	3.73	12.31	13.12	31.99	26.62	11.46
96年	100.00	0.78	3.55	11.96	12.70	31.82	27.38	11.80
97年	100.00	0.77	3.45	11.60	12.39	31.53	28.13	12.14

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表D・臺北市歷年各年齡組年中人口數 — 男性

年 別	男性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
				人	數	(人)		
81年	1,363,235	18,008	80,142	235,574	220,119	481,786	219,962	107,645
82年	1,344,560	16,451	77,434	229,305	217,490	474,696	216,934	112,249
83年	1,330,909	15,056	74,562	221,408	216,396	468,274	217,529	117,686
84年	1,323,509	15,640	72,532	213,366	215,120	462,195	220,982	123,674
85年	1,309,828	16,681	72,228	203,401	212,098	451,056	226,730	127,633
86年	1,298,943	17,305	73,486	194,279	209,224	439,419	235,004	130,226
87年	1,303,713	16,660	76,156	188,388	208,594	434,396	246,376	133,144
88年	1,310,612	15,856	76,884	184,892	208,242	430,770	258,408	135,558
89年	1,309,371	16,720	74,534	182,362	206,281	422,652	269,650	137,171
90年	1,304,744	15,220	71,983	181,646	201,185	414,977	281,327	138,405
91年	1,300,818	13,180	67,972	181,472	195,538	409,614	292,702	140,340
92年	1,296,600	12,442	63,700	178,713	191,624	404,398	303,168	142,554
93年	1,289,022	11,571	60,098	174,960	186,351	399,102	312,512	144,428
94年	1,282,908	11,007	55,113	172,464	181,326	395,113	321,267	146,618
95年	1,281,102	10,599	51,037	168,671	176,781	393,448	331,205	149,362
96年	1,280,124	10,599	48,784	163,958	171,984	391,825	340,865	152,110
97年	1,274,252	10,466	47,357	158,589	167,692	387,224	348,609	154,316
				百	分	比	(%)	
81年	100.00	1.22	5.76	17.05	16.18	35.30	16.13	8.35
82年	100.00	1.13	5.60	16.64	16.26	35.18	16.34	8.84
83年	100.00	1.18	5.48	16.12	16.25	34.92	16.70	9.34
84年	100.00	1.27	5.51	15.53	16.19	34.44	17.31	9.74
85年	100.00	1.27	5.51	15.53	16.19	34.44	17.31	9.74
86年	100.00	1.33	5.66	14.96	16.11	33.83	18.09	10.03
87年	100.00	1.28	5.84	14.45	16.00	33.32	18.90	10.21
88年	100.00	1.21	5.87	14.11	15.89	32.87	19.72	10.34
89年	100.00	1.28	5.69	13.93	15.75	32.28	20.59	10.48
90年	100.00	1.17	5.52	13.92	15.42	31.81	21.56	10.61
91年	100.00	1.01	5.23	13.95	15.03	31.49	22.50	10.79
92年	100.00	0.96	4.91	13.78	14.78	31.19	23.38	10.99
93年	100.00	0.90	4.66	13.57	14.46	30.96	24.24	11.20
94年	100.00	0.86	4.30	13.44	14.13	30.80	25.04	11.43
95年	100.00	0.83	3.98	13.17	13.80	30.71	25.85	11.66
96年	100.00	0.83	3.81	12.81	13.43	30.61	26.63	11.88
97年	100.00	0.82	3.72	12.45	13.16	30.39	27.36	12.11

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表E・臺北市歷年各年齡組年中人口數—女性

年 別	女性總計	0 歲	1 - 4歲	5 - 14歲	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
				人	數	(人)		
81年	1,343,798	16,627	74,043	220,796	216,507	518,487	213,682	83,656
82年	1,330,099	15,204	70,930	213,506	212,628	515,294	215,912	86,626
83年	1,322,502	13,512	67,715	205,177	210,334	514,613	221,468	89,682
84年	1,319,712	13,948	65,436	196,658	208,640	510,885	230,494	93,652
85年	1,309,291	15,373	65,385	186,538	205,099	498,800	240,580	97,516
86年	1,302,990	16,135	67,109	177,568	201,980	486,426	252,376	101,396
87年	1,315,503	15,312	69,952	171,822	202,248	483,382	266,612	106,177
88年	1,330,014	14,466	70,771	168,292	202,706	482,152	280,849	110,779
89年	1,334,522	15,300	68,734	165,392	200,734	475,379	293,588	115,395
90年	1,335,394	14,098	66,272	164,424	195,711	467,780	306,636	120,474
91年	1,337,010	12,178	62,463	164,524	189,852	462,128	319,864	126,003
92年	1,337,897	11,430	58,672	161,949	185,310	456,556	332,174	131,806
93年	1,335,782	10,528	55,511	158,426	179,046	450,720	343,807	137,746
94年	1,336,516	9,850	50,907	156,718	172,896	446,790	355,084	144,270
95年	1,343,207	9,656	46,807	154,302	167,539	446,111	367,287	151,505
96年	1,350,632	9,898	44,504	150,725	162,232	445,348	379,562	158,364
97年	1,351,844	9,786	43,232	145,940	157,579	440,704	390,176	164,429
				百	分	比	(%)	
81年	100.00	1.14	5.33	16.05	15.99	38.74	16.23	6.51
82年	100.00	1.02	5.12	15.51	15.90	38.91	16.75	6.78
83年	100.00	1.06	4.96	14.90	15.81	38.71	17.47	7.10
84年	100.00	1.17	4.99	14.25	15.66	38.10	18.37	7.45
85年	100.00	1.17	4.99	14.25	15.66	38.10	18.37	7.45
86年	100.00	1.24	5.15	13.63	15.50	37.33	19.37	7.78
87年	100.00	1.16	5.32	13.06	15.37	36.75	20.27	8.07
88年	100.00	1.09	5.32	12.65	15.24	36.25	21.12	8.33
89年	100.00	1.15	5.15	12.39	15.04	35.62	22.00	8.65
90年	100.00	1.06	4.96	12.31	14.66	35.03	22.96	9.02
91年	100.00	0.91	4.67	12.31	14.20	34.56	23.92	9.42
92年	100.00	0.85	4.39	12.10	13.85	34.12	24.83	9.85
93年	100.00	0.79	4.16	11.86	13.40	33.74	25.74	10.31
94年	100.00	0.74	3.81	11.73	12.94	33.43	26.57	10.79
95年	100.00	0.72	3.48	11.49	12.47	33.21	27.34	11.28
96年	100.00	0.73	3.30	11.16	12.01	32.97	28.10	11.73
97年	100.00	0.72	3.20	10.80	11.66	32.60	28.86	12.16

附 註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表F・臺北市歷年各行政區年底人口數

單位：人

行政區別	81年底	82年底	83年底	84年底	85年底	86年底	87年底	88年底	89年底	90年底	91年底	92年底	93年底	94年底	95年底	96年底	97年底
臺北市	2,696,073	2,653,245	2,653,578	2,632,863	2,605,374	2,598,493	2,639,939	2,641,312	2,646,474	2,633,802	2,641,856	2,627,138	2,622,472	2,616,375	2,632,242	2,629,269	2,622,923
松山區	213,639	213,090	213,496	211,064	209,932	205,823	208,198	207,615	207,303	205,031	205,289	205,593	205,962	208,101	209,422	210,986	210,097
信義區	247,726	245,255	246,925	243,780	240,212	239,888	242,500	241,917	240,294	237,530	237,362	234,590	232,506	230,780	231,476	228,868	227,770
大安區	341,765	335,993	337,309	329,516	317,201	314,217	319,003	317,110	316,977	315,818	315,714	313,011	312,554	312,166	314,171	314,924	313,848
中山區	232,683	226,775	226,566	221,585	215,980	212,238	215,168	214,652	215,532	216,043	217,569	216,999	216,868	216,906	219,582	218,483	218,841
中正區	181,233	175,261	174,708	170,853	166,892	164,955	166,532	165,324	163,090	161,635	161,808	159,599	158,486	157,335	158,604	159,486	159,337
大同區	147,505	140,922	138,170	135,098	134,183	133,661	134,563	133,503	132,694	131,343	131,077	129,440	128,512	126,810	126,923	126,128	124,653
萬華區	228,384	220,896	217,632	213,983	211,091	208,464	209,780	207,943	206,855	204,024	203,451	200,266	197,445	194,743	194,879	192,470	190,361
文山區	226,295	223,822	223,003	227,707	229,992	235,361	243,939	248,602	253,131	253,920	256,528	256,506	258,046	258,953	261,417	261,666	261,719
南港區	117,698	115,177	113,412	112,411	111,733	110,982	112,699	113,070	114,144	113,937	113,839	113,122	112,982	113,052	113,258	113,716	113,672
內湖區	215,529	216,149	219,951	226,055	231,972	237,349	244,642	249,588	253,584	254,521	258,611	259,789	261,201	261,837	264,624	265,518	266,808
士林區	301,068	298,419	299,127	298,255	294,405	293,731	296,810	295,209	294,443	292,096	291,493	289,194	288,921	287,753	288,212	287,048	286,065
北投區	242,548	241,486	243,279	242,556	241,781	241,824	246,105	246,779	248,427	247,904	249,115	249,029	248,989	247,939	249,674	249,976	249,752

表G・臺北市各行政區年齡別年底人口數

中華民國97年底

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
97年底人口數	2,622,923	210,097	227,770	313,848	218,841	159,337	124,653	190,361	261,719	113,672	266,808	286,065	249,752
0歲	19,755	1,496	1,797	2,188	1,646	1,101	909	1,509	2,021	956	2,112	2,096	1,924
1-4	89,806	7,118	7,692	10,413	7,082	5,502	4,128	6,207	9,617	4,246	9,582	9,560	8,659
5-9	133,506	11,862	10,460	16,879	9,677	9,302	5,848	7,674	14,658	5,789	15,123	13,524	12,710
10-14	165,096	14,986	12,131	21,105	11,559	12,260	7,078	8,699	18,128	6,404	19,608	17,235	15,903
15-19	159,899	12,122	13,476	17,470	12,319	9,266	7,366	10,806	16,426	7,251	19,803	17,698	15,896
20-24	161,282	11,461	14,185	16,514	12,913	8,706	7,776	12,164	15,762	7,784	18,607	19,000	16,410
25-29	196,647	13,636	17,721	19,952	16,706	10,281	9,942	16,136	18,686	9,695	20,480	23,167	20,245
30-34	199,686	14,931	18,198	21,125	17,091	11,041	9,977	15,732	19,823	9,975	19,450	22,358	19,985
35-39	207,292	16,604	18,108	23,858	17,418	12,298	9,709	14,552	22,213	9,498	21,204	21,590	20,240
40-44	218,919	18,272	18,249	26,498	18,395	13,548	9,916	14,457	23,790	9,249	24,010	22,424	20,111
45-49	224,487	17,846	18,953	26,446	19,347	13,410	10,329	15,553	22,887	9,214	25,593	24,096	20,813
50-54	218,263	17,123	18,900	25,928	19,397	12,307	10,259	15,582	20,673	8,771	23,875	24,881	20,567
55-59	192,470	15,864	17,463	24,799	17,503	11,446	9,280	14,111	17,334	7,929	16,979	21,877	17,885
60-64	112,840	10,094	10,644	15,772	10,020	7,003	5,467	8,565	10,026	4,417	8,082	12,427	10,323
65-69	98,086	8,167	9,064	13,181	8,540	6,137	5,300	8,577	8,556	4,122	6,622	10,899	8,921
70-74	75,143	5,974	6,566	9,902	6,803	5,125	4,487	6,876	6,580	3,022	5,194	8,173	6,441
75-79	64,561	5,167	5,933	8,714	5,704	4,305	3,248	5,899	6,028	2,407	4,770	6,769	5,617
80-84	49,242	4,183	4,814	7,120	3,972	3,369	1,986	4,351	5,048	1,776	3,513	4,878	4,232
85-89	25,099	2,247	2,434	4,080	1,915	1,934	1,100	2,059	2,480	832	1,614	2,373	2,031
90-94	8,233	730	750	1,437	629	693	390	648	777	270	474	798	637
95-99	2,132	170	184	408	168	225	118	159	167	60	101	206	166
100歲以上	479	44	48	59	37	78	40	45	39	5	12	36	36

表H・臺北市歷年各行政區年中人口數

單位：人

行政區別	81年	82年	83年	84年	85年	86年	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年
臺北市	2,707,032	2,674,659	2,653,412	2,643,220	2,619,118	2,601,934	2,619,216	2,640,626	2,643,893	2,640,138	2,637,829	2,634,497	2,624,805	2,619,424	2,624,309	2,630,756	2,626,096
松山區	215,496	213,364	213,293	212,280	210,498	207,878	207,010	207,906	207,459	206,167	205,160	205,441	205,778	207,032	208,762	210,204	210,542
信義區	246,586	246,490	246,090	245,352	241,996	240,050	241,194	242,208	241,106	238,912	237,446	235,976	233,548	231,643	231,128	230,172	228,319
大安區	346,936	338,879	336,651	333,412	323,358	315,709	316,610	318,056	317,044	316,398	315,766	314,362	312,782	312,360	313,169	314,548	314,386
中山區	234,323	229,729	226,670	224,076	218,782	214,109	213,703	214,910	215,092	215,788	216,806	217,284	216,934	216,887	218,244	219,033	218,662
中正區	182,450	178,247	174,984	172,780	168,872	165,924	165,744	165,928	164,207	162,362	161,722	160,704	159,042	157,911	157,970	159,045	159,412
大同區	148,661	144,214	139,546	136,634	134,640	133,922	134,112	134,033	133,098	132,018	131,210	130,258	128,976	127,661	126,867	126,526	125,391
萬華區	229,592	224,640	219,264	215,808	212,537	209,778	209,122	208,862	207,399	205,440	203,738	201,858	198,856	196,094	194,811	193,675	191,416
文山區	226,025	225,058	223,412	225,355	228,850	232,676	239,650	246,270	250,866	253,526	255,224	256,517	257,276	258,500	260,185	261,542	261,693
南港區	117,731	116,438	114,294	112,912	112,072	111,358	111,840	112,884	113,607	114,040	113,888	113,480	113,052	113,017	113,155	113,487	113,694
內湖區	215,140	215,839	218,050	223,003	229,014	234,660	240,996	247,115	251,586	254,052	256,566	259,200	260,495	261,519	263,231	265,071	266,163
士林區	300,790	299,744	298,773	298,691	296,330	294,068	295,270	296,010	294,826	293,270	291,794	290,344	289,058	288,337	287,983	287,630	286,557
北投區	243,302	242,017	242,382	242,918	242,168	241,802	243,964	246,442	247,603	248,166	248,510	249,072	249,009	248,464	248,807	249,825	249,864

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

表I・臺北市各行政區年齡別年中人口數

中華民國97年中

單位：人

年齡別	總計	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
97年中人口數	2,626,096	210,542	228,319	314,386	218,662	159,412	125,391	191,416	261,693	113,694	266,163	286,557	249,864
0歲	20,251	1,530	1,785	2,245	1,647	1,144	936	1,536	2,149	998	2,167	2,139	1,978
1-4	90,589	7,231	7,796	10,423	7,161	5,502	4,201	6,335	9,692	4,298	9,598	9,664	8,692
5-9	136,176	12,072	10,711	17,157	9,913	9,419	5,959	7,892	14,953	5,905	15,459	13,841	12,897
10-14	168,353	15,363	12,514	21,465	11,750	12,377	7,208	8,916	18,403	6,510	20,018	17,608	16,223
15-19	161,446	12,233	13,605	17,609	12,390	9,327	7,508	10,970	16,465	7,378	19,912	17,973	16,078
20-24	163,825	11,584	14,432	16,821	13,102	8,874	7,917	12,520	16,016	7,855	18,751	19,323	16,633
25-29	198,270	13,806	17,919	20,179	16,821	10,412	10,127	16,388	18,807	9,833	20,228	23,379	20,372
30-34	199,214	14,958	18,171	21,250	16,995	11,001	10,006	15,684	19,827	9,954	19,261	22,182	19,929
35-39	209,728	16,859	18,247	24,169	17,646	12,410	9,862	14,735	22,564	9,510	21,511	21,853	20,364
40-44	220,717	18,327	18,530	26,686	18,549	13,632	10,018	14,684	23,822	9,259	24,424	22,605	20,185
45-49	225,051	17,890	19,032	26,490	19,431	13,390	10,402	15,646	22,781	9,174	25,659	24,268	20,890
50-54	217,796	17,140	18,850	26,023	19,385	12,290	10,290	15,509	20,536	8,775	23,460	24,925	20,616
55-59	187,003	15,594	17,038	24,340	16,925	11,219	9,031	13,815	16,784	7,675	16,083	21,198	17,304
60-64	108,935	9,693	10,281	15,213	9,648	6,747	5,360	8,376	9,662	4,286	7,694	12,014	9,964
65-69	96,323	7,983	8,832	12,865	8,387	6,052	5,323	8,505	8,373	4,056	6,495	10,719	8,736
70-74	74,182	5,905	6,505	9,776	6,705	5,048	4,447	6,837	6,467	2,949	5,115	8,056	6,376
75-79	65,113	5,207	6,018	8,812	5,700	4,345	3,203	5,963	6,156	2,441	4,822	6,764	5,685
80-84	48,386	4,104	4,783	7,080	3,863	3,335	1,976	4,286	4,932	1,721	3,397	4,767	4,144
85-89	24,184	2,161	2,332	3,951	1,843	1,904	1,070	1,988	2,363	804	1,537	2,268	1,967
90-94	8,003	698	726	1,384	604	686	390	630	743	260	465	786	633
95-99	2,035	162	166	380	158	218	120	162	163	53	99	192	165
100歲以上	521	46	51	73	44	86	42	45	40	6	13	40	39

附註：部分數字因尾數四捨五入，故總數與細數之間，或有未能吻合情事。

參、97 年死因統計

一、主要死因統計

表1・ICD-10 臺北市、全國、高雄市主要死亡原因比較

中華民國97年

單位：順位、人、人/每十萬人口、%

疾病碼 ICD 10	死亡原因	臺北市				全國				高雄市			
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比
A00-Y98	所有死亡原因		15,119	575.72	100.00		142,283	618.68	100.00		9,017	592.02	100.00
C00-C97	惡性腫瘤	1	4,467	170.10	29.55	1	38,913	169.20	27.35	1	2,694	176.88	29.88
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	2,014	76.69	13.32	2	15,726	68.38	11.05	2	859	56.40	9.53
I60-I69	腦血管疾病	3	1,199	45.66	7.93	3	10,663	46.37	7.49	4	568	37.29	6.30
J12-J18	肺炎	4	950	36.18	6.28	4	8,661	37.66	6.09	3	637	41.82	7.06
E10-E14	糖尿病	5	716	27.26	4.74	5	8,036	34.94	5.65	5	542	35.59	6.01
A40-A41	敗血症	6	513	19.53	3.39	11	3,534	15.37	2.48	12	180	11.82	2.00
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	491	18.70	3.25	10	4,012	17.45	2.82	10	255	16.74	2.83
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	446	16.98	2.95	7	5,374	23.37	3.78	6	328	21.54	3.64
V01-X59, Y85-Y86	意外事故	9	389	14.81	2.57	6	7,077	30.77	4.97	7	321	21.08	3.56
I10-I15	高血壓性疾病	10	374	14.24	2.47	12	3,507	15.25	2.46	11	184	12.08	2.04
	其他		3,560	135.56	23.55		36,780	159.93	25.85		2,449	160.79	27.16
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	370	14.09	2.45	9	4,128	17.95	2.90	8	290	19.04	3.22
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	296	11.27	1.96	8	4,917	21.38	3.46	9	286	18.78	3.17
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	281	10.70	1.86	14	1,282	5.57	0.90	14	51	3.35	0.57
G20-G21	帕金森病	14	93	3.54	0.62	19	544	2.37	0.38	18	37	2.43	0.41
J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況 （塵肺症及肺炎除外）	15	76	2.89	0.50	17	603	2.62	0.42	19	35	2.30	0.39

表 2. ICD-10 全國縣市別死亡概況

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

縣市別	合 計			男 性			女 性		
	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率	死亡數	死亡率	標準化死亡率
全 國	142,283	618.7	484.3	87,682	754.7	608.6	54,601	479.8	362.5
臺北市	15,119	575.7	366.2	8,992	705.7	449.2	6,127	453.2	291.0
高雄市	9,017	592.0	500.2	5,542	732.2	616.3	3,475	453.6	388.9
基隆市	2,621	672.6	508.6	1,590	805.8	626.0	1,031	536.0	395.4
新竹市	2,196	546.0	449.5	1,391	691.9	577.0	805	400.2	328.4
臺中市	4,993	470.6	448.3	2,987	576.5	542.3	2,006	369.5	362.4
臺南市	4,355	568.1	490.9	2,638	692.5	616.3	1,717	445.3	372.9
嘉義市	1,639	599.4	469.5	973	719.7	586.3	666	481.8	363.2
臺北縣	17,787	466.1	443.5	11,119	583.3	550.4	6,668	349.2	340.1
桃園縣	9,599	493.1	458.8	6,322	640.9	571.8	3,277	341.2	342.5
新竹縣	3,242	649.0	495.1	2,003	775.5	615.6	1,239	513.6	370.9
宜蘭縣	3,373	732.2	513.1	2,084	883.4	655.8	1,289	573.5	368.9
苗栗縣	4,258	760.0	508.9	2,620	895.9	651.7	1,638	611.6	360.7
臺中縣	8,690	559.1	516.8	5,351	676.9	637.5	3,339	437.1	396.6
彰化縣	8,690	661.5	491.2	5,246	775.0	642.5	3,444	540.9	345.1
南投縣	4,261	799.8	547.1	2,566	930.9	688.2	1,695	659.3	401.9
雲林縣	6,471	893.0	573.2	3,865	1016.4	754.7	2,606	756.6	394.5
嘉義縣	4,917	893.9	543.0	2,933	1017.4	699.5	1,984	758.0	382.9
臺南縣	8,629	780.9	533.0	5,196	917.3	681.9	3,433	637.5	389.0
高雄縣	8,418	676.8	549.5	5,410	845.3	696.3	3,008	498.2	398.8
屏東縣	7,488	844.0	613.1	4,678	1020.6	784.1	2,810	655.3	438.2
澎湖縣	756	814.2	468.0	453	945.8	602.1	303	674.1	330.9
花蓮縣	3,135	915.7	650.2	2,047	1151.9	823.3	1,088	660.7	468.1
臺東縣	2,188	940.1	656.7	1,432	1167.8	837.7	756	686.4	464.1
金門縣	404	486.4	308.0	218	495.3	367.3	186	476.4	244.7
連江縣	37	375.6	295.5	26	453.5	412.9	11	267.1	137.9

資料來源：行政院衛生署。

附 註：標準化死亡率係以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準。

表3・ICD-10 臺北市主要死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死亡率	死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	15,119	575.72	100.00	所有死亡原因	8,992	705.67	100.00	所有死亡原因	6,127	453.23	100.00
1	惡性腫瘤	4,467	170.10	29.55	惡性腫瘤	2,698	211.73	30.00	惡性腫瘤	1,769	130.86	28.87
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,014	76.69	13.32	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1,278	100.29	14.21	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	736	54.44	12.01
3	腦血管疾病	1,199	45.66	7.93	腦血管疾病	677	53.13	7.53	腦血管疾病	522	38.61	8.52
4	肺炎	950	36.18	6.28	肺炎	619	48.58	6.88	糖尿病	364	26.93	5.94
5	糖尿病	716	27.26	4.74	糖尿病	352	27.62	3.91	肺炎	331	24.49	5.40
6	敗血症	513	19.53	3.39	慢性下呼吸道疾病	337	26.45	3.75	腎炎、腎病症候群及腎病變	251	18.57	4.10
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	491	18.70	3.25	意外事故	269	21.11	2.99	敗血症	250	18.49	4.08
8	慢性下呼吸道疾病	446	16.98	2.95	敗血症	263	20.64	2.92	高血壓性疾病	170	12.58	2.77
9	意外事故	389	14.81	2.57	腎炎、腎病症候群及腎病變	240	18.83	2.67	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	149	11.02	2.43
10	高血壓性疾病	374	14.24	2.47	蓄意自我傷害（自殺）	231	18.13	2.57	蓄意自我傷害（自殺）	139	10.28	2.27
	其他	3,560	135.56	23.55	其他	2,028	159.15	22.55	其他	1,446	106.97	23.60
11	蓄意自我傷害（自殺）	370	14.09	2.45	高血壓性疾病	204	16.01	2.27	意外事故	120	8.88	1.96
12	慢性肝病及肝硬化	296	11.27	1.96	慢性肝病及肝硬化	197	15.46	2.19	慢性下呼吸道疾病	109	8.06	1.78
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	281	10.70	1.86	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	132	10.36	1.47	慢性肝病及肝硬化	99	7.32	1.62
14	帕金森病	93	3.54	0.62	結核病	56	4.39	0.62	血管性及未明示之癱瘓症	38	2.81	0.62
15	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	76	2.89	0.50	帕金森病	56	4.39	0.62	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	38	2.81	0.62

附註：臺北市年中人口數為2,626,096人，其中男性為1,274,252人，女性為1,351,844人。

表4・ICD-10 臺北市主要死因年齡別死亡概況

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾 病 碼	死 亡 原 因	合 計		0 歲		1 - 4歲		5 - 14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
			死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬
			人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
	A00-Y98	所有死亡原因	15,119	575.72	95	469.11	21	23.18	43	14.12	106	32.59	798	96.39	2,852	386.04	11,204	3,515.04
1	C00-C97	惡性腫瘤	4,467	170.10	-	-	1	1.10	10	3.28	16	4.92	228	27.54	1,286	174.07	2,926	917.98
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,014	76.69	2	9.88	3	3.31	4	1.31	6	1.84	88	10.63	334	45.21	1,577	494.75
3	I60-I69	腦血管疾病	1,199	45.66	-	-	1	1.10	-	-	1	0.31	30	3.62	175	23.69	992	311.22
4	J12-J18	肺炎	950	36.18	5	24.69	-	-	-	-	2	0.61	10	1.21	62	8.39	871	273.26
5	E10-E14	糖尿病	716	27.26	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1.69	107	14.48	595	186.67
6	A40-A41	敗血症	513	19.53	2	9.88	-	-	1	0.33	-	-	12	1.45	42	5.69	456	143.06
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	491	18.70	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.97	78	10.56	405	127.06
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	446	16.98	1	4.94	1	1.10	-	-	-	-	5	0.60	14	1.90	425	133.34
9	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	389	14.81	3	14.81	4	4.42	12	3.94	33	10.15	76	9.18	90	12.18	171	53.65
10	I10-I15	高血壓性疾病	374	14.24	-	-	-	-	-	-	1	0.31	5	0.60	41	5.55	327	102.59
		其他	3,560	135.56	82	404.92	11	12.14	16	5.25	47	14.45	322	38.89	623	84.33	2,459	771.46
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	370	14.09	-	-	-	-	1	0.33	14	4.30	144	17.39	127	17.19	84	26.35
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	296	11.27	-	-	-	-	-	-	-	-	30	3.62	106	14.35	160	50.20
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	281	10.70	-	-	-	-	-	-	3	0.92	12	1.45	31	4.20	235	73.73
14	G20-G21	帕金森病	93	3.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.41	90	28.24
15	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	76	2.89	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.24	5	0.68	69	21.65

附註：臺北市年中人口數為2,626,096人。

表5・ICD-10 臺北市男性主要死因年齡別死亡概況

中華民國97年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾 病 碼	死 亡 原 因	合 計		0 歲		1 - 4歲		5 - 14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
			死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率
	A00-Y98	所有死亡原因	8,992	705.67	51	487.32	7	14.78	29	18.29	74	44.13	523	135.06	1,867	535.56	6,441	4,173.90
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,698	211.73	-	-	-	-	6	3.78	12	7.16	116	29.96	744	213.42	1,820	1,179.40
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）	1,278	100.29	2	19.11	-	-	2	1.26	5	2.98	76	19.63	274	78.60	919	595.53
3	I60-I69	腦血管疾病	677	53.13	-	-	-	-	-	-	1	0.60	23	5.94	118	33.85	535	346.69
4	J12-J18	肺炎	619	48.58	3	28.67	-	-	-	-	-	-	8	2.07	44	12.62	564	365.48
5	E10-E14	糖尿病	352	27.62	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.36	73	20.94	266	172.37
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	337	26.45	1	9.56	1	2.11	-	-	-	-	1	0.26	11	3.16	323	209.31
7	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	269	21.11	2	19.11	2	4.22	10	6.31	25	14.91	60	15.49	63	18.07	107	69.34
8	A40-A41	敗血症	263	20.64	-	-	-	-	1	0.63	-	-	7	1.81	29	8.32	226	146.45
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎 病變	240	18.83	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.55	39	11.19	195	126.36
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	231	18.13	-	-	-	-	1	0.63	9	5.37	86	22.21	87	24.96	48	31.11
		其他	2,028	159.15	43	410.87	4	8.45	9	5.68	22	13.12	127	32.80	385	110.44	1,438	931.85
11	I10-I15	高血壓性疾病	204	16.01	-	-	-	-	-	-	1	0.60	5	1.29	36	10.33	162	104.98
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	197	15.46	-	-	-	-	-	-	-	-	28	7.23	85	24.38	84	54.43
13	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組 織之疾病	132	10.36	-	-	-	-	-	-	1	0.60	7	1.81	15	4.30	109	70.63
14	A15-A19	結核病	56	4.39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	7	2.01	48	31.11
15	G20-G21	帕金森病	56	4.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.86	53	34.35

附註：臺北市男性年中人口數為1,274,252人。

表6・ICD-10 臺北市女性主要死因年齡別死亡概況

中華民國97年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾 病 碼	死 亡 原 因	合 計		0 歲		1 - 4歲		5 - 14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
			死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率
	A00-Y98	所有死亡原因	6,127	453.23	44	449.64	14	32.38	14	9.59	32	20.31	275	62.40	985	252.45	4,763	2,896.69
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,769	130.86	-	-	1	2.31	4	2.74	4	2.54	112	25.41	542	138.91	1,106	672.63
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	736	54.44	-	-	3	6.94	2	1.37	1	0.63	12	2.72	60	15.38	658	400.17
3	I60-I69	腦血管疾病	522	38.61	-	-	1	2.31	-	-	-	-	7	1.59	57	14.61	457	277.93
4	E10-E14	糖尿病	364	26.93	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	34	8.71	329	200.09
5	J12-J18	肺炎	331	24.49	2	20.44	-	-	-	-	2	1.27	2	0.45	18	4.61	307	186.71
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	251	18.57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.45	39	10.00	210	127.71
7	A40-A41	敗血症	250	18.49	2	20.44	-	-	-	-	-	-	5	1.13	13	3.33	230	139.88
8	I10-I15	高血壓性疾病	170	12.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.28	165	100.35
9	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	149	11.02	-	-	-	-	-	-	2	1.27	5	1.13	16	4.10	126	76.63
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	139	10.28	-	-	-	-	-	-	5	3.17	58	13.16	40	10.25	36	21.89
		其他	1,446	106.97	40	408.77	9	20.82	8	5.48	18	11.42	71	16.11	161	41.26	1,139	692.70
11	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	120	8.88	1	10.22	2	4.63	2	1.37	8	5.08	16	3.63	27	6.92	64	38.92
12	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	109	8.06	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.91	3	0.77	102	62.03
13	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	99	7.32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.45	21	5.38	76	46.22
14	F01-F03	血管性及未明示之癱瘓症	38	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	23.11
15	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	38	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	3	0.77	34	20.68

附註：臺北市女性年中人口數為1,351,844人。

表7・ICD-10 臺北市嬰兒主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡 率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	95	459.14	100.00		所有死亡原因	51	475.97	100.00		所有死亡原因	44	441.06	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	48	231.98	50.53	P00-P96	源於周產期的特定病況	27	251.98	52.94	P00-P96	源於周產期的特定病況	21	210.51	47.73
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	16	77.33	16.84	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	8	74.66	15.69	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	8	80.19	18.18
3	J12-J18	肺炎	5	24.17	5.26	J12-J18	肺炎	3	28.00	5.88	J12-J18	肺炎	2	20.05	4.55
4	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	3	14.50	3.16	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	18.67	3.92	A40-A41	敗血症	2	20.05	4.55
5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	9.67	2.11	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	2	18.67	3.92	D50-D64	貧血	1	10.02	2.27
6	A40-A41	敗血症	2	9.67	2.11	G12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	9.33	1.96	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	1	10.02	2.27
7	D50-D64	貧血	1	4.83	1.05	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	9.33	1.96					
8	G12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	4.83	1.05	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	9.33	1.96					
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	4.83	1.05										
10	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	4.83	1.05										
		其他	15	72.50	15.79		其他	6	56.00	11.76		其他	9	90.22	20.45

附 註：0歲出生登記數為20,691人，其中男性為10,715人，女性為9,976人。

表8・ICD-10 臺北市0歲主要死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	95	469.11	100.00		所有死亡原因	51	487.32	100.00		所有死亡原因	44	449.64	100.00
1	P00-P96	源於周產期的特定病況	48	237.03	50.53	P00-P96	源於周產期的特定病況	27	257.99	52.94	P00-P96	源於周產期的特定病況	21	214.60	47.73
2	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	16	79.01	16.84	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	8	76.44	15.69	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	8	81.75	18.18
3	J12-J18	肺炎	5	24.69	5.26	J12-J18	肺炎	3	28.67	5.88	J12-J18	肺炎	2	20.44	4.55
4	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	3	14.81	3.16	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	19.11	3.92	A40-A41	敗血症	2	20.44	4.55
5	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	9.88	2.11	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	2	19.11	3.92	D50-D64	貧血	1	10.22	2.27
6	A40-A41	敗血症	2	9.88	2.11	G12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	9.56	1.96	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	1	10.22	2.27
7	D50-D64	貧血	1	4.94	1.05	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	9.56	1.96					
8	G12	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	4.94	1.05	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	9.56	1.96					
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	4.94	1.05										
10	R95	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	4.94	1.05										
		其他	15	74.07	15.79		其他	6	57.33	11.76		其他	9	91.97	20.45

附 註：0歲年中人口數為20,251人，其中男性為10,466人，女性為9,786人。

表9・ICD-10 臺北市少年(1-14歲)主要死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	64	16.20	100.00		所有死亡原因	36	17.48	100.00		所有死亡原因	28	14.80	100.00
1	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	16	4.05	25.00	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	12	5.83	33.33	I01-I02.0, I05-I09, I20- I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	5	2.64	17.86
2	C00-C97	惡性腫瘤	11	2.78	17.19	C00-C97	惡性腫瘤	6	2.91	16.67	Q00-Q99	先天性畸形變形及 染色體異常	5	2.64	17.86
3	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	9	2.28	14.06	Q00-Q99	先天性畸形變形及 染色體異常	4	1.94	11.11	C00-C97	惡性腫瘤	5	2.64	17.86
4	I01-I02.0, I05-I09, I20- I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	7	1.77	10.94	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	2	0.97	5.56	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	4	2.11	14.29
5	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	0.51	3.13	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	0.97	5.56	I60-I69	腦血管疾病	1	0.53	3.57
6	P00-P96	源於周產期的特定病 況	1	0.25	1.56	P00-P96	源於周產期的特定 病況	1	0.49	2.78					
7	I60-I69	腦血管疾病	1	0.25	1.56	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.49	2.78					
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	0.25	1.56	A40-A41	敗血症	1	0.49	2.78					
9	A40-A41	敗血症	1	0.25	1.56	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自 殺)	1	0.49	2.78					
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	1	0.25	1.56										
		其他	14	3.54	21.88		其他	6	2.91	16.67		其他	8	4.23	28.57

附 註：1-14歲年中人口數為395,117人，其中男性為205,946人，女性為189,171人。

表10・ICD-10 臺北市青年(15-24歲)主要死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 百分比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 百分比
		所有死亡原因	106	32.59	100.00		所有死亡原因	74	44.13	100.00		所有死亡原因	32	20.31	100.00
1	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	33	10.15	31.13	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	25	14.91	33.78	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	8	5.08	25.00
2	C00-C97	惡性腫瘤	16	4.92	15.09	C00-C97	惡性腫瘤	12	7.16	16.22	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	5	3.17	15.63
3	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	14	4.30	13.21	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	5.37	12.16	C00-C97	惡性腫瘤	4	2.54	12.50
4	I01-I02.0, I05-I09, I20- I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	6	1.84	5.66	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	5	2.98	6.76	Q00-Q99	先天性畸形變形及 染色體異常	3	1.90	9.38
5	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	6	1.84	5.66	Q00-Q99	先天性畸形變形及染 色體異常	3	1.79	4.05	J12-J18	肺炎	2	1.27	6.25
6	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	3	0.92	2.83	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	1.19	2.70	M00-M99	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	2	1.27	6.25
7	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	0.61	1.89	B20-B24	人類免疫缺乏病毒 (HIV)疾病	1	0.60	1.35	I01-I02.0, I05-I09, I20- I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	1	0.63	3.13
8	J12-J18	肺炎	2	0.61	1.89	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締 組織之疾病	1	0.60	1.35	L00-L99	皮膚及皮下組織疾 病	1	0.63	3.13
9	B20-B24	人類免疫缺乏病毒 (HIV)疾病	1	0.31	0.94	I10-I15	高血壓性疾病	1	0.60	1.35					
10	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	0.31	0.94	I60-I69	腦血管疾病	1	0.60	1.35					
11	I10-I15	高血壓性疾病	1	0.31	0.94										
12	I60-I69	腦血管疾病	1	0.31	0.94										
		其他	20	6.15	18.87		其他	14	8.35	18.92		其他	6	3.81	18.75

附 註：15-24歲年中人口數為325,271人，其中男性為167,692人，女性為157,579人。

表11・ICD-10 臺北市壯年(25-44歲)主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死 亡 百 分 比
		所有死亡原因	798	96.39	100.00		所有死亡原因	523	135.06	100.00		所有死亡原因	275	62.40	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	228	27.54	28.57	C00-C97	惡性腫瘤	116	29.96	22.18	C00-C97	惡性腫瘤	112	25.41	40.73
2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	144	17.39	18.05	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	86	22.21	16.44	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	58	13.16	21.09
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	88	10.63	11.03	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	76	19.63	14.53	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	16	3.63	5.82
4	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	76	9.18	9.52	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	60	15.49	11.47	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12	2.72	4.36
5	I60-I69	腦血管疾病	30	3.62	3.76	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	28	7.23	5.35	I60-I69	腦血管疾病	7	1.59	2.55
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	30	3.62	3.76	I60-I69	腦血管疾病	23	5.94	4.40	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	1.13	1.82
7	E10-E14	糖尿病	14	1.69	1.75	E10-E14	糖尿病	13	3.36	2.49	A40-A41	敗血症	5	1.13	1.82
8	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	1.45	1.50	J12-J18	肺炎	8	2.07	1.53	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4	0.91	1.45
9	A40-A41	敗血症	12	1.45	1.50	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	7	1.81	1.34	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	2	0.45	0.73
10	J12-J18	肺炎	10	1.21	1.25	A40-A41	敗血症	7	1.81	1.34	Q00-Q99	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.45	0.73
		其他	154	18.60	19.30		其他	99	25.57	18.93		其他	52	11.80	18.91
11	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	0.97	1.00	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	6	1.55	1.15	J12-J18	肺炎	2	0.45	0.73
12	B20-B24	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	5	0.60	0.63	B20-B24	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	5	1.29	0.96	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	2	0.45	0.73
13	B15-B19	病毒性肝炎	5	0.60	0.63	I10-I15	高血壓性疾病	5	1.29	0.96	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2	0.45	0.73
14	I10-I15	高血壓性疾病	5	0.60	0.63	B15-B19	病毒性肝炎	4	1.03	0.76	O00-O99	妊娠(懷孕)、生產及產褥期	1	0.23	0.36
15	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5	0.60	0.63	I71	主動脈瘤及剝離	3	0.77	0.57	L00-L99	皮膚及皮下組織疾病	1	0.23	0.36

附 註：25-44歲年中人口數為827,928人，其中男性為387,224人，女性為440,704人。

表12・ICD-10 臺北市中年(45-64歲)主要死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
		所有死亡原因	2,852	386.04	100.00		所有死亡原因	1,867	535.56	100.00		所有死亡原因	985	252.45	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,286	174.07	45.09	C00-C97	惡性腫瘤	744	213.42	39.85	C00-C97	惡性腫瘤	542	138.91	55.03
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	334	45.21	11.71	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	274	78.60	14.68	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	60	15.38	6.09
3	I60-I69	腦血管疾病	175	23.69	6.14	I60-I69	腦血管疾病	118	33.85	6.32	I60-I69	腦血管疾病	57	14.61	5.79
4	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	127	17.19	4.45	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	87	24.96	4.66	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	40	10.25	4.06
5	E10-E14	糖尿病	107	14.48	3.75	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	85	24.38	4.55	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	39	10.00	3.96
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	106	14.35	3.72	E10-E14	糖尿病	73	20.94	3.91	E10-E14	糖尿病	34	8.71	3.45
7	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	90	12.18	3.16	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	63	18.07	3.37	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	27	6.92	2.74
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	78	10.56	2.73	J12-J18	肺炎	44	12.62	2.36	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	21	5.38	2.13
9	J12-J18	肺炎	62	8.39	2.17	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	39	11.19	2.09	J12-J18	肺炎	18	4.61	1.83
10	A40-A41	敗血症	42	5.69	1.47	I10-I15	高血壓性疾病	36	10.33	1.93	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16	4.10	1.62
		其他	445	60.23	15.60		其他	304	87.20	16.28		其他	131	33.57	13.30
11	I10-I15	高血壓性疾病	41	5.55	1.44	A40-A41	敗血症	29	8.32	1.55	A40-A41	敗血症	13	3.33	1.32
12	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	31	4.20	1.09	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	4.30	0.80	I10-I15	高血壓性疾病	5	1.28	0.51
13	B15-B19	病毒性肝炎	15	2.03	0.53	B15-B19	病毒性肝炎	11	3.16	0.59	B15-B19	病毒性肝炎	4	1.03	0.41
14	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	14	1.90	0.49	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	11	3.16	0.59	D50-D64	貧血	3	0.77	0.30
15	A15-A19	結核病	10	1.35	0.35	I71	主動脈瘤及剝離	7	2.01	0.37	A15-A19	結核病	3	0.77	0.30

附 註：45-64歲年中人口數為738,785人，其中男性為348,609人，女性為390,176人。

表13・ICD-10 臺北市老年(65歲以上)主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計					男 性					女 性				
	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	疾病碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
		所有死亡原因	11,204	3,515.04	100.00		所有死亡原因	6,441	4,173.90	100.00		所有死亡原因	4,763	2,896.69	100.00
1	C00-C97	惡性腫瘤	2,926	917.98	26.12	C00-C97	惡性腫瘤	1,820	1,179.40	28.26	C00-C97	惡性腫瘤	1,106	672.63	23.22
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,577	494.75	14.08	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	919	595.53	14.27	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	658	400.17	13.81
3	I60-I69	腦血管疾病	992	311.22	8.85	J12-J18	肺炎	564	365.48	8.76	I60-I69	腦血管疾病	457	277.93	9.59
4	J12-J18	肺炎	871	273.26	7.77	I60-I69	腦血管疾病	535	346.69	8.31	E10-E14	糖尿病	329	200.09	6.91
5	E10-E14	糖尿病	595	186.67	5.31	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	323	209.31	5.01	J12-J18	肺炎	307	186.71	6.45
6	A40-A41	敗血症	456	143.06	4.07	E10-E14	糖尿病	266	172.37	4.13	A40-A41	敗血症	230	139.88	4.83
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	425	133.34	3.79	A40-A41	敗血症	226	146.45	3.51	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	210	127.71	4.41
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	405	127.06	3.61	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	195	126.36	3.03	I10-I15	高血壓性疾病	165	100.35	3.46
9	I10-I15	高血壓性疾病	327	102.59	2.92	I10-I15	高血壓性疾病	162	104.98	2.52	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	126	76.63	2.65
10	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	235	73.73	2.10	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	109	70.63	1.69	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	102	62.03	2.14
		其他	2,395	751.38	21.38		其他	1,322	856.68	20.52		其他	1,073	652.56	22.53
11	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	171	53.65	1.53	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	107	69.34	1.66	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	76	46.22	1.60
12	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	160	50.20	1.43	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	84	54.43	1.30	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	64	38.92	1.34
13	G20-G21	帕金森病	90	28.24	0.80	G20-G21	帕金森病	53	34.35	0.82	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	38	23.11	0.80
14	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	84	26.35	0.75	A15-A19	結核病	48	31.11	0.75	G20-G21	帕金森病	37	22.50	0.78
15	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	69	21.65	0.62	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	48	31.11	0.75	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	36	21.89	0.76

附 註：65歲以上年中人口數為318,745人，其中男性為154,316人，女性為164,429人。

表14・ICD-10 臺北市意外事故死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		運輸意外事故		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡人數	每十萬人口死亡率
總計	389	14.81	153	5.83	91	3.47	26	0.99	19	0.72	6	0.23	25	0.95	69	2.63
0歲	3	14.81	-	-	1	4.94	-	-	2	9.88	-	-	-	-	-	-
1-4歲	4	4.42	1	1.10	3	3.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14歲	12	3.94	6	1.97	2	0.66	3	0.99	-	-	-	-	-	-	1	0.33
15-24歲	33	10.15	25	7.69	-	-	5	1.54	-	-	-	-	2	0.61	1	0.31
25-44歲	76	9.18	32	3.87	9	1.09	8	0.97	4	0.48	-	-	16	1.93	7	0.85
45-64歲	90	12.18	38	5.14	24	3.25	5	0.68	4	0.54	2	0.27	6	0.81	11	1.49
65歲以上	171	53.65	51	16.00	52	16.31	5	1.57	9	2.82	4	1.25	1	0.31	49	15.37

附註：臺北市年中人口數為2,626,096人。

表15・ICD-10 臺北市男性意外事故死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		運輸意外事故		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率	死亡人數	每十萬男性人口死亡率
總計	269	21.11	104	8.16	66	5.18	21	1.65	13	1.02	5	0.39	17	1.33	43	3.37
0歲	2	19.11	-	-	-	-	-	-	2	19.11	-	-	-	-	-	-
1-4歲	2	4.22	1	2.11	1	2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14歲	10	6.31	4	2.52	2	1.26	3	1.89	-	-	-	-	-	-	1	0.63
15-24歲	25	14.91	18	10.73	-	-	4	2.39	-	-	-	-	2	1.19	1	0.60
25-44歲	60	15.49	26	6.71	8	2.07	7	1.81	3	0.77	-	-	12	3.10	4	1.03
45-64歲	63	18.07	23	6.60	20	5.74	5	1.43	2	0.57	1	0.29	3	0.86	9	2.58
65歲以上	107	69.34	32	20.74	35	22.68	2	1.30	6	3.89	4	2.59	-	-	28	18.14

附註：臺北市男性年中人口數為1,274,252人。

表16・ICD-10 臺北市女性意外事故死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		運輸意外事故		跌倒(落)		意外溺死和淹沒		對呼吸的其他意外威脅		暴露於煙(烟)霧、火災和火焰		毒害物質(所致)的意外中毒及暴露		其他	
	V01-X59,Y85-Y86		V01-V99		W00-W19		W65-W74		W75-W84		X00-X09		X40-X49			
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
總計	120	8.88	49	3.62	25	1.85	5	0.37	6	0.44	1	0.07	8	0.59	26	1.92
0歲	1	10.22	-	-	1	10.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4歲	2	4.63	-	-	2	4.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14歲	2	1.37	2	1.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-24歲	8	5.08	7	4.44	-	-	1	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-
25-44歲	16	3.63	6	1.36	1	0.23	1	0.23	1	0.23	-	-	4	0.91	3	0.68
45-64歲	27	6.92	15	3.84	4	1.03	-	-	2	0.51	1	0.26	3	0.77	2	0.51
65歲以上	64	38.92	19	11.56	17	10.34	3	1.82	3	1.82	-	-	1	0.61	21	12.77

附註：臺北市女性年中人口數為1,351,844人。

表17・ICD-10 臺北市運輸意外事故死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口

年齡別	總計		行人在運輸意外 事故中受傷		腳踏車騎乘者在 運輸意外事故中 受傷		摩托車騎乘者在 運輸意外事故中 受傷		汽車乘員〔乘客或 員工(駕駛員)]在 運輸意外事故中 受傷		巴士(公共汽車)乘員 〔乘客或員工(駕駛 員)]在運輸意外事故 中受傷		其他陸路運輸 意外事故		空中運輸 意外事故		運輸意外事故 的後遺症	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V70-V79		V80-V89		V95-V97		Y85	
	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
合計	153	5.83	17	0.65	2	0.08	31	1.18	2	0.08	1	0.04	98	3.73	1	0.04	1	0.04
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4歲	1	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.10	-	-	-	-
5-14歲	6	1.97	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.64	-	-	-	-
15-24歲	25	7.69	-	-	-	-	10	3.07	-	-	-	-	15	4.61	-	-	-	-
25-44歲	32	3.87	1	0.12	2	0.24	6	0.72	2	0.24	-	-	21	2.54	-	-	-	-
45-64歲	38	5.14	4	0.54	-	-	10	1.35	-	-	-	-	22	2.98	1	0.14	1	0.14
65歲以上	51	16.00	11	3.45	-	-	5	1.57	-	-	1	0.31	34	10.67	-	-	-	-

附註：臺北市年中人口數為2,626,096人。

表18・ICD-10 臺北市男性運輸意外事故死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬男性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外 事故中受傷		腳踏車騎乘者在 運輸意外事故中 受傷		摩托車騎乘者在 運輸意外事故中 受傷		汽車乘員[乘客或 員工(駕駛員)]在 運輸意外事故中 受傷		巴士(公共汽車)乘員 [乘客或員工(駕駛 員)]在運輸意外事故 中受傷		其他陸路運輸 意外事故		空中運輸 意外事故		運輸意外事故 的後遺症	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V70-V79		V80-V89		V95-V97		Y85	
	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率
合計	104	8.16	14	1.10	2	0.16	23	1.80	2	0.16	-	-	62	4.87	1	0.08	-	-
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4歲	1	2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.11	-	-	-	-
5-14歲	4	2.52	1	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.89	-	-	-	-
15-24歲	18	10.73	-	-	-	-	7	4.17	-	-	-	-	11	6.56	-	-	-	-
25-44歲	26	6.71	-	-	2	0.52	6	1.55	2	0.52	-	-	16	4.13	-	-	-	-
45-64歲	23	6.60	2	0.57	-	-	8	2.29	-	-	-	-	12	3.44	1	0.29	-	-
65歲以上	32	20.74	11	7.13	-	-	2	1.30	-	-	-	-	19	12.31	-	-	-	-

附註：臺北市男性年中人口數為1,274,252人。

表19・ICD-10 臺北市女性運輸意外事故死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬女性人口

年齡別	總計		行人在運輸意外事故中受傷		腳踏車騎乘者在運輸意外事故中受傷		摩托車騎乘者在運輸意外事故中受傷		汽車乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		巴士(公共汽車)乘員[乘客或員工(駕駛員)]在運輸意外事故中受傷		其他陸路運輸意外事故		空中運輸意外事故		運輸意外事故的後遺症	
	V01-V99,Y85		V01-V09		V10-V19		V20-V29		V40-V49		V70-V79		V80-V89		V95-V97		Y85	
	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率	死亡人數	每十萬女性人口死亡率
合計	49	3.62	3	0.22	-	-	8	0.59	-	-	1	0.07	36	2.66	-	-	1	0.07
0歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4歲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-14歲	2	1.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.37	-	-	-	-
15-24歲	7	4.44	-	-	-	-	3	1.90	-	-	-	-	4	2.54	-	-	-	-
25-44歲	6	1.36	1	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.13	-	-	-	-
45-64歲	15	3.84	2	0.51	-	-	2	0.51	-	-	-	-	10	2.56	-	-	1	0.26
65歲以上	19	11.56	-	-	-	-	3	1.82	-	-	1	0.61	15	9.12	-	-	-	-

附註：臺北市女性年中人口數為1,351,844人。

表20・ICD-10 臺北市自殺死亡方式
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼	自殺方式	合 計		0 歲		1 - 4歲		5 - 14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
		死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬
		人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	370	14.09	-	-	-	-	1	0.33	14	4.30	144	17.39	127	17.19	84	26.35
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.36	1	0.14	1	0.31
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	124	4.72	-	-	-	-	-	-	8	2.46	67	8.09	39	5.28	10	3.14
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.36	3	0.41	4	1.25
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	2	0.63
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	106	4.04	-	-	-	-	1	0.33	1	0.31	34	4.11	38	5.14	32	10.04
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	30	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.72	12	1.62	12	3.76
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.31
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.27	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.48	5	0.68	1	0.31
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	72	2.74	-	-	-	-	-	-	5	1.54	24	2.90	24	3.25	19	5.96
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	1	0.14	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.31
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.24	-	-	1	0.31

附註：臺北市年中人口數為2,626,096人。

表21・ICD-10 臺北市男性自殺死亡方式
中華民國97年

位：人，人/每十萬男性人口

疾病碼	自殺方式	合 計		0 歲		1 - 4歲		5 - 14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
		死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬
		人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	231	18.13	-	-	-	-	1	0.63	9	5.37	86	22.21	87	24.96	48	31.11
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	1	0.29	1	0.65
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.29	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	81	6.36	-	-	-	-	-	-	6	3.58	40	10.33	28	8.03	7	4.54
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.52	2	0.57	4	2.59
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	70	5.49	-	-	-	-	1	0.63	1	0.60	20	5.16	27	7.75	21	13.61
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.77	7	2.01	7	4.54
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.65
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.57	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.03	4	1.15	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.75	-	-	-	-	-	-	2	1.19	13	3.36	14	4.02	6	3.89
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	1	0.29	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.65
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.52	-	-	-	-

附註：臺北市男性年中人口數為1,274,252人。

表22・ICD-10 臺北市女性自殺死亡方式
中華民國97年

位：人，人/每十萬女性人口

疾病碼	自殺方式	合計		0歲		1-4歲		5-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
X60-X84, Y87.0	自殺總計	139	10.28	-	-	-	-	-	-	5	3.17	58	13.16	40	10.25	36	21.89
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.45	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	43	3.18	-	-	-	-	-	-	2	1.27	27	6.13	11	2.82	3	1.82
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	1	0.26	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	2	1.22
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	36	2.66	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.18	11	2.82	11	6.69
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.68	5	1.28	5	3.04
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	1	0.61
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.74	-	-	-	-	-	-	3	1.90	11	2.50	10	2.56	13	7.91
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.61

附註：臺北市女性年中人口數為1,351,844人。

表23・ICD-10 臺北市主要癌症死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	總 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 百分比	死 亡 原 因	死亡 人數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 百分比
	所有癌症死亡原因	4,467	170.10	100.00	所有癌症死亡原因	2,698	211.73	100.00	所有癌症死亡原因	1,769	130.86	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	928	35.34	20.77	氣管、支氣管和肺癌	593	46.54	21.98	氣管、支氣管和肺癌	335	24.78	18.94
2	肝和肝內膽管癌	701	26.69	15.69	肝和肝內膽管癌	488	38.30	18.09	結腸、直腸和肛門癌	234	17.31	13.23
3	結腸、直腸和肛門癌	567	21.59	12.69	結腸、直腸和肛門癌	333	26.13	12.34	女性乳房癌	228	16.87	12.89
4	女性乳房癌 (1)	228	16.87	5.10	胃癌	218	17.11	8.08	肝和肝內膽管癌	213	15.76	12.04
5	胃癌	312	11.88	6.98	前列腺(攝護腺)癌	124	9.73	4.60	胃癌	94	6.95	5.31
6	前列腺(攝護腺)癌 (2)	124	9.73	2.78	口腔癌	115	9.02	4.26	胰臟癌	78	5.77	4.41
7	胰臟癌	192	7.31	4.30	胰臟癌	114	8.95	4.23	子宮頸及部位未明示子宮癌	75	5.55	4.24
8	子宮頸及部位未明示子宮癌 (1)	75	5.55	1.68	食道癌	107	8.40	3.97	卵巢癌	58	4.29	3.28
9	口腔癌	131	4.99	2.93	非何杰金氏淋巴瘤	76	5.96	2.82	非何杰金氏淋巴瘤	55	4.07	3.11
10	非何杰金氏淋巴瘤	131	4.99	2.93	白血病	76	5.96	2.82	白血病	45	3.33	2.54
	其他	1,078	41.05	24.13	其他	454	35.63	16.83	其他	354	26.19	20.01
11	白血病	121	4.61	2.71	鼻咽癌	61	4.79	2.26	膽囊和其他膽道癌	35	2.59	1.98
12	食道癌	120	4.57	2.69	膀胱癌	57	4.47	2.11	子宮體癌	28	2.07	1.58
13	卵巢癌	58	4.29	1.30	膽囊和其他膽道癌	31	2.43	1.15	間皮和軟組織癌	26	1.92	1.47
14	鼻咽癌	84	3.20	1.88	腎臟癌	28	2.20	1.04	腎臟癌	26	1.92	1.47
15	膀胱癌	80	3.05	1.79	腦癌	26	2.04	0.96	鼻咽癌	23	1.70	1.30

附註：1.臺北市年中人口數為2,626,096人，其中男性1,274,252人，女性1,351,844人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表24・ICD-10 臺北市主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口

順位	疾病碼	死亡原因	合 計		0 歲		1 - 4歲		5 - 14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
			死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬
			人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	4,467	170.10	-	-	1	1.10	10	3.28	16	4.92	228	27.54	1,286	174.07	2,926	917.98
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺 癌	928	35.34	-	-	-	-	-	-	1	0.31	23	2.78	223	30.18	681	213.65
2	C22	肝和肝內膽管癌	701	26.69	-	-	-	-	-	-	1	0.31	38	4.59	216	29.24	446	139.92
3	C18-C21	結腸、直腸和肛門 癌	567	21.59	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2.54	140	18.95	406	127.37
4	C50	女性乳房癌(1)	228	16.87	-	-	-	-	-	-	-	-	29	6.58	129	33.06	70	42.57
5	C16	胃癌	312	11.88	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1.81	67	9.07	230	72.16
6	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	124	9.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.01	117	75.82
7	C25	胰臟癌	192	7.31	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.36	52	7.04	137	42.98
8	C53, C55	子宮頸及部位未明 示子宮癌(1)	75	5.55	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.59	29	7.43	39	23.72
9	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	131	4.99	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1.81	62	8.39	54	16.94
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	131	4.99	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.72	32	4.33	93	29.18
		其他	1,078	41.05	-	-	1	1.10	10	3.28	14	4.30	71	8.58	329	44.53	653	204.87
11	C91-C95	白血病	121	4.61	-	-	-	-	4	1.31	5	1.54	12	1.45	30	4.06	70	21.96
12	C15	食道癌	120	4.57	-	-	-	-	-	-	1	0.31	2	0.24	61	8.26	56	17.57
13	C56	卵巢癌(1)	58	4.29	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.13	29	7.43	24	14.60
14	C11	鼻咽癌	84	3.20	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.45	45	6.09	27	8.47
15	C67	膀胱癌	80	3.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.12	8	1.08	71	22.27

附註：1.臺北市年中人口數為2,626,096人。

2.(1)死亡率為每十萬女性人口死亡率 (2)死亡率為每十萬男性人口死亡率。

表25・ICD-10 臺北市男性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國97年

單位：人，人/每十萬男性人口

順位	疾病碼	死亡原因	合計		0歲		1-4歲		5-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
			死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
			人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
1-10	C00-C97	所有癌症死亡原因	2,698	211.73	-	-	-	-	6	3.78	12	7.16	116	29.96	744	213.42	1,820	1,179.40
	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	593	46.54	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.81	136	39.01	450	291.61
	C22	肝和肝內膽管癌	488	38.30	-	-	-	-	-	-	-	-	32	8.26	166	47.62	290	187.93
	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	333	26.13	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.84	83	23.81	239	154.88
	C16	胃癌	218	17.11	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.07	43	12.33	167	108.22
	C61	前列腺(攝護腺)癌	124	9.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.01	117	75.82
	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	115	9.02	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.87	58	16.64	42	27.22
	C25	胰臟癌	114	8.95	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.52	35	10.04	77	49.90
	C15	食道癌	107	8.40	-	-	-	-	-	-	1	0.60	2	0.52	56	16.06	48	31.11
	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	76	5.96	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	18	5.16	57	36.94
11-15	C91-C95	白血病	76	5.96	-	-	-	-	2	1.26	3	1.79	4	1.03	22	6.31	45	29.16
		其他	454	35.63	-	-	-	-	4	2.52	8	4.77	34	8.78	120	34.42	288	186.63
11	C11	鼻咽癌	61	4.79	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.84	33	9.47	17	11.02
12	C67	膀胱癌	57	4.47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	5	1.43	51	33.05
13	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	31	2.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.01	24	15.55
14	C64-C65	腎臟癌	28	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.26	10	2.87	17	11.02
15	C71	腦癌	26	2.04	-	-	-	-	3	1.89	3	1.79	4	1.03	8	2.29	8	5.18

附註：1.臺北市男性年中人口數為1,274,252人。

表26・ICD-10 臺北市女性主要癌症死因年齡別死亡概況

中華民國97年

單位：人，人/每十萬女性人口

順位	疾病碼	死亡原因	合 計		0 歲		1 - 4歲		5 - 14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
			死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬
			人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
	C00-C97	所有癌症死亡原因	1,769	130.86	-	-	1	2.31	4	2.74	4	2.54	112	25.41	542	138.91	1,106	672.63
1	C33-C34	氣管、支氣管和肺 癌	335	24.78	-	-	-	-	-	-	1	0.63	16	3.63	87	22.30	231	140.49
2	C18-C21	結腸、直腸和肛門 癌	234	17.31	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.27	57	14.61	167	101.56
3	C50	女性乳房癌	228	16.87	-	-	-	-	-	-	-	-	29	6.58	129	33.06	70	42.57
4	C22	肝和肝內膽管癌	213	15.76	-	-	-	-	-	-	1	0.63	6	1.36	50	12.81	156	94.87
5	C16	胃癌	94	6.95	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.59	24	6.15	63	38.31
6	C25	胰臟癌	78	5.77	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	17	4.36	60	36.49
7	C53, C55	子宮頸及部位未明 示子宮癌	75	5.55	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.59	29	7.43	39	23.72
8	C56	卵巢癌	58	4.29	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.13	29	7.43	24	14.60
9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	55	4.07	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.13	14	3.59	36	21.89
10	C91-C95	白血病	45	3.33	-	-	-	-	2	1.37	2	1.27	8	1.82	8	2.05	25	15.20
		其他	354	26.19	-	-	1	2.31	2	1.37	-	-	18	4.08	98	25.12	235	142.92
11	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	35	2.59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	8	2.05	26	15.81
12	C54	子宮體癌	28	2.07	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.68	12	3.08	13	7.91
13	C45-C49	間皮和軟組織癌	26	1.92	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.91	10	2.56	12	7.30
14	C64-C65	腎臟癌	26	1.92	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	5	1.28	20	12.16
15	C11	鼻咽癌	23	1.70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.23	12	3.08	10	6.08

附註：1.臺北市女性年中人口數為1,351,844人。

參、97 年死因統計

二、行政區別死因統計

表27-1・ICD-10 臺北市松山區主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	總計	1,057	502.04	100.00	所有死亡原因	629	629.14	100.00	所有死亡原因	428	387.11	100.00
1	惡性腫瘤	306	145.34	28.95	惡性腫瘤	190	190.04	30.21	惡性腫瘤	116	104.92	27.10
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	140	66.50	13.25	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	93	93.02	14.79	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	47	42.51	10.98
3	腦血管疾病	87	41.32	8.23	腦血管疾病	46	46.01	7.31	腦血管疾病	41	37.08	9.58
4	肺炎	63	29.92	5.96	肺炎	34	34.01	5.41	肺炎	29	26.23	6.78
5	糖尿病	49	23.27	4.64	敗血症	25	25.01	3.97	糖尿病	25	22.61	5.84
6	敗血症	46	21.85	4.35	高血壓性疾病	24	24.01	3.82	敗血症	21	18.99	4.91
7	高血壓性疾病	37	17.57	3.50	糖尿病	24	24.01	3.82	高血壓性疾病	13	11.76	3.04
8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	31	14.72	2.93	腎炎、腎病徵候群及腎病變	21	21.00	3.34	腎炎、腎病徵候群及腎病變	10	9.04	2.34
9	慢性下呼吸道疾病	27	12.82	2.55	慢性下呼吸道疾病	18	18.00	2.86	慢性下呼吸道疾病	9	8.14	2.10
10	意外事故	22	10.45	2.08	意外事故	16	16.00	2.54	蓄意自我傷害(自殺)	9	8.14	2.10
	其他	249	118.27	23.56	其他	138	138.03	21.94	其他	108	97.68	25.23
11	蓄意自我傷害(自殺)	20	9.50	1.89	蓄意自我傷害(自殺)	11	11.00	1.75	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	6	5.43	1.40
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	7.12	1.42	慢性肝病及肝硬化	10	10.00	1.59	意外事故	6	5.43	1.40
13	慢性肝病及肝硬化	14	6.65	1.32	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	9.00	1.43	慢性肝病及肝硬化	4	3.62	0.93
14	帕金森病	9	4.27	0.85	主動脈瘤及剝離	6	6.00	0.95	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	4	3.62	0.93
15	疝氣及腸阻塞	4	1.90	0.38	帕金森病	6	6.00	0.95	皮膚及皮下組織疾病	3	2.71	0.70

表27-2・ICD-10 臺北市信義區主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,342	587.77	100.00	所有死亡原因	806	726.72	100.00	所有死亡原因	536	456.52	100.00
1	惡性腫瘤	397	173.88	29.58	惡性腫瘤	233	210.08	28.91	惡性腫瘤	164	139.68	30.60
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	181	79.28	13.49	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	119	107.29	14.76	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	62	52.81	11.57
3	腦血管疾病	115	50.37	8.57	腦血管疾病	71	64.02	8.81	腦血管疾病	44	37.48	8.21
4	肺炎	87	38.10	6.48	肺炎	61	55.00	7.57	糖尿病	30	25.55	5.60
5	糖尿病	51	22.34	3.80	慢性下呼吸道疾病	40	36.07	4.96	腎炎、腎病徵候群及腎病變	27	23.00	5.04
6	敗血症	47	20.59	3.50	意外事故	23	20.74	2.85	肺炎	26	22.14	4.85
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	47	20.59	3.50	高血壓性疾病	22	19.84	2.73	敗血症	25	21.29	4.66
8	慢性下呼吸道疾病	45	19.71	3.35	敗血症	22	19.84	2.73	高血壓性疾病	19	16.18	3.54
9	高血壓性疾病	41	17.96	3.06	糖尿病	21	18.93	2.61	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	17	14.48	3.17
10	意外事故	34	14.89	2.53	腎炎、腎病徵候群及腎病變	20	18.03	2.48	蓄意自我傷害(自殺)	16	13.63	2.99
	其他	297	130.08	22.13	其他	174	156.88	21.59	其他	106	90.28	19.78
11	蓄意自我傷害(自殺)	33	14.45	2.46	蓄意自我傷害(自殺)	17	15.33	2.11	意外事故	11	9.37	2.05
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	32	14.02	2.38	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	13.52	1.86	慢性肝病及肝硬化	10	8.52	1.87
13	慢性肝病及肝硬化	22	9.64	1.64	慢性肝病及肝硬化	12	10.82	1.49	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	7	5.96	1.31
14	帕金森病	11	4.82	0.82	帕金森病	8	7.21	0.99	血管性及未明示之癱瘓症	5	4.26	0.93
15	肇因於吸入外物之肺部病況	11	4.82	0.82	主動脈瘤及剝離	5	4.51	0.62	慢性下呼吸道疾病	5	4.26	0.93

表27-3・ICD-10 臺北市大安區主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,715	545.51	100.00	所有死亡原因	999	671.28	100.00	所有死亡原因	716	432.46	100.00
1	惡性腫瘤	501	159.36	29.21	惡性腫瘤	298	200.24	29.83	惡性腫瘤	203	122.61	28.35
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	237	75.39	13.82	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	147	98.78	14.71	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	90	54.36	12.57
3	腦血管疾病	131	41.67	7.64	腦血管疾病	74	49.72	7.41	腦血管疾病	57	34.43	7.96
4	肺炎	92	29.26	5.36	肺炎	60	40.32	6.01	糖尿病	44	26.58	6.15
5	糖尿病	74	23.54	4.31	慢性下呼吸道疾病	39	26.21	3.90	肺炎	32	19.33	4.47
6	慢性下呼吸道疾病	63	20.04	3.67	意外事故	32	21.50	3.20	腎炎、腎病徵候群及腎病變	29	17.52	4.05
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	55	17.49	3.21	糖尿病	30	20.16	3.00	敗血症	26	15.70	3.63
8	敗血症	54	17.18	3.15	敗血症	28	18.81	2.80	慢性下呼吸道疾病	24	14.50	3.35
9	高血壓性疾病	45	14.31	2.62	腎炎、腎病徵候群及腎病變	26	17.47	2.60	高血壓性疾病	23	13.89	3.21
10	意外事故	45	14.31	2.62	高血壓性疾病	22	14.78	2.20	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	14	8.46	1.96
	其他	418	132.96	24.37	其他	243	163.28	24.32	其他	174	105.09	24.30
11	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	34	10.81	1.98	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	20	13.44	2.00	意外事故	13	7.85	1.82
12	蓄意自我傷害(自殺)	30	9.54	1.75	慢性肝病及肝硬化	19	12.77	1.90	蓄意自我傷害(自殺)	11	6.64	1.54
13	慢性肝病及肝硬化	27	8.59	1.57	蓄意自我傷害(自殺)	19	12.77	1.90	慢性肝病及肝硬化	8	4.83	1.12
14	帕金森病	14	4.45	0.82	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	11	7.39	1.10	主動脈瘤及剝離	4	2.42	0.56
15	肇因於吸入外物之肺部病況	14	4.45	0.82	帕金森病	10	6.72	1.00	血管性及未明示之癡呆症	4	2.42	0.56

表27-4・ICD-10 臺北市中山區主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,264	578.06	100.00	所有死亡原因	767	739.13	100.00	所有死亡原因	497	432.58	100.00
1	惡性腫瘤	382	174.70	30.22	惡性腫瘤	230	221.64	29.99	惡性腫瘤	152	132.30	30.58
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	167	76.37	13.21	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	107	103.11	13.95	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	60	52.22	12.07
3	腦血管疾病	112	51.22	8.86	腦血管疾病	55	53.00	7.17	腦血管疾病	57	49.61	11.47
4	肺炎	70	32.01	5.54	肺炎	45	43.36	5.87	肺炎	25	21.76	5.03
5	糖尿病	69	31.56	5.46	糖尿病	44	42.40	5.74	糖尿病	25	21.76	5.03
6	慢性肝病及肝硬化	40	18.29	3.16	慢性肝病及肝硬化	28	26.98	3.65	敗血症	21	18.28	4.23
7	敗血症	37	16.92	2.93	慢性下呼吸道疾病	26	25.06	3.39	腎炎、腎病徵候群及腎病變	18	15.67	3.62
8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	36	16.46	2.85	蓄意自我傷害(自殺)	23	22.16	3.00	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	11.32	2.62
9	蓄意自我傷害(自殺)	32	14.63	2.53	腎炎、腎病徵候群及腎病變	18	17.35	2.35	慢性肝病及肝硬化	12	10.44	2.41
10	慢性下呼吸道疾病	30	13.72	2.37	敗血症	16	15.42	2.09	高血壓性疾病	10	8.70	2.01
	其他	289	132.17	22.86	其他	175	168.64	22.82	其他	104	90.52	20.93
11	高血壓性疾病	25	11.43	1.98	高血壓性疾病	15	14.45	1.96	蓄意自我傷害(自殺)	9	7.83	1.81
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	24	10.98	1.90	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	11	10.60	1.43	意外事故	7	6.09	1.41
13	意外事故	18	8.23	1.42	意外事故	11	10.60	1.43	血管性及未明示之癱瘓症	4	3.48	0.80
14	主動脈瘤及剝離	9	4.12	0.71	主動脈瘤及剝離	7	6.75	0.91	慢性下呼吸道疾病	4	3.48	0.80
15	血管性及未明示之癱瘓症	7	3.20	0.55	結核病	6	5.78	0.78	衰老／老邁	3	2.61	0.60

表27-5・ICD-10 臺北市中正區主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	957	600.33	100.00	所有死亡原因	578	748.05	100.00	所有死亡原因	379	461.38	100.00
1	惡性腫瘤	303	190.07	31.66	惡性腫瘤	181	234.25	31.31	惡性腫瘤	122	148.52	32.19
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	127	79.67	13.27	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	79	102.24	13.67	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	48	58.43	12.66
3	腦血管疾病	71	44.54	7.42	腦血管疾病	47	60.83	8.13	肺炎	24	29.22	6.33
4	肺炎	70	43.91	7.31	肺炎	46	59.53	7.96	腦血管疾病	24	29.22	6.33
5	敗血症	41	25.72	4.28	敗血症	21	27.18	3.63	敗血症	20	24.35	5.28
6	腎炎、腎病徵候群及腎病變	35	21.96	3.66	糖尿病	20	25.88	3.46	腎炎、腎病徵候群及腎病變	16	19.48	4.22
7	糖尿病	30	18.82	3.13	腎炎、腎病徵候群及腎病變	19	24.59	3.29	糖尿病	10	12.17	2.64
8	慢性下呼吸道疾病	22	13.80	2.30	慢性下呼吸道疾病	16	20.71	2.77	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	10.96	2.37
9	意外事故	21	13.17	2.19	意外事故	13	16.82	2.25	高血壓性疾病	9	10.96	2.37
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	19	11.92	1.99	蓄意自我傷害(自殺)	12	15.53	2.08	意外事故	8	9.74	2.11
	其他	218	136.75	22.78	其他	124	160.48	21.45	其他	89	108.35	23.48
11	高血壓性疾病	19	11.92	1.99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	12.94	1.73	蓄意自我傷害(自殺)	7	8.52	1.85
12	蓄意自我傷害(自殺)	19	11.92	1.99	高血壓性疾病	10	12.94	1.73	帕金森病	6	7.30	1.58
13	帕金森病	11	6.90	1.15	慢性肝病及肝硬化	7	9.06	1.21	慢性下呼吸道疾病	6	7.30	1.58
14	胃及十二指腸潰瘍	8	5.02	0.84	帕金森病	5	6.47	0.87	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	5	6.09	1.32
15	慢性肝病及肝硬化	8	5.02	0.84	胃及十二指腸潰瘍	4	5.18	0.69	胃及十二指腸潰瘍	4	4.87	1.06

表27-6・ICD-10 臺北市大同區主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	893	712.18	100.00	所有死亡原因	532	855.41	100.00	所有死亡原因	361	571.22	100.00
1	惡性腫瘤	267	212.93	29.90	惡性腫瘤	164	263.70	30.83	惡性腫瘤	103	162.98	28.53
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	118	94.11	13.21	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	72	115.77	13.53	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	46	72.79	12.74
3	腦血管疾病	65	51.84	7.28	腦血管疾病	39	62.71	7.33	糖尿病	28	44.31	7.76
4	肺炎	61	48.65	6.83	肺炎	38	61.10	7.14	腦血管疾病	26	41.14	7.20
5	糖尿病	55	43.86	6.16	糖尿病	27	43.41	5.08	肺炎	23	36.39	6.37
6	敗血症	32	25.52	3.58	敗血症	20	32.16	3.76	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	16	25.32	4.43
7	慢性下呼吸道疾病	26	20.74	2.91	高血壓性疾病	15	24.12	2.82	慢性下呼吸道疾病	14	22.15	3.88
8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	23	18.34	2.58	意外事故	14	22.51	2.63	敗血症	12	18.99	3.32
9	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	21	16.75	2.35	腎炎、腎病徵候群及腎病變	12	19.29	2.26	腎炎、腎病徵候群及腎病變	11	17.41	3.05
10	高血壓性疾病	21	16.75	2.35	慢性下呼吸道疾病	12	19.29	2.26	意外事故	7	11.08	1.94
	其他	204	162.69	22.84	其他	119	191.34	22.37	其他	75	118.67	20.78
11	意外事故	21	16.75	2.35	蓄意自我傷害(自殺)	11	17.69	2.07	高血壓性疾病	6	9.49	1.66
12	慢性肝病及肝硬化	16	12.76	1.79	慢性肝病及肝硬化	10	16.08	1.88	慢性肝病及肝硬化	6	9.49	1.66
13	蓄意自我傷害(自殺)	16	12.76	1.79	結核病	7	11.26	1.32	蓄意自我傷害(自殺)	5	7.91	1.39
14	結核病	7	5.58	0.78	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	8.04	0.94	皮膚及皮下組織疾病	2	3.16	0.55
15	病毒性肝炎	4	3.19	0.45	病毒性肝炎	3	4.82	0.56	先天性畸形變形及染色體異常	2	3.16	0.55

表27-7・ICD-10 臺北市萬華區主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,502	784.68	100.00	所有死亡原因	936	971.02	100.00	所有死亡原因	566	595.65	100.00
1	惡性腫瘤	394	205.83	26.23	惡性腫瘤	251	260.39	26.82	惡性腫瘤	143	150.49	25.27
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	203	106.05	13.52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	135	140.05	14.42	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	68	71.56	12.01
3	肺炎	111	57.99	7.39	肺炎	76	78.84	8.12	腦血管疾病	47	49.46	8.30
4	腦血管疾病	102	53.29	6.79	腦血管疾病	55	57.06	5.88	糖尿病	44	46.31	7.77
5	糖尿病	88	45.97	5.86	糖尿病	44	45.65	4.70	肺炎	35	36.83	6.18
6	腎炎、腎病徵候群及腎病變	61	31.87	4.06	慢性下呼吸道疾病	42	43.57	4.49	腎炎、腎病徵候群及腎病變	33	34.73	5.83
7	慢性下呼吸道疾病	50	26.12	3.33	意外事故	36	37.35	3.85	敗血症	21	22.10	3.71
8	蓄意自我傷害(自殺)	47	24.55	3.13	蓄意自我傷害(自殺)	32	33.20	3.42	高血壓性疾病	16	16.84	2.83
9	敗血症	46	24.03	3.06	腎炎、腎病徵候群及腎病變	28	29.05	2.99	蓄意自我傷害(自殺)	15	15.79	2.65
10	意外事故	45	23.51	3.00	敗血症	25	25.94	2.67	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	13.68	2.30
	其他	355	185.46	23.64	其他	212	219.93	22.65	其他	131	137.86	23.14
11	高血壓性疾病	39	20.37	2.60	慢性肝病及肝硬化	24	24.90	2.56	意外事故	9	9.47	1.59
12	慢性肝病及肝硬化	33	17.24	2.20	高血壓性疾病	23	23.86	2.46	慢性肝病及肝硬化	9	9.47	1.59
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	22	11.49	1.46	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	9.34	0.96	慢性下呼吸道疾病	8	8.42	1.41
14	衰老／老邁	10	5.22	0.67	主動脈瘤及剝離	7	7.26	0.75	衰老／老邁	5	5.26	0.88
15	帕金森病	9	4.70	0.60	皮膚及皮下組織疾病	5	5.19	0.53	膽結石及其他膽囊疾患	5	5.26	0.88

表27-8・ICD-10 臺北市文山區主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,388	530.39	100.00	所有死亡原因	821	643.72	100.00	所有死亡原因	567	422.65	100.00
1	惡性腫瘤	426	162.79	30.69	惡性腫瘤	256	200.72	31.18	惡性腫瘤	170	126.72	29.98
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	188	71.84	13.54	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	115	90.17	14.01	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	73	54.42	12.87
3	腦血管疾病	102	38.98	7.35	肺炎	54	42.34	6.58	腦血管疾病	48	35.78	8.47
4	肺炎	86	32.86	6.20	腦血管疾病	54	42.34	6.58	肺炎	32	23.85	5.64
5	糖尿病	60	22.93	4.32	意外事故	34	26.66	4.14	糖尿病	28	20.87	4.94
6	腎炎、腎病徵候群及腎病變	46	17.58	3.31	慢性下呼吸道疾病	32	25.09	3.90	敗血症	25	18.64	4.41
7	敗血症	45	17.20	3.24	糖尿病	32	25.09	3.90	腎炎、腎病徵候群及腎病變	23	17.14	4.06
8	意外事故	41	15.67	2.95	腎炎、腎病徵候群及腎病變	23	18.03	2.80	高血壓性疾病	14	10.44	2.47
9	慢性下呼吸道疾病	38	14.52	2.74	慢性肝病及肝硬化	22	17.25	2.68	蓄意自我傷害(自殺)	14	10.44	2.47
10	高血壓性疾病	35	13.37	2.52	高血壓性疾病	21	16.47	2.56	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	8.95	2.12
	其他	321	122.66	23.13	其他	178	139.56	21.68	其他	128	95.41	22.57
11	慢性肝病及肝硬化	32	12.23	2.31	敗血症	20	15.68	2.44	慢性肝病及肝硬化	10	7.45	1.76
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	25	9.55	1.80	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	10.19	1.58	意外事故	7	5.22	1.23
13	蓄意自我傷害(自殺)	25	9.55	1.80	蓄意自我傷害(自殺)	11	8.62	1.34	慢性下呼吸道疾病	6	4.47	1.06
14	結核病	9	3.44	0.65	結核病	7	5.49	0.85	血管性及未明示之癱瘓症	5	3.73	0.88
15	血管性及未明示之癱瘓症	8	3.06	0.58	帕金森病	5	3.92	0.61	肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	5	3.73	0.88

表27-9・ICD-10 臺北市南港區主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	629	553.24	100.00	所有死亡原因	374	662.48	100.00	所有死亡原因	255	445.50	100.00
1	惡性腫瘤	186	163.60	29.57	惡性腫瘤	105	185.99	28.07	惡性腫瘤	81	141.51	31.76
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	75	65.97	11.92	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	45	79.71	12.03	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	30	52.41	11.76
3	肺炎	58	51.01	9.22	肺炎	45	79.71	12.03	腦血管疾病	18	31.45	7.06
4	腦血管疾病	52	45.74	8.27	腦血管疾病	34	60.23	9.09	肺炎	13	22.71	5.10
5	糖尿病	31	27.27	4.93	糖尿病	18	31.88	4.81	糖尿病	13	22.71	5.10
6	意外事故	24	21.11	3.82	意外事故	15	26.57	4.01	敗血症	10	17.47	3.92
7	蓄意自我傷害(自殺)	21	18.47	3.34	蓄意自我傷害(自殺)	13	23.03	3.48	腎炎、腎病徵候群及腎病變	10	17.47	3.92
8	慢性下呼吸道疾病	20	17.59	3.18	慢性肝病及肝硬化	12	21.26	3.21	意外事故	9	15.72	3.53
9	敗血症	19	16.71	3.02	慢性下呼吸道疾病	11	19.48	2.94	慢性下呼吸道疾病	9	15.72	3.53
10	腎炎、腎病徵候群及腎病變	19	16.71	3.02	高血壓性疾病	10	17.71	2.67	蓄意自我傷害(自殺)	8	13.98	3.14
	其他	124	109.06	19.71	其他	66	116.91	17.65	其他	54	94.34	21.18
11	高血壓性疾病	15	13.19	2.38	敗血症	9	15.94	2.41	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	5	8.74	1.96
12	慢性肝病及肝硬化	15	13.19	2.38	腎炎、腎病徵候群及腎病變	9	15.94	2.41	高血壓性疾病	5	8.74	1.96
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	7.92	1.43	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	4	7.09	1.07	慢性肝病及肝硬化	3	5.24	1.18
14	血管性及未明示之癱瘓症	3	2.64	0.48	塵肺症	3	5.31	0.80	皮膚及皮下組織疾病	2	3.49	0.78
15	帕金森病	3	2.64	0.48	血管性及未明示之癱瘓症	2	3.54	0.53	源於周產期的特定病況	2	3.49	0.78

表27-10・ICD-10 臺北市內湖區主要死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,183	444.46	100.00	所有死亡原因	688	533.09	100.00	所有死亡原因	495	361.04	100.00
1	惡性腫瘤	366	137.51	30.94	惡性腫瘤	221	171.24	32.12	惡性腫瘤	145	105.76	29.29
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	153	57.48	12.93	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	109	84.46	15.84	腦血管疾病	48	35.01	9.70
3	腦血管疾病	101	37.95	8.54	腦血管疾病	53	41.07	7.70	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	44	32.09	8.89
4	糖尿病	68	25.55	5.75	肺炎	34	26.34	4.94	糖尿病	44	32.09	8.89
5	肺炎	63	23.67	5.33	敗血症	24	18.60	3.49	肺炎	29	21.15	5.86
6	敗血症	42	15.78	3.55	糖尿病	24	18.60	3.49	敗血症	18	13.13	3.64
7	蓄意自我傷害(自殺)	38	14.28	3.21	蓄意自我傷害(自殺)	23	17.82	3.34	腎炎、腎病徵候群及腎病變	18	13.13	3.64
8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	33	12.40	2.79	慢性下呼吸道疾病	22	17.05	3.20	蓄意自我傷害(自殺)	15	10.94	3.03
9	意外事故	33	12.40	2.79	意外事故	20	15.50	2.91	高血壓性疾病	13	9.48	2.63
10	高血壓性疾病	28	10.52	2.37	高血壓性疾病	15	11.62	2.18	意外事故	13	9.48	2.63
	其他	258	96.93	21.81	其他	143	110.80	20.78	其他	108	78.77	21.82
11	慢性下呼吸道疾病	28	10.52	2.37	腎炎、腎病徵候群及腎病變	15	11.62	2.18	慢性肝病及肝硬化	12	8.75	2.42
12	慢性肝病及肝硬化	25	9.39	2.11	慢性肝病及肝硬化	13	10.07	1.89	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	11	8.02	2.22
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	20	7.51	1.69	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	6.97	1.31	慢性下呼吸道疾病	6	4.38	1.21
14	主動脈瘤及剝離	7	2.63	0.59	結核病	7	5.42	1.02	血管性及未明示之癡呆症	4	2.92	0.81
15	結核病	7	2.63	0.59	主動脈瘤及剝離	5	3.87	0.73	病毒性肝炎	3	2.19	0.61

表27-11・ICD-10 臺北市士林區主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,652	576.50	100.00	所有死亡原因	956	682.77	100.00	所有死亡原因	696	474.96	100.00
1	惡性腫瘤	475	165.76	28.75	惡性腫瘤	280	199.97	29.29	惡性腫瘤	195	133.07	28.02
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	231	80.61	13.98	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	152	108.56	15.90	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	79	53.91	11.35
3	腦血管疾病	129	45.02	7.81	腦血管疾病	77	54.99	8.05	腦血管疾病	52	35.49	7.47
4	肺炎	97	33.85	5.87	肺炎	67	47.85	7.01	糖尿病	40	27.30	5.75
5	糖尿病	75	26.17	4.54	慢性下呼吸道疾病	35	25.00	3.66	腎炎、腎病徵候群及腎病變	33	22.52	4.74
6	敗血症	59	20.59	3.57	糖尿病	35	25.00	3.66	肺炎	30	20.47	4.31
7	腎炎、腎病徵候群及腎病變	53	18.50	3.21	意外事故	33	23.57	3.45	敗血症	29	19.79	4.17
8	意外事故	49	17.10	2.97	敗血症	30	21.43	3.14	高血壓性疾病	18	12.28	2.59
9	慢性下呼吸道疾病	46	16.05	2.78	蓄意自我傷害(自殺)	30	21.43	3.14	意外事故	16	10.92	2.30
10	蓄意自我傷害(自殺)	46	16.05	2.78	腎炎、腎病徵候群及腎病變	20	14.28	2.09	慢性肝病及肝硬化	16	10.92	2.30
	其他	392	136.80	23.73	其他	197	140.70	20.61	其他	188	128.29	27.01
11	慢性肝病及肝硬化	36	12.56	2.18	慢性肝病及肝硬化	20	14.28	2.09	蓄意自我傷害(自殺)	16	10.92	2.30
12	高血壓性疾病	31	10.82	1.88	高血壓性疾病	13	9.28	1.36	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	10.24	2.16
13	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	27	9.42	1.63	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	12	8.57	1.26	慢性下呼吸道疾病	11	7.51	1.58
14	源於周產期的特定病況	12	4.19	0.73	源於周產期的特定病況	7	5.00	0.73	帕金森病	7	4.78	1.01
15	帕金森病	11	3.84	0.67	血管性及未明示之癱瘓症	5	3.57	0.52	源於周產期的特定病況	5	3.41	0.72

表27-12・ICD-10 臺北市北投區主要死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	1,537	615.13	100.00	所有死亡原因	906	743.56	100.00	所有死亡原因	631	492.90	100.00
1	惡性腫瘤	464	185.70	30.19	惡性腫瘤	289	237.18	31.90	惡性腫瘤	175	136.70	27.73
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	194	77.64	12.62	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	105	86.17	11.59	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	89	69.52	14.10
3	腦血管疾病	132	52.83	8.59	腦血管疾病	72	59.09	7.95	腦血管疾病	60	46.87	9.51
4	肺炎	92	36.82	5.99	肺炎	59	48.42	6.51	肺炎	33	25.78	5.23
5	糖尿病	66	26.41	4.29	慢性下呼吸道疾病	44	36.11	4.86	糖尿病	33	25.78	5.23
6	腎炎、腎病徵候群及腎病變	52	20.81	3.38	糖尿病	33	27.08	3.64	高血壓性疾病	24	18.75	3.80
7	慢性下呼吸道疾病	51	20.41	3.32	腎炎、腎病徵候群及腎病變	29	23.80	3.20	腎炎、腎病徵候群及腎病變	23	17.97	3.65
8	敗血症	45	18.01	2.93	蓄意自我傷害(自殺)	29	23.80	3.20	敗血症	22	17.19	3.49
9	蓄意自我傷害(自殺)	43	17.21	2.80	敗血症	23	18.88	2.54	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	18	14.06	2.85
10	高血壓性疾病	38	15.21	2.47	意外事故	22	18.06	2.43	意外事故	14	10.94	2.22
	其他	360	144.08	23.42	其他	201	164.96	22.19	其他	140	109.36	22.19
11	意外事故	36	14.41	2.34	慢性肝病及肝硬化	20	16.41	2.21	蓄意自我傷害(自殺)	14	10.94	2.22
12	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	33	13.21	2.15	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	12.31	1.66	慢性肝病及肝硬化	8	6.25	1.27
13	慢性肝病及肝硬化	28	11.21	1.82	高血壓性疾病	14	11.49	1.55	慢性下呼吸道疾病	7	5.47	1.11
14	源於周產期的特定病況	8	3.20	0.52	結核病	6	4.92	0.66	血管性及未明示之癱瘓症	4	3.12	0.63
15	先天性畸形變形及染色體異常	7	2.80	0.46	源於周產期的特定病況	6	4.92	0.66	先天性畸形變形及染色體異常	3	2.34	0.48

表28-1・ICD-10 臺北市松山區意外事故死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	意外事故合計	22	10.45	100.00	16	16.00	100.00	6	5.43	100.00
V01-V99	運輸意外事故	11	5.22	50.00	8	8.00	50.00	3	2.71	50.00
W00-W19	跌倒(落)	7	3.32	31.82	5	5.00	31.25	2	1.81	33.33
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.95	9.09	1	1.00	6.25	1	0.90	16.67
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	2	0.95	9.09	2	2.00	12.50	-	-	-

表28-2・ICD-10 臺北市信義區意外事故死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	意外事故合計	34	14.89	100.00	23	20.74	100.00	11	9.37	100.00
V01-V99	運輸意外事故	10	4.38	29.41	5	4.51	21.74	5	4.26	45.45
W00-W19	跌倒(落)	10	4.38	29.41	8	7.21	34.78	2	1.70	18.18
W65-W74	意外溺死和淹沒	5	2.19	14.71	5	4.51	21.74	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.44	2.94	1	0.90	4.35	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	8	3.50	23.53	4	3.61	17.39	4	3.41	36.36

表28-3・ICD-10 臺北市大安區意外事故死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	意外事故合計	45	14.31	100.00	32	21.50	100.00	13	7.85	100.00
V01-V99	運輸意外事故	17	5.41	37.78	13	8.74	40.63	4	2.42	30.77
W00-W19	跌倒(落)	9	2.86	20.00	6	4.03	18.75	3	1.81	23.08
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.32	2.22	-	-	-	1	0.60	7.69
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.64	4.44	2	1.34	6.25	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.32	2.22	1	0.67	3.13	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.64	4.44	-	-	-	2	1.21	15.38
	其他	13	4.14	28.89	10	6.72	31.25	3	1.81	23.08

表28-4・ICD-10 臺北市中山區意外事故死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	意外事故合計	18	8.23	100.00	11	10.60	100.00	7	6.09	100.00
V01-V99	運輸意外事故	9	4.12	50.00	7	6.75	63.64	2	1.74	28.57
W00-W19	跌倒(落)	1	0.46	5.56	1	0.96	9.09	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.91	11.11	-	-	-	2	1.74	28.57
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.46	5.56	-	-	-	1	0.87	14.29
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.46	5.56	1	0.96	9.09	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	4	1.83	22.22	2	1.93	18.18	2	1.74	28.57

表28-5・ICD-10 臺北市中正區意外事故死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	意外事故合計	21	13.17	100.00	13	16.82	100.00	8	9.74	100.00
V01-V99	運輸意外事故	7	4.39	33.33	5	6.47	38.46	2	2.43	25.00
W00-W19	跌倒(落)	8	5.02	38.10	4	5.18	30.77	4	4.87	50.00
W65-W74	意外溺死和淹沒	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.88	14.29	2	2.59	15.38	1	1.22	12.50
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	1.25	9.52	1	1.29	7.69	1	1.22	12.50
	其他	1	0.63	4.76	1	1.29	7.69	-	-	-

表28-6・ICD-10 臺北市大同區意外事故死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	意外事故合計	21	16.75	100.00	14	22.51	100.00	7	11.08	100.00
V01-V99	運輸意外事故	9	7.18	42.86	4	6.43	28.57	5	7.91	71.43
W00-W19	跌倒(落)	4	3.19	19.05	4	6.43	28.57	-	-	-
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	2.39	14.29	3	4.82	21.43	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	1	0.80	4.76	-	-	-	1	1.58	14.29
	其他	4	3.19	19.05	3	4.82	21.43	1	1.58	14.29

表28-7・ICD-10 臺北市萬華區意外事故死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	意外事故合計	45	23.51	100.00	36	37.35	100.00	9	9.47	100.00
V01-V99	運輸意外事故	17	8.88	37.78	13	13.49	36.11	4	4.21	44.44
W00-W19	跌倒(落)	11	5.75	24.44	9	9.34	25.00	2	2.10	22.22
W65-W74	意外溺死和淹沒	4	2.09	8.89	4	4.15	11.11	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.52	2.22	1	1.04	2.78	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.52	2.22	-	-	-	1	1.05	11.11
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	4	2.09	8.89	4	4.15	11.11	-	-	-
	其他	7	3.66	15.56	5	5.19	13.89	2	2.10	22.22

表28-8・ICD-10 臺北市文山區意外事故死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	意外事故合計	41	15.67	100.00	34	26.66	100.00	7	5.22	100.00
V01-V99	運輸意外事故	20	7.64	48.78	17	13.33	50.00	3	2.24	42.86
W00-W19	跌倒(落)	8	3.06	19.51	6	4.70	17.65	2	1.49	28.57
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.15	7.32	2	1.57	5.88	1	0.75	14.29
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	4	1.53	9.76	4	3.14	11.76	-	-	-
	其他	6	2.29	14.63	5	3.92	14.71	1	0.75	14.29

表28-9・ICD-10 臺北市南港區意外事故死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01-X59,Y85-Y86	意外事故合計	24	21.11	100.00	15	26.57	100.00	9	15.72	100.00
V01-V99	運輸意外事故	9	7.92	37.50	5	8.86	33.33	4	6.99	44.44
W00-W19	跌倒(落)	3	2.64	12.50	2	3.54	13.33	1	1.75	11.11
W65-W74	意外溺死和淹沒	1	0.88	4.17	1	1.77	6.67	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	1	0.88	4.17	-	-	-	1	1.75	11.11
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.88	4.17	1	1.77	6.67	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	3	2.64	12.50	2	3.54	13.33	1	1.75	11.11
	其他	6	5.28	25.00	4	7.09	26.67	2	3.49	22.22

表28-10・ICD-10 臺北市內湖區意外事故死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	意外事故合計	33	12.40	100.00	20	15.50	100.00	13	9.48	100.00
V01-V99	運輸意外事故	9	3.38	27.27	5	3.87	25.00	4	2.92	30.77
W00-W19	跌倒(落)	12	4.51	36.36	9	6.97	45.00	3	2.19	23.08
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.75	6.06	1	0.77	5.00	1	0.73	7.69
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	2	0.75	6.06	2	1.55	10.00	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	1	0.38	3.03	1	0.77	5.00	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.75	6.06	1	0.77	5.00	1	0.73	7.69
	其他	5	1.88	15.15	1	0.77	5.00	4	2.92	30.77

表28-11・ICD-10 臺北市士林區意外事故死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	意外事故合計	49	17.10	100.00	33	23.57	100.00	16	10.92	100.00
V01-V99	運輸意外事故	19	6.63	38.78	13	9.28	39.39	6	4.09	37.50
W00-W19	跌倒(落)	10	3.49	20.41	8	5.71	24.24	2	1.36	12.50
W65-W74	意外溺死和淹沒	2	0.70	4.08	2	1.43	6.06	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	4	1.40	8.16	2	1.43	6.06	2	1.36	12.50
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	5	1.74	10.20	4	2.86	12.12	1	0.68	6.25
	其他	9	3.14	18.37	4	2.86	12.12	5	3.41	31.25

表28-12・ICD-10 臺北市北投區意外事故死亡原因
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 原 因	合 計			男 性			女 性		
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
V01- X59,Y85-Y86	意外事故合計	36	14.41	100.00	22	18.06	100.00	14	10.94	100.00
V01-V99	運輸意外事故	16	6.40	44.44	9	7.39	40.91	7	5.47	50.00
W00-W19	跌倒(落)	8	3.20	22.22	4	3.28	18.18	4	3.12	28.57
W65-W74	意外溺死和淹沒	3	1.20	8.33	3	2.46	13.64	-	-	-
W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	3	1.20	8.33	3	2.46	13.64	-	-	-
X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災和火焰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	毒害物質(所致)的意外中毒及暴露	2	0.80	5.56	1	0.82	4.55	1	0.78	7.14
	其他	4	1.60	11.11	2	1.64	9.09	2	1.56	14.29

表29-1・ICD-10 臺北市松山區自殺死亡方式
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	20	9.50	100.00	11	11.00	100.00	9	8.14	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	3.80	40.00	6	6.00	54.55	2	1.81	22.22
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.47	5.00	1	1.00	9.09	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	3	1.42	15.00	1	1.00	9.09	2	1.81	22.22
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.95	10.00	1	1.00	9.09	1	0.90	11.11
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.47	5.00	1	1.00	9.09	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	5	2.37	25.00	1	1.00	9.09	4	3.62	44.44
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29-2・ICD-10 臺北市信義區自殺死亡方式
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	33	14.45	100.00	17	15.33	100.00	16	13.63	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.44	3.03	1	0.90	5.88	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	4.38	30.30	6	5.41	35.29	4	3.41	25.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.44	3.03	-	-	-	1	0.85	6.25
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	10	4.38	30.30	5	4.51	29.41	5	4.26	31.25
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.44	3.03	-	-	-	1	0.85	6.25
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.44	3.03	1	0.90	5.88	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	3.50	24.24	3	2.70	17.65	5	4.26	31.25
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.44	3.03	1	0.90	5.88	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29-3・ICD-10 臺北市大安區自殺死亡方式
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	30	9.54	100.00	19	12.77	100.00	11	6.64	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	1.59	16.67	3	2.02	15.79	2	1.21	18.18
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.32	3.33	-	-	-	1	0.60	9.09
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	12	3.82	40.00	9	6.05	47.37	3	1.81	27.27
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	0.95	10.00	1	0.67	5.26	2	1.21	18.18
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	2.54	26.67	5	3.36	26.32	3	1.81	27.27
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.32	3.33	1	0.67	5.26	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29-4・ICD-10 臺北市中山區自殺死亡方式
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	32	14.63	100.00	23	22.16	100.00	9	7.83	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.91	6.25	2	1.93	8.70	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	12	5.49	37.50	7	6.75	30.43	5	4.35	55.56
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	9	4.12	28.13	5	4.82	21.74	4	3.48	44.44
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	1.37	9.38	3	2.89	13.04	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.46	3.13	1	0.96	4.35	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.46	3.13	1	0.96	4.35	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	1.83	12.50	4	3.85	17.39	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29-5・ICD-10 臺北市中正區自殺死亡方式
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	19	11.92	100.00	12	15.53	100.00	7	8.52	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	5	3.14	26.32	4	5.18	33.33	1	1.22	14.29
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.63	5.26	1	1.29	8.33	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	6	3.76	31.58	3	3.88	25.00	3	3.65	42.86
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.63	5.26	-	-	-	1	1.22	14.29
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	1	0.63	5.26	1	1.29	8.33	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	1.25	10.53	2	2.59	16.67	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	1.88	15.79	1	1.29	8.33	2	2.43	28.57
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29-6・ICD-10 臺北市大同區自殺死亡方式
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	16	12.76	100.00	11	17.69	100.00	5	7.91	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	2.39	18.75	3	4.82	27.27	-	-	-
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.80	6.25	-	-	-	1	1.58	20.00
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	4	3.19	25.00	4	6.43	36.36	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	2.39	18.75	1	1.61	9.09	2	3.16	40.00
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.80	6.25	1	1.61	9.09	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	4	3.19	25.00	2	3.22	18.18	2	3.16	40.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29-7・ICD-10 臺北市萬華區自殺死亡方式
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	47	24.55	100.00	32	33.20	100.00	15	15.79	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.52	2.13	-	-	-	1	1.05	6.67
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	12	6.27	25.53	6	6.22	18.75	6	6.31	40.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	17	8.88	36.17	13	13.49	40.63	4	4.21	26.67
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	6	3.13	12.77	5	5.19	15.63	1	1.05	6.67
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	3	1.57	6.38	3	3.11	9.38	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	8	4.18	17.02	5	5.19	15.63	3	3.16	20.00
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29-8・ICD-10 臺北市文山區自殺死亡方式
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	25	9.55	100.00	11	8.62	100.00	14	10.44	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.38	4.00	-	-	-	1	0.75	7.14
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	9	3.44	36.00	5	3.92	45.45	4	2.98	28.57
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.38	4.00	1	0.78	9.09	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.38	4.00	-	-	-	1	0.75	7.14
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	4	1.53	16.00	4	3.14	36.36	-	-	-
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	1	0.38	4.00	-	-	-	1	0.75	7.14
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.38	4.00	-	-	-	1	0.75	7.14
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	2.67	28.00	1	0.78	9.09	6	4.47	42.86
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29-9・ICD-10 臺北市南港區自殺死亡方式
中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	21	18.47	100.00	13	23.03	100.00	8	13.98	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	7.04	38.10	4	7.09	30.77	4	6.99	50.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	1.76	9.52	2	3.54	15.38	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	4	3.52	19.05	2	3.54	15.38	2	3.49	25.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	3	2.64	14.29	1	1.77	7.69	2	3.49	25.00
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	3	2.64	14.29	3	5.31	23.08	-	-	-
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	1	0.88	4.76	1	1.77	7.69	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29-10・ICD-10 臺北市內湖區自殺死亡方式

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	38	14.28	100.00	23	17.82	100.00	15	10.94	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	18	6.76	47.37	11	8.52	47.83	7	5.11	46.67
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	11	4.13	28.95	8	6.20	34.78	3	2.19	20.00
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	9	3.38	23.68	4	3.10	17.39	5	3.65	33.33
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表29-11・ICD-10 臺北市士林區自殺死亡方式

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	46	16.05	100.00	30	21.43	100.00	16	10.92	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	1	0.35	2.17	1	0.71	3.33	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	17	5.93	36.96	13	9.28	43.33	4	2.73	25.00
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	3	1.05	6.52	2	1.43	6.67	1	0.68	6.25
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	11	3.84	23.91	5	3.57	16.67	6	4.09	37.50
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	5	1.74	10.87	4	2.86	13.33	1	0.68	6.25
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	6	2.09	13.04	3	2.14	10.00	3	2.05	18.75
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	1.05	6.52	2	1.43	6.67	1	0.68	6.25

表29-12・ICD-10 臺北市北投區自殺死亡方式

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

疾病碼	死 亡 方 式	合 計			男 性			女 性		
		死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡	死 亡	每 十 萬	死 亡
		人 數	死 亡 率	百 分 比	人 數	男 性 人 口 死 亡 率	百 分 比	人 數	女 性 人 口 死 亡 率	百 分 比
X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	43	17.21	100.00	29	23.80	100.00	14	10.94	100.00
X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒及暴露	17	6.80	39.53	13	10.67	44.83	4	3.12	28.57
X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	1	0.40	2.33	1	0.82	3.45	-	-	-
X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	15	6.00	34.88	11	9.03	37.93	4	3.12	28.57
X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	2	0.80	4.65	1	0.82	3.45	1	0.78	7.14
X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	1	0.40	2.33	-	-	-	1	0.78	7.14
X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	7	2.80	16.28	3	2.46	10.34	4	3.12	28.57
X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表30-1・ICD-10 臺北市松山區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	306	145.34	100.00	所有癌症死亡原因	190	190.04	100.00	所有癌症死亡原因	116	104.92	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	63	29.92	20.59	氣管、支氣管和肺癌	45	45.01	23.68	氣管、支氣管和肺癌	18	16.28	15.52
2	肝和肝內膽管癌	44	20.90	14.38	肝和肝內膽管癌	30	30.01	15.79	女性乳房癌	16	14.47	13.79
3	結腸、直腸和肛門癌	36	17.10	11.76	結腸、直腸和肛門癌	20	20.00	10.53	結腸、直腸和肛門癌	16	14.47	13.79
4	女性乳房癌(1)	16	14.47	5.23	胃癌	16	16.00	8.42	肝和肝內膽管癌	14	12.66	12.07
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	14	14.00	4.58	胰臟癌	15	15.00	7.89	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	5.43	5.17
6	胃癌	22	10.45	7.19	前列腺(攝護腺)癌	14	14.00	7.37	胃癌	6	5.43	5.17
7	胰臟癌	20	9.50	6.54	口腔癌	8	8.00	4.21	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.52	4.31
8	非何杰金氏淋巴瘤	12	5.70	3.92	非何杰金氏淋巴瘤	7	7.00	3.68	胰臟癌	5	4.52	4.31
9	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	5.43	1.96	白血病	5	5.00	2.63	膽囊和其他膽道癌	5	4.52	4.31
10	白血病	9	4.27	2.94	食道癌	5	5.00	2.63	白血病	4	3.62	3.45
	其他	64	30.40	20.92	其他	25	25.01	13.16	其他	21	18.99	18.10
11	膽囊和其他膽道癌	9	4.27	2.94	膀胱癌	4	4.00	2.11	卵巢癌	4	3.62	3.45
12	口腔癌	8	3.80	2.61	膽囊和其他膽道癌	4	4.00	2.11	子宮體癌	3	2.71	2.59
13	卵巢癌(1)	4	3.62	1.31	腎臟癌	2	2.00	1.05	間皮和軟組織癌	2	1.81	1.72
14	子宮體癌(1)	3	2.71	0.98	鼻咽癌	2	2.00	1.05	胸腺癌	1	0.90	0.86
15	食道癌	5	2.37	1.63	小腸癌	1	1.00	0.53	喉癌	1	0.90	0.86

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表30-2・ICD-10 臺北市信義區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	397	173.88	100.00	所有癌症死亡原因	233	210.08	100.00	所有癌症死亡原因	164	139.68	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	79	34.60	19.90	氣管、支氣管和肺癌	52	46.89	22.32	氣管、支氣管和肺癌	27	23.00	16.46
2	肝和肝內膽管癌	62	27.15	15.62	肝和肝內膽管癌	42	37.87	18.03	女性乳房癌	23	19.59	14.02
3	結腸、直腸和肛門癌	48	21.02	12.09	結腸、直腸和肛門癌	26	23.44	11.16	結腸、直腸和肛門癌	22	18.74	13.41
4	女性乳房癌(1)	23	19.59	5.79	胃癌	18	16.23	7.73	肝和肝內膽管癌	20	17.03	12.20
5	胃癌	27	11.83	6.80	口腔癌	14	12.62	6.01	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	8.52	6.10
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	11	9.92	2.77	胰臟癌	13	11.72	5.58	胃癌	9	7.67	5.49
7	胰臟癌	22	9.64	5.54	前列腺(攝護腺)癌	11	9.92	4.72	胰臟癌	9	7.67	5.49
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	10	8.52	2.52	食道癌	9	8.11	3.86	子宮體癌	5	4.26	3.05
9	口腔癌	15	6.57	3.78	白血病	8	7.21	3.43	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.26	3.05
10	白血病	11	4.82	2.77	鼻咽癌	7	6.31	3.00	腦癌	5	4.26	3.05
	其他	89	38.98	22.42	其他	33	29.75	14.16	其他	29	24.70	17.68
11	非何杰金氏淋巴瘤	10	4.38	2.52	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.51	2.15	卵巢癌	4	3.41	2.44
12	子宮體癌(1)	5	4.26	1.26	間皮和軟組織癌	3	2.70	1.29	膽囊和其他膽道癌	4	3.41	2.44
13	食道癌	9	3.94	2.27	膀胱癌	3	2.70	1.29	白血病	3	2.56	1.83
14	鼻咽癌	9	3.94	2.27	膽囊和其他膽道癌	3	2.70	1.29	間皮和軟組織癌	2	1.70	1.22
15	卵巢癌(1)	4	3.41	1.01	喉癌	2	1.80	0.86	鼻咽癌	2	1.70	1.22

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表30-3・ICD-10 臺北市大安區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	501	159.36	100.00	所有癌症死亡原因	298	200.24	100.00	所有癌症死亡原因	203	122.61	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	105	33.40	20.96	氣管、支氣管和肺癌	65	43.68	21.81	氣管、支氣管和肺癌	40	24.16	19.70
2	結腸、直腸和肛門癌	75	23.86	14.97	肝和肝內膽管癌	48	32.25	16.11	結腸、直腸和肛門癌	31	18.72	15.27
3	肝和肝內膽管癌	68	21.63	13.57	結腸、直腸和肛門癌	44	29.57	14.77	女性乳房癌	24	14.50	11.82
4	女性乳房癌(1)	24	14.50	4.79	胃癌	22	14.78	7.38	肝和肝內膽管癌	20	12.08	9.85
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	18	12.10	3.59	前列腺(攝護腺)癌	18	12.10	6.04	胃癌	8	4.83	3.94
6	胃癌	30	9.54	5.99	胰臟癌	16	10.75	5.37	胰臟癌	7	4.23	3.45
7	胰臟癌	23	7.32	4.59	非何杰金氏淋巴瘤	10	6.72	3.36	膽囊和其他膽道癌	7	4.23	3.45
8	膀胱癌	15	4.77	2.99	口腔癌	9	6.05	3.02	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	3.62	2.96
9	非何杰金氏淋巴瘤	14	4.45	2.79	膀胱癌	9	6.05	3.02	卵巢癌	6	3.62	2.96
10	口腔癌	12	3.82	2.40	白血病	6	4.03	2.01	腦癌	6	3.62	2.96
	其他	117	37.22	23.35	其他	51	34.27	17.11	其他	48	28.99	23.65
11	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	3.62	1.20	間皮和軟組織癌	6	4.03	2.01	膀胱癌	6	3.62	2.96
12	卵巢癌(1)	6	3.62	1.20	腎臟癌	4	2.69	1.34	子宮體癌	5	3.02	2.46
13	白血病	10	3.18	2.00	黑色素瘤和其他皮膚癌	4	2.69	1.34	白血病	4	2.42	1.97
14	間皮和軟組織癌	10	3.18	2.00	鼻咽癌	4	2.69	1.34	非何杰金氏淋巴瘤	4	2.42	1.97
15	子宮體癌(1)	5	3.02	1.00	食道癌	3	2.02	1.01	間皮和軟組織癌	4	2.42	1.97

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表30-4・ICD-10 臺北市中山區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	382	174.70	100.00	所有癌症死亡原因	230	221.64	100.00	所有癌症死亡原因	152	132.30	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	71	32.47	18.59	肝和肝內膽管癌	43	41.44	18.70	氣管、支氣管和肺癌	30	26.11	19.74
2	肝和肝內膽管癌	62	28.35	16.23	氣管、支氣管和肺癌	41	39.51	17.83	肝和肝內膽管癌	19	16.54	12.50
3	結腸、直腸和肛門癌	52	23.78	13.61	結腸、直腸和肛門癌	33	31.80	14.35	結腸、直腸和肛門癌	19	16.54	12.50
4	胃癌	33	15.09	8.64	胃癌	19	18.31	8.26	女性乳房癌	14	12.19	9.21
5	女性乳房癌(1)	14	12.19	3.66	白血病	12	11.56	5.22	胃癌	14	12.19	9.21
6	白血病	17	7.77	4.45	胰臟癌	12	11.56	5.22	非何杰金氏淋巴瘤	7	6.09	4.61
7	前列腺(攝護腺)癌(2)	8	7.71	2.09	口腔癌	10	9.64	4.35	卵巢癌	6	5.22	3.95
8	胰臟癌	14	6.40	3.66	食道癌	9	8.67	3.91	白血病	5	4.35	3.29
9	口腔癌	12	5.49	3.14	前列腺(攝護腺)癌	8	7.71	3.48	膀胱癌	4	3.48	2.63
10	卵巢癌(1)	6	5.22	1.57	鼻咽癌	5	4.82	2.17	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	2.61	1.97
	其他	93	42.53	24.35	其他	38	36.62	16.52	其他	31	26.98	20.39
11	非何杰金氏淋巴瘤	11	5.03	2.88	非何杰金氏淋巴瘤	4	3.85	1.74	膽囊和其他膽道癌	3	2.61	1.97
12	食道癌	11	5.03	2.88	腎臟癌	4	3.85	1.74	口腔癌	2	1.74	1.32
13	膀胱癌	7	3.20	1.83	間皮和軟組織癌	4	3.85	1.74	子宮體癌	2	1.74	1.32
14	間皮和軟組織癌	6	2.74	1.57	喉癌	3	2.89	1.30	食道癌	2	1.74	1.32
15	鼻咽癌	6	2.74	1.57	膀胱癌	3	2.89	1.30	胰臟癌	2	1.74	1.32

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表30-5・ICD-10 臺北市中正區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	303	190.07	100.00	所有癌症死亡原因	181	234.25	100.00	所有癌症死亡原因	122	148.52	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	60	37.64	19.80	氣管、支氣管和肺癌	39	50.47	21.55	結腸、直腸和肛門癌	23	28.00	18.85
2	結腸、直腸和肛門癌	47	29.48	15.51	肝和肝內膽管癌	26	33.65	14.36	氣管、支氣管和肺癌	21	25.56	17.21
3	肝和肝內膽管癌	33	20.70	10.89	結腸、直腸和肛門癌	24	31.06	13.26	女性乳房癌	16	19.48	13.11
4	女性乳房癌(1)	16	19.48	5.28	胃癌	22	28.47	12.15	肝和肝內膽管癌	7	8.52	5.74
5	胃癌	29	18.19	9.57	前列腺(攝護腺)癌	9	11.65	4.97	胃癌	7	8.52	5.74
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	9	11.65	2.97	白血病	6	7.77	3.31	卵巢癌	6	7.30	4.92
7	卵巢癌(1)	6	7.30	1.98	食道癌	6	7.77	3.31	白血病	5	6.09	4.10
8	白血病	11	6.90	3.63	鼻咽癌	6	7.77	3.31	胰臟癌	5	6.09	4.10
9	胰臟癌	9	5.65	2.97	口腔癌	5	6.47	2.76	子宮頸及部位未明示子宮癌	4	4.87	3.28
10	口腔癌	8	5.02	2.64	非何杰金氏淋巴瘤	5	6.47	2.76	腎臟癌	4	4.87	3.28
	其他	75	47.05	24.75	其他	33	42.71	18.23	其他	24	29.22	19.67
11	非何杰金氏淋巴瘤	8	5.66	5.02	胰臟癌	4	5.18	2.21	口腔癌	3	3.65	2.46
12	食道癌	8	5.18	5.02	喉癌	4	5.18	2.21	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.65	2.46
13	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	4	3.77	4.87	膀胱癌	4	5.18	2.21	膽囊和其他膽道癌	3	3.65	2.46
14	膽囊和其他膽道癌	7	3.67	4.39	膽囊和其他膽道癌	4	5.18	2.21	子宮體癌	2	2.43	1.64
15	腎臟癌	6	2.52	3.76	腎臟癌	2	2.59	1.10	食道癌	2	2.43	1.64

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表30-6・ICD-10 臺北市大同區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	267	212.93	100.00	所有癌症死亡原因	164	263.70	100.00	所有癌症死亡原因	103	162.98	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	56	44.66	20.97	氣管、支氣管和肺癌	37	59.49	22.56	氣管、支氣管和肺癌	19	30.06	18.45
2	肝和肝內膽管癌	52	41.47	19.48	肝和肝內膽管癌	36	57.88	21.95	女性乳房癌	16	25.32	15.53
3	結腸、直腸和肛門癌	35	27.91	13.11	結腸、直腸和肛門癌	23	36.98	14.02	肝和肝內膽管癌	16	25.32	15.53
4	女性乳房癌(1)	16	25.32	5.99	胃癌	12	19.29	7.32	結腸、直腸和肛門癌	12	18.99	11.65
5	胃癌	14	11.17	5.24	食道癌	7	11.26	4.27	白血病	6	9.49	5.83
6	白血病	9	7.18	3.37	口腔癌	6	9.65	3.66	卵巢癌	4	6.33	3.88
7	食道癌	9	7.18	3.37	膀胱癌	5	8.04	3.05	非何杰金氏淋巴瘤	4	6.33	3.88
8	口腔癌	8	6.38	3.00	鼻咽癌	5	8.04	3.05	子宮頸及部位未明示子宮癌	3	4.75	2.91
9	卵巢癌(1)	4	6.33	1.50	胰臟癌	4	6.43	2.44	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	4.75	2.91
10	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.58	2.62	白血病	3	4.82	1.83	口腔癌	2	3.16	1.94
	其他	57	45.46	21.35	其他	26	41.81	15.85	其他	18	28.48	17.48
11	膀胱癌	7	5.58	2.62	非何杰金氏淋巴瘤	3	4.82	1.83	胃癌	2	3.16	1.94
12	鼻咽癌	7	5.58	2.62	前列腺(攝護腺)癌	3	4.82	1.83	食道癌	2	3.16	1.94
13	前列腺(攝護腺)癌	3	4.82	1.12	腎臟癌	2	3.22	1.22	膀胱癌	2	3.16	1.94
14	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	3	4.75	1.12	腦癌	2	3.22	1.22	鼻咽癌	2	3.16	1.94
15	胰臟癌	5	3.99	1.87	膽囊和其他膽道癌	2	3.22	1.22	子宮體癌	1	1.58	0.97

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表30-7・ICD-10 臺北市萬華區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	394	205.83	100.00	所有癌症死亡原因	251	260.39	100.00	所有癌症死亡原因	143	150.49	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	91	47.54	23.10	氣管、支氣管和肺癌	67	69.51	26.69	肝和肝內膽管癌	31	32.62	21.68
2	肝和肝內膽管癌	76	39.70	19.29	肝和肝內膽管癌	45	46.68	17.93	氣管、支氣管和肺癌	24	25.26	16.78
3	結腸、直腸和肛門癌	48	25.08	12.18	結腸、直腸和肛門癌	28	29.05	11.16	結腸、直腸和肛門癌	20	21.05	13.99
4	胃癌	25	13.06	6.35	胃癌	19	19.71	7.57	女性乳房癌	9	9.47	6.29
5	胰臟癌	20	10.45	5.08	口腔癌	11	11.41	4.38	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	9.47	6.29
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	10	10.37	2.54	胰臟癌	11	11.41	4.38	胰臟癌	9	9.47	6.29
7	女性乳房癌(1)	9	9.47	2.28	前列腺(攝護腺)癌	10	10.37	3.98	胃癌	6	6.31	4.20
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	9.47	2.28	膀胱癌	7	7.26	2.79	白血病	4	4.21	2.80
9	口腔癌	11	5.75	2.79	非何杰金氏淋巴瘤	6	6.22	2.39	卵巢癌	4	4.21	2.80
10	膀胱癌	10	5.22	2.54	食道癌	6	6.22	2.39	鼻咽癌	4	4.21	2.80
	其他	85	44.41	21.57	其他	41	42.53	16.33	其他	23	24.20	16.08
11	白血病	9	4.70	2.28	白血病	5	5.19	1.99	非何杰金氏淋巴瘤	3	3.16	2.10
12	非何杰金氏淋巴瘤	9	4.70	2.28	鼻咽癌	5	5.19	1.99	黑色素瘤和其他皮膚癌	3	3.16	2.10
13	鼻咽癌	9	4.70	2.28	膽囊和其他膽道癌	5	5.19	1.99	膀胱癌	3	3.16	2.10
14	卵巢癌(1)	4	4.21	1.02	喉癌	3	3.11	1.20	膽囊和其他膽道癌	3	3.16	2.10
15	膽囊和其他膽道癌	8	4.18	2.03	骨和關節軟骨癌	2	2.07	0.80	腎臟癌	2	2.10	1.40

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表30-8・ICD-10 臺北市文山區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	426	162.79	100.00	所有癌症死亡原因	256	200.72	100.00	所有癌症死亡原因	170	126.72	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	99	37.83	23.24	氣管、支氣管和肺癌	57	44.69	22.27	氣管、支氣管和肺癌	42	31.31	24.71
2	肝和肝內膽管癌	64	24.46	15.02	肝和肝內膽管癌	47	36.85	18.36	女性乳房癌	28	20.87	16.47
3	女性乳房癌(1)	28	20.87	6.57	結腸、直腸和肛門癌	30	23.52	11.72	結腸、直腸和肛門癌	18	13.42	10.59
4	結腸、直腸和肛門癌	48	18.34	11.27	胃癌	18	14.11	7.03	肝和肝內膽管癌	17	12.67	10.00
5	胃癌	21	8.02	4.93	食道癌	14	10.98	5.47	胰臟癌	8	5.96	4.71
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	9	7.06	2.11	胰臟癌	10	7.84	3.91	卵巢癌	7	5.22	4.12
7	胰臟癌	18	6.88	4.23	口腔癌	9	7.06	3.52	子宮頸及部位未明示子宮癌	6	4.47	3.53
8	食道癌	16	6.11	3.76	前列腺(攝護腺)癌	9	7.06	3.52	非何杰金氏淋巴瘤	5	3.73	2.94
9	卵巢癌(1)	7	5.22	1.64	白血病	8	6.27	3.13	鼻咽癌	5	3.73	2.94
10	非何杰金氏淋巴瘤	12	4.59	2.82	膀胱癌	8	6.27	3.13	腦癌	4	2.98	2.35
	其他	104	39.74	24.41	其他	46	36.07	17.97	其他	30	22.36	17.65
11	鼻咽癌	12	4.59	2.82	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.49	2.73	白血病	3	2.24	1.76
12	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	6	4.47	1.41	鼻咽癌	7	5.49	2.73	胃癌	3	2.24	1.76
13	口腔癌	11	4.20	2.58	腦癌	4	3.14	1.56	腎臟癌	3	2.24	1.76
14	白血病	11	4.20	2.58	膽囊和其他膽道癌	4	3.14	1.56	口腔癌	2	1.49	1.18
15	腦癌	8	3.06	1.88	骨和關節軟骨癌	2	1.57	0.78	食道癌	2	1.49	1.18

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表30-9・ICD-10 臺北市南港區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	186	163.60	100.00	所有癌症死亡原因	105	185.99	100.00	所有癌症死亡原因	81	141.51	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	36	31.66	19.35	氣管、支氣管和肺癌	22	38.97	20.95	女性乳房癌	14	24.46	17.28
2	女性乳房癌(1)	14	24.46	7.53	肝和肝內膽管癌	18	31.88	17.14	氣管、支氣管和肺癌	14	24.46	17.28
3	肝和肝內膽管癌	26	22.87	13.98	胃癌	14	24.80	13.33	胃癌	12	20.96	14.81
4	胃癌	26	22.87	13.98	結腸、直腸和肛門癌	12	21.26	11.43	結腸、直腸和肛門癌	9	15.72	11.11
5	結腸、直腸和肛門癌	21	18.47	11.29	食道癌	8	14.17	7.62	肝和肝內膽管癌	8	13.98	9.88
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	4	7.09	2.15	白血病	6	10.63	5.71	胰臟癌	6	10.48	7.41
7	白血病	8	7.04	4.30	口腔癌	5	8.86	4.76	卵巢癌	3	5.24	3.70
8	食道癌	8	7.04	4.30	非何杰金氏淋巴瘤	4	7.09	3.81	間皮和軟組織癌	3	5.24	3.70
9	胰臟癌	8	7.04	4.30	前列腺(攝護腺)癌	4	7.09	3.81	白血病	2	3.49	2.47
10	卵巢癌(1)	3	5.24	1.61	胰臟癌	2	3.54	1.90	膽囊和其他膽道癌	2	3.49	2.47
	其他	32	28.15	17.20	其他	10	17.71	9.52	其他	8	13.98	9.88
11	口腔癌	5	4.40	2.69	腦癌	2	3.54	1.90	子宮頸及部位未明示子宮癌	1	1.75	1.23
12	非何杰金氏淋巴瘤	5	4.40	2.69	膀胱癌	2	3.54	1.90	非何杰金氏淋巴瘤	1	1.75	1.23
13	間皮和軟組織癌	3	2.64	1.61	鼻咽癌	2	3.54	1.90	腎臟癌	1	1.75	1.23
14	腎臟癌	2	1.76	1.08	何杰金氏症	1	1.77	0.95	其他癌症	5	8.74	6.17
15	腦癌	2	1.76	1.08	胸腺癌	1	1.77	0.95				

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表30-10・ICD-10 臺北市內湖區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	366	137.51	100.00	所有癌症死亡原因	221	171.24	100.00	所有癌症死亡原因	145	105.76	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	76	28.55	20.77	氣管、支氣管和肺癌	45	34.87	20.36	氣管、支氣管和肺癌	31	22.61	21.38
2	肝和肝內膽管癌	66	24.80	18.03	肝和肝內膽管癌	44	34.09	19.91	肝和肝內膽管癌	22	16.05	15.17
3	女性乳房癌(1)	21	15.32	5.74	胃癌	21	16.27	9.50	女性乳房癌	21	15.32	14.48
4	結腸、直腸和肛門癌	38	14.28	10.38	結腸、直腸和肛門癌	19	14.72	8.60	結腸、直腸和肛門癌	19	13.86	13.10
5	胃癌	25	9.39	6.83	食道癌	12	9.30	5.43	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	5.83	5.52
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	9	6.97	2.46	口腔癌	9	6.97	4.07	胰臟癌	7	5.11	4.83
7	胰臟癌	16	6.01	4.37	前列腺(攝護腺)癌	9	6.97	4.07	胃癌	4	2.92	2.76
8	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	5.83	2.19	胰臟癌	9	6.97	4.07	腎臟癌	4	2.92	2.76
9	食道癌	12	4.51	3.28	非何杰金氏淋巴瘤	6	4.65	2.71	非何杰金氏淋巴瘤	3	2.19	2.07
10	口腔癌	11	4.13	3.01	鼻咽癌	6	4.65	2.71	間皮和軟組織癌	3	2.19	2.07
	其他	84	31.56	22.95	其他	41	31.77	18.55	其他	23	16.78	15.86
11	非何杰金氏淋巴瘤	9	3.38	2.46	腦癌	5	3.87	2.26	口腔癌	2	1.46	1.38
12	鼻咽癌	8	3.01	2.19	膀胱癌	5	3.87	2.26	白血病	2	1.46	1.38
13	腎臟癌	7	2.63	1.91	白血病	4	3.10	1.81	腦癌	2	1.46	1.38
14	腦癌	7	2.63	1.91	腎臟癌	3	2.32	1.36	鼻咽癌	2	1.46	1.38
15	白血病	6	2.25	1.64	間皮和軟組織癌	3	2.32	1.36	膽囊和其他膽道癌	2	1.46	1.38

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表30-11・ICD-10 臺北市士林區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	475	165.76	100.00	所有癌症死亡原因	280	199.97	100.00	所有癌症死亡原因	195	133.07	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	95	33.15	20.00	氣管、支氣管和肺癌	61	43.57	21.79	氣管、支氣管和肺癌	34	23.20	17.44
2	肝和肝內膽管癌	74	25.82	15.58	肝和肝內膽管癌	52	37.14	18.57	女性乳房癌	27	18.43	13.85
3	結腸、直腸和肛門癌	67	23.38	14.11	結腸、直腸和肛門癌	41	29.28	14.64	結腸、直腸和肛門癌	26	17.74	13.33
4	女性乳房癌(1)	27	18.43	5.68	食道癌	18	12.86	6.43	肝和肝內膽管癌	22	15.01	11.28
5	胃癌	33	11.52	6.95	口腔癌	17	12.14	6.07	胃癌	17	11.60	8.72
6	前列腺(攝護腺)癌(2)	15	10.71	3.16	胃癌	16	11.43	5.71	子宮頸及部位未明示子宮癌	9	6.14	4.62
7	食道癌	19	6.63	4.00	前列腺(攝護腺)癌	15	10.71	5.36	胰臟癌	9	6.14	4.62
8	胰臟癌	18	6.28	3.79	胰臟癌	9	6.43	3.21	卵巢癌	8	5.46	4.10
9	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	6.14	1.89	白血病	7	5.00	2.50	非何杰金氏淋巴瘤	8	5.46	4.10
10	口腔癌	17	5.93	3.58	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.00	2.50	子宮體癌	6	4.09	3.08
	其他	101	35.25	21.26	其他	37	26.43	13.21	其他	29	19.79	14.87
11	卵巢癌(1)	8	5.46	1.68	鼻咽癌	4	2.86	1.43	腎臟癌	5	3.41	2.56
12	非何杰金氏淋巴瘤	15	5.23	3.16	喉癌	3	2.14	1.07	白血病	4	2.73	2.05
13	子宮體癌(1)	6	4.09	1.26	腦癌	3	2.14	1.07	間皮和軟組織癌	2	1.36	1.03
14	白血病	11	3.84	2.32	甲狀腺癌	2	1.43	0.71	黑色素瘤和其他皮膚癌	2	1.36	1.03
15	腎臟癌	7	2.44	1.47	男性生殖器官癌(攝護腺除外)	2	1.43	0.71	膀胱癌	2	1.36	1.03

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

表30-12・ICD-10 臺北市北投區主要癌症死亡原因

中華民國97年

單位：人，人/每十萬人口，%

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比	死 亡 原 因	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 百 分 比
	所有癌症死亡原因	464	185.70	100.00	所有癌症死亡原因	289	237.18	100.00	所有癌症死亡原因	175	136.70	100.00
1	氣管、支氣管和肺癌	97	38.82	20.91	氣管、支氣管和肺癌	62	50.88	21.45	氣管、支氣管和肺癌	35	27.34	20.00
2	肝和肝內膽管癌	74	29.62	15.95	肝和肝內膽管癌	57	46.78	19.72	女性乳房癌	20	15.62	11.43
3	結腸、直腸和肛門癌	52	20.81	11.21	結腸、直腸和肛門癌	33	27.08	11.42	結腸、直腸和肛門癌	19	14.84	10.86
4	女性乳房癌(1)	20	15.62	4.31	胃癌	21	17.23	7.27	肝和肝內膽管癌	17	13.28	9.71
5	前列腺(攝護腺)癌(2)	14	11.49	3.02	前列腺(攝護腺)癌	14	11.49	4.84	子宮頸及部位未明示子宮癌	10	7.81	5.71
6	胃癌	27	10.81	5.82	口腔癌	12	9.85	4.15	胰臟癌	10	7.81	5.71
7	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	10	7.81	2.16	非何杰金氏淋巴瘤	12	9.85	4.15	非何杰金氏淋巴瘤	7	5.47	4.00
8	非何杰金氏淋巴瘤	19	7.60	4.09	食道癌	10	8.21	3.46	卵巢癌	6	4.69	3.43
9	胰臟癌	19	7.60	4.09	胰臟癌	9	7.39	3.11	胃癌	6	4.69	3.43
10	口腔癌	13	5.20	2.80	鼻咽癌	8	6.57	2.77	白血病	3	2.34	1.71
	其他	119	47.63	25.65	其他	51	41.86	17.65	其他	42	32.81	24.00
11	食道癌	13	5.20	2.80	白血病	6	4.92	2.08	食道癌	3	2.34	1.71
12	卵巢癌(1)	6	4.69	1.29	膀胱癌	6	4.92	2.08	間皮和軟組織癌	3	2.34	1.71
13	鼻咽癌	11	4.40	2.37	間皮和軟組織癌	4	3.28	1.38	腦癌	3	2.34	1.71
14	白血病	9	3.60	1.94	膽囊和其他膽道癌	4	3.28	1.38	膀胱癌	3	2.34	1.71
15	膀胱癌	9	3.60	1.94	喉癌	3	2.46	1.04	鼻咽癌	3	2.34	1.71

附註：(1)每十萬女性人口死亡率 (2)每十萬男性人口死亡率。

肆、歷年死因統計

一、主要死因統計

表31・臺北市歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		11,018	415.24		11,551	437.00		11,989	457.75		12,054	463.27		12,205	465.98		12,424	470.49	
08-14	惡性腫瘤	1	2,960	111.55	1	3,180	120.31	1	3,366	128.52	1	3,504	134.67	1	3,489	133.21	1	3,564	134.97	
25-27-28*	心臟疾病	2	1,317	49.63	3	1,257	47.56	2	1,384	52.84	2	1,453	55.84	2	1,331	50.82	2	1,428	54.08	
29	腦血管疾病	3	1,158	43.64	2	1,306	49.41	3	1,361	51.96	3	1,326	50.96	3	1,303	49.75	3	1,209	45.78	
181	糖尿病	5	525	19.79	5	620	23.46	5	634	24.21	4	755	29.02	5	647	24.70	4	863	32.68	
321	肺炎	8	308	11.61	7	372	14.07	8	332	12.68	9	276	10.61	8	330	12.60	8	396	15.00	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	322	12.14	8	358	13.54	6	368	14.05	6	378	14.53	6	413	15.77	6	419	15.87	
E47-E53	事故傷害	4	890	33.54	4	752	28.45	4	772	29.48	5	683	26.25	4	692	26.42	5	658	24.92	
E54	自殺	10	173	6.52	10	206	7.79	10	224	8.55	10	214	8.22	10	201	7.67	10	212	8.03	
347	慢性肝病及肝硬化	6	358	13.49	6	380	14.38	7	367	14.01	7	349	13.41	7	389	14.85	7	404	15.30	
038	敗血症	13	74	2.79	13	96	3.63	12	132	5.04	13	129	4.96	13	116	4.43	16	70	2.65	
26	高血壓性疾病	9	264	9.95	9	292	11.05	9	328	12.52	8	286	10.99	9	281	10.73	9	250	9.47	
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	151	5.69	11	190	7.19	11	183	6.99	11	182	6.99	11	200	7.64	11	156	5.91	
341	胃及十二指腸之潰瘍	15	51	1.92	16	76	2.88	16	87	3.32	16	63	2.42	16	59	2.25	14	81	3.07	
02	結核病	12	130	4.90	15	80	3.03	13	107	4.09	12	180	6.92	12	122	4.66	12	99	3.75	
44	先天性畸形	14	69	2.60	12	99	3.75	14	92	3.51	14	106	4.07	15	71	2.71	13	82	3.11	
	其他		2,268	85.47		2,287	86.52		2,252	85.98		2,170	83.40		2,561	97.78		2,533	95.92	
註：	年中人口數		2,653,412			2,643,220			2,619,118			2,601,934			2,619,216			2,640,626		

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表31・臺北市歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		12,799	484.10		13,222	500.81		13,279	503.41		13,631	517.40		13,733	523.20		14,339	547.41	
08-14	惡性腫瘤	1	3,738	141.38	1	4,089	154.88	1	4,169	158.05	1	4,001	151.87	1	4,202	160.09	1	4,290	163.78	
25-27-28*	心臟疾病	3	1,252	47.35	3	1,383	52.38	2	1,450	54.97	2	1,642	62.33	2	1,732	65.99	2	1,665	63.56	
29	腦血管疾病	2	1,380	52.20	2	1,397	52.91	3	1,233	46.74	3	1,325	50.29	3	1,240	47.24	3	1,367	52.19	
181	糖尿病	4	1,004	37.97	4	903	34.20	4	889	33.70	4	946	35.91	4	893	34.02	4	988	37.72	
321	肺炎	8	316	11.95	7	367	13.90	7	448	16.98	5	567	21.52	7	447	17.03	5	572	21.84	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	457	17.29	6	490	18.56	6	456	17.29	6	503	19.09	5	503	19.16	6	544	20.77	
E47-E53	事故傷害	5	599	22.66	5	506	19.17	5	514	19.49	7	455	17.27	6	463	17.64	8	415	15.84	
E54	自殺	9	237	8.96	9	290	10.98	8	325	12.32	9	320	12.15	8	346	13.18	7	467	17.83	
347	慢性肝病及肝硬化	7	373	14.11	8	365	13.83	9	305	11.56	8	367	13.93	9	333	12.69	9	323	12.33	
038	敗血症	14	85	3.21	12	116	4.39	12	109	4.13	13	93	3.53	12	94	3.58	11	150	5.73	
26	高血壓性疾病	10	191	7.22	10	167	6.33	10	179	6.79	10	142	5.39	10	167	6.36	10	162	6.18	
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	142	5.37	11	149	5.64	11	123	4.66	11	115	4.37	11	113	4.31	12	109	4.16	
341	胃及十二指腸之潰瘍	12	111	4.20	15	75	2.84	16	61	2.31	14	64	2.43	14	70	2.67	13	77	2.94	
02	結核病	12	111	4.20	13	89	3.37	13	82	3.11	12	98	3.72	13	74	2.82	14	60	2.29	
44	先天性畸形	15	81	3.06	16	67	2.54	15	64	2.43	15	41	1.56	15	48	1.83	16	39	1.49	
	其他		2,722	102.95		2,769	104.88		2,872	108.88		2,952	112.05		3,008	114.60		3,111	118.77	
註：	年中人口數		2,643,893			2,640,138			2,637,829			2,634,497			2,624,805			2,619,424		

表31・臺北市歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		13,875	528.71		14,486	550.64	A00-Y98	所有死亡原因		15,119	575.72
08-14	惡性腫瘤	1	4,423	168.54	1	4,566	173.56	C00-C97	惡性腫瘤	1	4,467	170.10
25-27-28*	心臟疾病	2	1,527	58.19	2	1,642	62.42	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	2,014	76.69
29	腦血管疾病	3	1,182	45.04	3	1,289	49.00	I60-I69	腦血管疾病	3	1,199	45.66
181	糖尿病	4	946	36.05	4	958	36.42	J12-J18	肺炎	4	950	36.18
321	肺炎	5	575	21.91	5	688	26.15	E10-E14	糖尿病	5	716	27.26
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	485	18.48	6	549	20.87	A40-A41	敗血症	6	513	19.53
E47-E53	事故傷害	8	379	14.44	7	372	14.14	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	491	18.70
E54	自殺	7	454	17.30	8	364	13.84	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	446	16.98
347	慢性肝病及肝硬化	9	317	12.08	9	331	12.58	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	9	389	14.81
038	敗血症	11	145	5.53	10	188	7.15	I10-I15	高血壓性疾病	10	374	14.24
26	高血壓性疾病	10	176	6.71	11	141	5.36	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	11	370	14.09
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	92	3.51	12	97	3.69	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	296	11.27
341	胃及十二指腸之潰瘍	13	79	3.01	13	80	3.04	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	281	10.70
02	結核病	14	68	2.59	14	57	2.17	G20-G21	帕金森病	14	93	3.54
44	先天性畸形	15	42	1.60	15	48	1.82	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	15	76	2.89
	其他		2,985	113.74		3,116	118.45		其他		2,444	93.07
註：	年中人口數		2,624,309			2,630,756					2,626,096	

表32・臺北市歷年男性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死 因 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		6,845	514.31		7,172	541.89		7,451	568.85		7,351	565.92		7,546	578.81		7,593	579.35	
08-14	惡性腫瘤	1	1,848	138.85	1	1,977	149.38	1	2,118	161.70	1	2,135	164.36	1	2,154	165.22	1	2,235	170.53	
25-27-28*	心臟疾病	2	814	61.16	3	791	59.77	2	892	68.10	2	910	70.06	2	817	62.67	2	895	68.29	
29	腦血管疾病	3	702	52.75	2	800	60.45	3	822	62.76	3	798	61.43	3	783	60.06	3	699	53.33	
181	糖尿病	6	238	17.88	5	328	24.78	5	309	23.59	5	390	30.02	5	323	24.78	5	415	31.66	
321	肺炎	7	199	14.95	7	245	18.51	7	226	17.25	8	189	14.55	8	231	17.72	7	269	20.52	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	171	12.85	8	185	13.98	8	194	14.81	7	224	17.24	7	232	17.80	8	213	16.25	
E47-E53	事故傷害	4	659	49.52	4	535	40.42	4	560	42.75	4	491	37.80	4	494	37.89	4	437	33.34	
E54	自殺	10	122	9.17	11	123	9.29	10	155	11.83	11	125	9.62	11	125	9.59	9	143	10.91	
347	慢性肝病及肝硬化	5	260	19.54	6	273	20.63	6	253	19.32	6	247	19.02	6	277	21.25	6	306	23.35	
038	敗血症	13	42	3.16	14	50	3.78	13	78	5.95	13	74	5.70	13	64	4.91	15	38	2.90	
26	高血壓性疾病	9	145	10.89	9	167	12.62	9	190	14.51	9	158	12.16	9	159	12.20	9	143	10.91	
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	93	6.99	10	131	9.90	11	110	8.40	12	119	9.16	10	133	10.20	11	94	7.17	
02	胃及十二指腸之潰瘍	15	36	2.70	13	58	4.38	14	63	4.81	16	39	3.00	15	37	2.84	13	54	4.12	
02	結核病	11	98	7.36	12	71	5.36	12	80	6.11	10	141	10.85	12	92	7.06	12	78	5.95	
44	先天性畸形	14	40	3.01	16	48	3.63	15	54	4.12	14	60	4.62	15	37	2.84	16	37	2.82	
	其他		1,378	103.54		1,390	105.02		1,347	102.84		1,251	96.31		1,588	121.81		1,537	117.27	
註：	年中人口數		1,330,909			1,323,509			1,309,828			1,298,943			1,303,713			1,310,612		

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表32・臺北市歷年男性主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		7,841	598.84		8,056	617.44		8,001	615.07		8,213	633.43		8,352	647.93		8,763	683.06
08-14	惡性腫瘤	1	2,356	179.93	1	2,565	196.59	1	2,520	193.72	1	2,430	187.41	1	2,594	201.24	1	2,630	205.00
25-27-28*	心臟疾病	2	824	62.93	2	906	69.44	2	896	68.88	2	996	76.82	2	1,107	85.88	2	1,060	82.62
29	腦血管疾病	3	805	61.48	3	820	62.85	3	734	56.43	3	818	63.09	3	725	56.24	3	822	64.07
181	糖尿病	4	506	38.64	4	450	34.49	4	464	35.67	4	463	35.71	4	440	34.13	4	521	40.61
321	肺炎	8	192	14.66	8	233	17.86	6	314	24.14	5	369	28.46	6	300	23.27	5	370	28.84
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	242	18.48	6	257	19.70	7	246	18.91	7	261	20.13	7	278	21.57	6	324	25.26
E47-E53	事故傷害	5	426	32.53	5	365	27.97	5	359	27.60	6	316	24.37	5	342	26.53	8	312	24.32
E54	自殺	9	143	10.92	9	192	14.72	8	214	16.45	9	203	15.66	8	225	17.46	7	313	24.40
347	慢性肝病及肝硬化	6	253	19.32	7	239	18.32	9	209	16.07	8	249	19.20	9	222	17.22	9	192	14.97
038	敗血症	15	41	3.13	13	59	4.52	13	53	4.07	13	61	4.70	13	54	4.19	11	73	5.69
26	高血壓性疾病	10	117	8.94	11	88	6.74	10	99	7.61	11	70	5.40	10	82	6.36	10	106	8.26
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	99	7.56	10	95	7.28	11	75	5.77	12	68	5.24	11	73	5.66	12	71	5.53
341	胃及十二指腸之潰瘍	13	76	5.80	14	50	3.83	15	35	2.69	14	42	3.24	14	43	3.34	13	52	4.05
02	結核病	12	86	6.57	12	76	5.82	12	67	5.15	10	75	5.78	12	59	4.58	14	50	3.90
44	先天性畸形	14	47	3.59	16	33	2.53	16	34	2.61	15	23	1.77	16	25	1.94	17	17	1.33
	其他		1,628	124.33		1,628	124.78		1,682	129.30		1,769	136.43		1,783	138.32		1,850	144.20
註：	年中人口數			1,309,371			1,304,744			1,300,818			1,296,600			1,289,022			1,282,908

表32・臺北市歷年男性主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		8,387	654.67		8,633	674.39	A00-Y98	所有死亡原因		8,992	705.67
08-14	惡性腫瘤	1	2,695	210.37	1	2,757	215.37	C00-C97	惡性腫瘤	1	2,698	211.73
25-27-28*	心臟疾病	2	971	75.79	2	1,026	80.15	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	1,278	100.29
29	腦血管疾病	3	680	53.08	3	768	59.99	I60-I69	腦血管疾病	3	677	53.13
181	糖尿病	4	473	36.92	4	495	38.67	J12-J18	肺炎	4	619	48.58
321	肺炎	5	373	29.12	5	446	34.84	E10-E14	糖尿病	5	352	27.62
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	261	20.37	6	272	21.25	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	337	26.45
E47-E53	事故傷害	7	281	21.93	7	265	20.70	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	7	269	21.11
E54	自殺	6	309	24.12	8	228	17.81	A40-A41	敗血症	8	263	20.64
347	慢性肝病及肝硬化	9	210	16.39	9	222	17.34	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	240	18.83
038	敗血症	11	73	5.70	10	82	6.41	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	231	18.13
26	高血壓性疾病	10	94	7.34	11	69	5.39	I10-I15	高血壓性疾病	11	204	16.01
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	58	4.53	12	61	4.77	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	12	197	15.46
341	胃及十二指腸之潰瘍	14	43	3.36	13	48	3.75	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	13	132	10.36
02	結核病	13	53	4.14	14	40	3.12	A15-A19	結核病	14	56	4.39
44	先天性畸形	16	16	1.25	15	23	1.80	G20-G21	帕金森病	15	56	4.39
	其他		1,797	140.27		1,831	143.03		其他		1,383	108.53
註：年中人口數			1,281,102			1,280,124					1,274,252	

表33・臺北市歷年女性主要死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		4,173	315.54		4,379	331.81		4,538	346.60		4,703	360.94		4,659	354.16		4,831	363.23
08-14	惡性腫瘤	1	1,112	84.08	1	1,203	91.16	1	1,248	95.32	1	1,369	105.07	1	1,335	101.48	1	1,329	99.92
25-27-28*	心臟疾病	2	503	38.03	3	466	35.31	3	492	37.58	2	543	41.67	3	514	39.07	2	533	40.07
29	腦血管疾病	3	456	34.48	2	506	38.34	2	539	41.17	3	528	40.52	2	520	39.53	3	510	38.35
181	糖尿病	4	287	21.70	4	292	22.13	4	325	24.82	4	365	28.01	4	324	24.63	4	448	33.68
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	151	11.42	6	173	13.11	6	174	13.29	6	154	11.82	6	181	13.76	6	206	15.49
321	肺炎	8	109	8.24	7	127	9.62	9	106	8.10	10	87	6.68	9	99	7.53	7	127	9.55
E54	自殺	11	51	3.86	10	83	6.29	11	69	5.27	9	89	6.83	10	76	5.78	10	69	5.19
347	慢性肝病及肝硬化	9	98	7.41	9	107	8.11	8	114	8.71	8	102	7.83	8	112	8.51	9	98	7.37
E47-E53	事故傷害	5	231	17.47	5	217	16.44	5	212	16.19	5	192	14.74	5	198	15.05	5	221	16.62
038	敗血症	12	32	2.42	13	46	3.49	12	54	4.12	12	55	4.22	12	52	3.95	14	32	2.41
26	高血壓性疾病	7	119	9.00	8	125	9.47	7	138	10.54	7	128	9.82	7	122	9.27	8	107	8.05
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	10	58	4.39	11	59	4.47	10	73	5.58	11	63	4.84	11	67	5.09	11	62	4.66
341	胃及十二指腸之潰瘍	16	15	1.13	15	18	1.36	16	24	1.83	16	24	1.84	16	22	1.67	15	27	2.03
44	先天性畸形	14	29	2.19	12	51	3.86	13	38	2.90	13	46	3.53	13	34	2.58	12	45	3.38
200	貧血	18	8	0.60	17	10	0.76	19	6	0.46	18	9	0.69	18	7	0.53	17	6	0.45
	其他		914	69.11		896	67.89		926	70.73		949	72.83		996	75.71		1,011	76.01

註： 年中人口數 1,322,502 1,319,712 1,309,291 1,302,990 1,315,503 1,330,014

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表33・臺北市歷年女性主要死亡原因（續1）

		單位：人，人/每十萬女性人口																		
死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		4,958	371.52		5,166	386.85		5,278	394.76		5,418	404.96		5,381	402.84		5,576	417.20	
08-14	惡性腫瘤	1	1,382	103.56	1	1,524	114.12	1	1,649	123.33	1	1,571	117.42	1	1,608	120.38	1	1,660	124.20	
25-27-28*	心臟疾病	4	428	32.07	3	477	35.72	2	554	41.44	2	646	48.28	2	625	46.79	2	605	45.27	
29	腦血管疾病	2	575	43.09	2	577	43.21	3	499	37.32	3	507	37.90	3	515	38.55	3	545	40.78	
181	糖尿病	3	498	37.32	4	453	33.92	4	425	31.79	4	483	36.10	4	453	33.91	4	467	34.94	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	215	16.11	5	233	17.45	5	210	15.71	5	242	18.09	5	225	16.84	5	220	16.46	
321	肺炎	7	124	9.29	7	134	10.03	7	134	10.02	6	198	14.80	6	147	11.00	6	202	15.11	
E54	自殺	9	94	7.04	9	98	7.34	8	111	8.30	9	117	8.75	7	121	9.06	7	154	11.52	
347	慢性肝病及肝硬化	8	120	8.99	8	126	9.44	9	96	7.18	8	118	8.82	9	111	8.31	8	131	9.80	
E47-E53	事故傷害	6	173	12.96	6	141	10.56	6	155	11.59	7	139	10.39	7	121	9.06	9	103	7.71	
038	敗血症	11	44	3.30	11	57	4.27	11	56	4.19	12	32	2.39	11	40	2.99	10	77	5.76	
26	高血壓性疾病	10	74	5.55	10	79	5.92	10	80	5.98	10	72	5.38	10	85	6.36	11	56	4.19	
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	12	43	3.22	12	54	4.04	12	48	3.59	11	47	3.51	11	40	2.99	12	38	2.84	
341	胃及十二指腸之潰瘍	13	35	2.62	15	25	1.87	15	26	1.94	15	22	1.64	13	27	2.02	13	25	1.87	
44	先天性畸形	14	34	2.55	14	34	2.55	13	30	2.24	16	18	1.35	14	23	1.72	14	22	1.65	
200	貧血	17	17	1.27	16	13	0.97	17	9	0.67	17	14	1.05	16	17	1.27	16	13	0.97	
	其他		1,102	82.58		1,141	85.44		1,196	89.45		1,192	89.10		1,223	91.56		1,258	94.13	
註：	年中人口數		1,334,522			1,335,394			1,337,010			1,337,897			1,335,782			1,336,516		

表33・臺北市歷年女性主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		5,488	408.57		5,853	433.35	A00-Y98	所有死亡原因		6,127	453.23
08-14	惡性腫瘤	1	1,728	128.65	1	1,809	133.94	C00-C97	惡性腫瘤	1	1,769	130.86
25-27-28*	心臟疾病	2	556	41.39	2	616	45.61	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2	736	54.44
29	腦血管疾病	3	502	37.37	3	521	38.57	I60-I69	腦血管疾病	3	522	38.61
181	糖尿病	4	473	35.21	4	463	34.28	E10-E14	糖尿病	4	364	26.93
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	224	16.68	5	277	20.51	J12-J18	肺炎	5	331	24.49
321	肺炎	6	202	15.04	6	242	17.92	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	6	251	18.57
E54	自殺	7	145	10.80	7	136	10.07	A40-A41	敗血症	7	250	18.49
347	慢性肝病及肝硬化	8	107	7.97	8	109	8.07	I10-I15	高血壓性疾病	8	170	12.58
E47-E53	事故傷害	9	98	7.30	9	107	7.92	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	149	11.02
038	敗血症	11	72	5.36	10	106	7.85	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	10	139	10.28
26	高血壓性疾病	10	82	6.10	11	72	5.33	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	11	120	8.88
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	13	34	2.53	12	36	2.67	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	12	109	8.06
341	胃及十二指腸之潰瘍	12	36	2.68	13	32	2.37	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	99	7.32
44	先天性畸形	14	26	1.94	14	25	1.85	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	14	38	2.81
200	貧血	15	21	1.56	15	20	1.48	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	15	38	2.81
	其他		1,182	88.00		1,282	94.92		其他		1,042	77.08

註： 年中人口數 1,343,207 1,350,632 1,351,844

表34・臺北市歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡率

年別	新生兒死亡				嬰兒死亡				孕產婦死亡	
	死亡人數			死亡率 (‰)	死亡人數			死亡率 (‰)	死亡 人數	死亡率 (0/0000)
	計	男	女		計	男	女			
民國 60年	159	95	64	3.65	334	186	148	7.67	12	27.55
民國 65年	76	52	24	1.57	299	191	108	6.19	15	31.07
民國 70年	63	41	22	1.43	218	127	91	4.95	3	6.82
民國 75年	59	31	28	1.66	173	88	85	4.87	1	2.81
民國 80年	42	20	22	1.15	162	91	71	4.43	3	8.21
民國 85年	104	58	46	3.05	216	111	105	6.32	2	5.86
民國 86年	98	53	45	2.80	212	117	95	6.05	3	8.56
民國 87年	79	45	34	2.62	166	100	66	5.50	3	9.93
民國 88年	81	44	37	2.55	168	90	78	5.28	2	6.29
民國 89年	86	50	36	2.55	153	89	64	4.54	-	-
民國 90年	88	46	42	3.26	149	75	74	5.52	3	11.11
民國 91年	68	41	27	2.65	111	62	49	4.33	1	3.90
民國 92年	46	22	24	1.97	89	42	47	3.82	3	12.87
民國 93年	56	29	27	2.53	100	58	42	4.51	-	-
民國 94年	51	27	24	2.43	89	44	45	4.25	1	4.77
民國 95年	40	20	20	1.89	69	30	39	3.26	1	4.73
民國 96年	56	34	22	2.59	89	57	32	4.12	1	4.63
民國 97年	36	18	18	1.74	95	51	44	4.59	1	4.83

附註:1.新生兒死亡率=(出生4週內之嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數) × 1,000。

2.嬰兒死亡率=(未滿1歲嬰兒死亡數 / 活產嬰兒數) × 1,000

3.孕產婦死亡率=(孕產婦死亡數 / 活產嬰兒數) × 100,000。

4.97年死因統計資料配合衛生署改採國際疾病分類碼第十版(ICD-10)。

表35・臺北市歷年年齡結構別死亡率

年別	總計	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	單位：人／每十萬人口			
																		75-79	80-84	85+	
民國83年	415.24	490.06	32.33	19.81	17.46	53.21	68.64	78.29	89.84	118.95	181.01	274.19	422.50	677.21	1,072.78	1,665.31	2,612.84	4,280.09	6,920.11	11,346.28	
民國84年	437.00	682.71	32.62	18.42	27.06	60.57	77.17	65.05	90.99	113.30	160.75	261.74	386.95	681.57	1,081.85	1,676.13	2,664.91	4,267.21	7,274.45	11,039.79	
民國85年	457.75	673.86	45.78	17.30	22.78	47.79	69.88	74.81	89.43	121.56	175.14	270.34	402.54	688.84	1,105.93	1,573.56	2,674.67	4,300.10	6,908.85	11,667.37	
民國86年	463.27	633.97	46.94	15.83	14.87	39.99	48.43	68.09	84.34	131.22	184.72	273.57	392.13	626.42	1,050.42	1,650.66	2,469.82	4,285.18	6,565.16	11,540.95	
民國87年	465.98	519.20	47.91	21.16	12.41	35.07	53.31	66.86	72.52	130.10	160.17	246.88	379.54	634.67	975.66	1,630.90	2,443.44	4,064.66	6,730.79	11,230.74	
民國88年	470.49	554.05	30.48	12.65	20.64	37.55	42.38	57.00	69.13	113.03	159.35	251.56	350.49	566.77	968.13	1,472.13	2,409.57	3,959.08	6,641.81	11,953.77	
民國89年	484.10	477.82	34.20	14.45	17.16	47.15	44.74	49.58	75.59	119.57	153.35	242.18	350.33	575.30	925.06	1,530.22	2,402.38	3,923.90	6,530.01	11,437.54	
民國90年	500.81	508.22	31.83	15.72	15.49	35.56	44.36	46.11	67.09	118.49	168.75	242.39	391.39	564.51	938.44	1,527.54	2,418.31	3,807.86	6,329.57	11,330.28	
民國91年	503.41	437.72	41.40	13.99	14.90	30.58	36.58	53.21	69.89	117.86	163.49	244.55	353.34	564.14	903.31	1,399.37	2,330.38	3,611.06	6,167.56	11,169.46	
民國92年	517.40	372.82	24.52	11.92	14.46	34.85	36.65	54.73	77.59	112.50	146.43	233.45	339.14	511.37	829.43	1,415.81	2,269.54	3,555.13	6,175.39	11,670.54	
民國93年	523.20	452.52	32.87	11.12	14.57	27.91	46.19	53.77	77.28	107.85	159.51	227.93	349.91	545.62	850.44	1,253.79	2,119.75	3,456.63	6,116.51	10,769.36	
民國94年	547.41	426.71	21.69	15.85	13.42	41.51	38.86	53.63	86.38	104.37	164.56	240.15	350.28	464.27	850.95	1,295.29	2,034.07	3,557.58	6,002.50	11,305.33	
民國95年	528.71	340.67	29.64	11.84	15.21	34.40	44.62	63.55	65.17	112.92	155.35	237.33	365.65	507.15	721.45	1,150.53	2,001.99	3,249.51	5,306.01	10,046.38	
民國96年	550.64	434.21	20.37	17.43	7.01	25.78	39.69	52.14	56.09	98.39	148.71	246.28	311.48	475.52	708.13	1,171.78	2,041.12	3,320.52	5,341.79	10,629.20	
民國97年	575.72	469.11	23.18	16.16	12.47	19.20	45.78	48.92	66.26	105.37	157.67	230.61	330.13	455.61	699.50	1,124.34	2,016.68	3,257.44	5,549.18	10,992.30	

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表36・臺北市歷年意外事故死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年		84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年	
		死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬
		人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
E47-E53	事故傷害合計	890	33.54	752	28.45	772	29.48	683	26.25	692	26.42	658	24.92	599	22.66	506	19.17	514	19.49
E47	運輸事故	454	17.11	393	14.87	391	14.93	351	13.49	335	12.79	221	8.37	225	8.51	195	7.39	249	9.44
E48	意外中毒	51	1.92	39	1.48	32	1.22	33	1.27	21	0.80	24	0.91	28	1.06	24	0.91	27	1.02
E49	內科醫療之意外事故， 異常反應及後期併發症	2	0.08	2	0.08	-	-	-	-	1	0.04	3	0.11	1	0.04	-	-	1	0.04
E50	意外墜落	136	5.13	97	3.67	112	4.28	110	4.23	115	4.39	146	5.53	144	5.45	109	4.13	86	3.26
E51	火及火焰所致之意外事 故	47	1.77	30	1.13	40	1.53	35	1.35	35	1.34	21	0.80	20	0.76	13	0.49	12	0.45
E52	其他意外事故，包括後 期影響	200	7.54	191	7.23	197	7.52	153	5.88	185	7.06	243	9.20	181	6.85	165	6.25	139	5.27
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附 註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表36・臺北市歷年意外事故死亡原因（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	92年		93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
E47-E53	事故傷害合計	455	17.27	463	17.64	415	15.84	379	14.44	372	14.14	V01-X59, Y85-Y86	意外事故合計	389	14.81
E47	運輸事故	189	7.17	204	7.77	205	7.83	201	7.66	172	6.54	V01-V99	運輸意外事故	153	5.83
E48	意外中毒	26	0.99	26	0.99	24	0.92	18	0.69	24	0.91	W00-W19	跌倒(落)	91	3.47
E49	內科醫療之意外事故， 異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W65-W74	意外溺死和淹沒	26	0.99
E50	意外墜落	103	3.91	89	3.39	99	3.78	63	2.40	87	3.31	W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	19	0.72
E51	火及火焰所致之意外事 故	19	0.72	4	0.15	4	0.15	6	0.23	7	0.27	X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災 和火焰	6	0.23
E52	其他意外事故，包括後 期影響	118	4.48	140	5.33	83	3.17	91	3.47	82	3.12	X40-X49	毒害物質(所致)的意外 中毒及暴露	25	0.95
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		其他	69	2.63

表37・臺北市歷年男性意外事故死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年		84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年	
		死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬
		人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
E47-E53	事故傷害合計	659	49.52	535	40.42	560	42.75	491	37.80	494	37.89	437	33.34	426	32.53	365	27.97	359	27.60
E47	運輸事故	337	25.32	278	21.00	289	22.06	261	20.09	228	17.49	152	11.60	165	12.60	146	11.19	161	12.38
E48	意外中毒	35	2.63	32	2.42	22	1.68	25	1.92	13	1.00	17	1.30	20	1.53	14	1.07	20	1.54
E49	內科醫療之意外事故， 異常反應及後期併發症	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	-	-
E50	意外墜落	102	7.66	69	5.21	83	6.34	74	5.70	83	6.37	88	6.71	101	7.71	74	5.67	70	5.38
E51	火及火焰所致之意外事 故	34	2.55	21	1.59	24	1.83	23	1.77	24	1.84	11	0.84	9	0.69	8	0.61	10	0.77
E52	其他意外事故，包括後 期影響	150	11.27	134	10.12	142	10.84	108	8.31	145	11.12	168	12.82	131	10.00	123	9.43	98	7.53
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附 註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表37・臺北市歷年男性意外事故死亡原因（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	92年		93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率			死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率
E47-E53	事故傷害合計	316	24.37	342	26.53	312	24.32	281	21.93	265	20.70	V01-X59, Y85-Y86	意外事故合計	269	21.11
E47	運輸事故	137	10.57	148	11.48	153	11.93	144	11.24	116	9.06	V01-V99	運輸意外事故	104	8.16
E48	意外中毒	19	1.47	18	1.40	20	1.56	10	0.78	16	1.25	W00-W19	跌倒(落)	66	5.18
E49	內科醫療之意外事故， 異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W65-W74	意外溺死和淹沒	21	1.65
E50	意外墜落	67	5.17	64	4.97	68	5.30	50	3.90	66	5.16	W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	13	1.02
E51	火及火焰所致之意外事 故	13	1.00	2	0.16	3	0.23	6	0.47	4	0.31	X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災 和火焰	5	0.39
E52	其他意外事故，包括後 期影響	80	6.17	110	8.53	68	5.30	71	5.54	63	4.92	X40-X49	毒害物質(所致)的意外 中毒及暴露	17	1.33
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		其他	43	3.37

表38・臺北市歷年女性意外事故死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年		84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
E47-E53	事故傷害合計	231	17.47	217	16.44	212	16.19	192	14.74	198	15.05	221	16.62	173	12.96	141	10.56	155	11.59
E47	運輸事故	117	8.85	115	8.71	102	7.79	90	6.91	107	8.13	69	5.19	60	4.50	49	3.67	88	6.58
E48	意外中毒	16	1.21	7	0.53	10	0.76	8	0.61	8	0.61	7	0.53	8	0.60	10	0.75	7	0.52
E49	內科醫療之意外事故， 異常反應及後期併發症	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	-	-	2	0.15	1	0.07	-	-	1	0.07
E50	意外墜落	34	2.57	28	2.12	29	2.21	36	2.76	32	2.43	58	4.36	43	3.22	35	2.62	16	1.20
E51	火及火焰所致之意外事 故	13	0.98	9	0.68	16	1.22	12	0.92	11	0.84	10	0.75	11	0.82	5	0.37	2	0.15
E52	其他意外事故，包括後 期影響	50	3.78	57	4.32	55	4.20	45	3.45	40	3.04	75	5.64	50	3.75	42	3.15	41	3.07
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附 註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表38・臺北市歷年女性意外事故死亡原因（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	92年		93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率			死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率
E47-E53	事故傷害合計	139	10.39	121	9.06	103	7.71	98	7.30	107	7.92	V01-X59, Y85-Y86	意外事故合計	120	8.88
E47	運輸事故	52	3.89	56	4.19	52	3.89	57	4.24	56	4.15	V01-V99	運輸意外事故	49	3.62
E48	意外中毒	7	0.52	8	0.60	4	0.30	8	0.60	8	0.59	W00-W19	跌倒(落)	25	1.85
E49	內科醫療之意外事故， 異常反應及後期併發症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W65-W74	意外溺死和淹沒	5	0.37
E50	意外墜落	36	2.69	25	1.87	31	2.32	13	0.97	21	1.55	W75-W84	對呼吸的其他意外威脅	6	0.44
E51	火及火焰所致之意外事 故	6	0.45	2	0.15	1	0.07	-	-	3	0.22	X00-X09	暴露於煙(烟)霧、火災 和火焰	1	0.07
E52	其他意外事故，包括後 期影響	38	2.84	30	2.25	15	1.12	20	1.49	19	1.41	X40-X49	毒害物質(所致)的意外 中毒及暴露	8	0.59
E53	治療用之藥品，藥物所 致之不良影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		其他	26	1.92

表39・臺北市歷年自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	83年		84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年	
		死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬	死亡	每十萬
		人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率	人數	死亡率
E54	自殺合計	173	6.52	206	7.79	224	8.55	214	8.22	201	7.67	212	8.03	237	8.96	290	10.98	325	12.32
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	29	1.09	25	0.95	30	1.15	22	0.85	26	0.99	21	0.8	17	0.64	25	0.95	27	1.02
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	2	0.08	1	0.04	1	0.04	-	-	1	0.04	1	0.04	1	0.04	2	0.08	2	0.08
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	1	0.04	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	5	0.19	7	0.26	25	0.95	82	3.11
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	95	3.58	109	4.12	125	4.77	141	5.42	89	3.40	103	3.9	134	5.07	122	4.62	116	4.40
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	7	0.26	18	0.68	9	0.34	7	0.27	14	0.53	12	0.45	15	0.57	26	0.98	21	0.80
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	3	0.11	-	-	3	0.11	1	0.04	2	0.08	-	-	-	-	2	0.08	1	0.04
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.04	3	0.11	14	0.53	6	0.23	5	0.19	9	0.34	5	0.19	7	0.27	6	0.23
E957	由高處跳下自殺及自傷	29	1.09	40	1.51	32	1.22	28	1.08	54	2.06	47	1.78	46	1.74	60	2.27	54	2.05
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	6	0.23	9	0.34	9	0.34	9	0.35	10	0.38	14	0.53	12	0.45	21	0.80	16	0.61
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表39・臺北市歷年自殺死亡方式（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 方 式	92年		93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死 亡 方 式	97年	
		死 亡	每十萬	死 亡	每十萬	死 亡	每十萬	死 亡	每十萬	死 亡	每十萬			死 亡	每十萬
		人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率			人 數	死 亡 率
E54	自殺合計	320	12.15	346	13.18	467	17.83	442	17.30	364	13.84	X60-X84 Y87.0	自殺總計	370	14.09
E950	以固體或液體物質自殺及 自為中毒	30	1.14	28	1.07	39	1.49	26	0.99	21	0.80	X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕金 森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致)的蓄 意自為中毒及暴露，他處未歸類者	5	0.19
E951	以家用瓦斯自殺及自為中 毒	2	0.08	-	-	1	0.04	-	-	-	-	X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製 劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及暴 露	1	0.04
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及 自為中毒	56	2.13	85	3.24	159	6.07	162	6.17	101	3.84	X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中毒 及暴露	124	4.72
												X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	10	0.38
E953	吊死、勒死及窒息之自殺 及自傷	113	4.29	130	4.95	142	5.42	147	5.60	126	4.79	X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所 致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.11
												X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷害	106	4.04
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	22	0.84	19	0.72	21	0.80	33	1.26	33	1.25	X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	30	1.14
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.04	1	0.04	2	0.08	X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器等 軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.04
E956	切穿工具自殺及自傷	4	0.15	3	0.11	6	0.23	5	0.19	4	0.15	X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷害	2	0.08
E957	由高處跳下自殺及自傷	78	2.96	72	2.74	74	2.83	68	2.59	70	2.66	X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	10	0.38
E958	其他及未明示之方式自殺 及自傷	15	0.57	9	0.34	24	0.92	12	0.46	7	0.27	X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	72	2.74
												X82	利用機車衝撞蓄意自我傷害	2	0.08
												X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.04
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	3	0.11

表40・臺北市歷年男性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼	死 亡 方 式	83年		84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率
E54	自殺合計	122	9.17	123	9.29	155	11.83	125	9.62	125	9.59	143	10.91	143	10.92	192	14.72	214	16.45
E950	以固體或液體物質自殺及 自為中毒	16	1.20	11	0.83	20	1.53	11	0.85	14	1.07	15	1.14	9	0.69	15	1.15	17	1.31
E951	以家用瓦斯自殺及自為中 毒	2	0.15	-	-	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08	2	0.15	2	0.15
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及 自為中毒	1	0.08	-	-	1	0.08	-	-	-	-	5	0.38	6	0.46	18	1.38	62	4.77
E953	吊死、勒死及窒息之自殺 及自傷	76	5.71	71	5.36	88	6.72	84	6.47	61	4.68	80	6.1	87	6.64	82	6.28	79	6.07
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	4	0.30	8	0.60	5	0.38	6	0.46	10	0.77	7	0.53	8	0.61	17	1.30	12	0.92
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	3	0.23	-	-	2	0.15	1	0.08	2	0.15	-	-	-	-	2	0.15	1	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.08	2	0.15	10	0.76	5	0.38	4	0.31	8	0.61	3	0.23	6	0.46	4	0.31
E957	由高處跳下自殺及自傷	13	0.98	24	1.81	21	1.60	12	0.92	27	2.07	19	1.45	24	1.83	37	2.84	27	2.08
E958	其他及未明示之方式自殺 及自傷	6	0.45	7	0.53	7	0.53	6	0.46	6	0.46	8	0.61	5	0.38	13	1.00	10	0.77
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附 註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表40・臺北市歷年男性自殺死亡方式（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死亡方式	92年		93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死亡方式	97年	
		死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率			死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率
E54	自殺合計	203	15.66	225	17.46	313	24.40	299	24.12	228	17.81	X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	231	18.13
E950	以固體或液體物質自殺及 自為中毒	17	1.31	18	1.40	21	1.64	17	1.33	13	1.02	X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜—安眠(藥)劑、抗帕 金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致) 的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	3	0.24
E951	以家用瓦斯自殺及自為中 毒	1	0.08	-	-	1	0.08	-	-	-	-	X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製 劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及 暴露	1	0.08
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及 自為中毒	43	3.32	62	4.81	119	9.28	119	9.29	74	5.78	X67	其他氣體及蒸汽(汽)(所致)的蓄意自為中 毒及暴露	81	6.36
												X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	8	0.63
E953	吊死、勒死及窒息之自殺 及自傷	76	5.86	87	6.75	104	8.11	105	8.20	78	6.09	X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所 致)的蓄意自為中毒及暴露	-	-
												X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷 害	70	5.49
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	11	0.85	12	0.93	12	0.94	13	1.01	17	1.33	X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	17	1.33
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08	X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍炮、火器 等軍火]發射蓄意自我傷害	1	0.08
E956	切穿工具自殺及自傷	3	0.23	2	0.16	5	0.39	4	0.31	2	0.16	X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷 害	2	0.16
E957	由高處跳下自殺及自傷	40	3.08	38	2.95	34	2.65	40	3.12	37	2.89	X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	8	0.63
E958	其他及未明示之方式自殺 及自傷	12	0.93	6	0.47	16	1.25	10	0.78	6	0.47	X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	35	2.75
												X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	2	0.16
												X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	1	0.08
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	2	0.16

表41・臺北市歷年女性自殺死亡方式

單位：人，人/每十萬人口

死因碼	死 亡 方 式	83年		84年		85年		86年		87年		88年		89年		90年		91年	
		死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬
		人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
E54	自殺合計	51	3.86	83	6.29	69	5.27	89	6.83	76	5.78	69	5.19	94	7.04	98	7.34	111	8.30
E950	以固體或液體物質自殺及自為中毒	13	0.98	14	1.06	10	0.76	11	0.84	12	0.91	6	0.45	8	0.60	10	0.75	10	0.75
E951	以家用瓦斯自殺及自為中毒	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	7	0.52	20	1.50
E953	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	19	1.44	38	2.88	37	2.83	57	4.37	28	2.13	23	1.73	47	3.52	40	3.00	37	2.77
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	3	0.23	10	0.76	4	0.31	1	0.08	4	0.30	5	0.38	7	0.52	9	0.67	9	0.67
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	-	-	1	0.08	4	0.31	1	0.08	1	0.08	1	0.08	2	0.15	1	0.07	2	0.15
E957	由高處跳下自殺及自傷	16	1.21	16	1.21	11	0.84	16	1.23	27	2.05	28	2.11	22	1.65	23	1.72	27	2.02
E958	其他及未明示之方式自殺及自傷	-	-	2	0.15	2	0.15	3	0.23	4	0.30	6	0.45	7	0.52	8	0.60	6	0.45
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附 註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表41・臺北市歷年女性自殺死亡方式（續）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 方 式	92年		93年		94年		95年		96年		死因碼 ICD-10	死 亡 方 式	97年	
		死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率			死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率
E54	自殺合計	117	8.75	121	9.06	154	11.52	185	10.80	136	10.07	X60-X84 ,Y87.0	自殺總計	139	10.28
E950	以固體或液體物質自殺及 自為中毒	13	0.97	10	0.75	18	1.35	9	0.67	8	0.59	X61	抗癲癇(藥)劑、鎮靜－安眠(藥)劑、抗帕 金森(氏)症候群(藥)劑及精神藥物(所致) 的蓄意自為中毒及暴露，他處未歸類者	2	0.15
E951	以家用瓦斯自殺及自為中 毒	1	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	X64	其他及未特定藥物、藥劑及生物性物質(製 劑、製品、材料)(所致)的蓄意自為中毒及 暴露	-	-
E952	由其他氣體及蒸汽自殺及 自為中毒	13	0.97	23	1.72	40	2.99	43	3.20	27	2.00	X67	其他氣體及蒸氣(汽)(所致)的蓄意自為中 毒及暴露	43	3.18
												X68	殺蟲劑(所致)的蓄意自為中毒及暴露	2	0.15
E953	吊死、勒死及窒息之自殺 及自傷	37	2.77	43	3.22	38	2.84	42	3.13	48	3.55	X69	其他及未特定化學製劑(品)及毒害物質(所 致)的蓄意自為中毒及暴露	3	0.22
												X70	利用懸吊、絞勒及閉息(悶氣)蓄意自我傷 害	36	2.66
E954	溺水(淹水)自殺及自傷	11	0.82	7	0.52	9	0.67	20	1.49	16	1.18	X71	利用溺死及淹沒蓄意自我傷害	13	0.96
E955	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07	X74	利用其他及未特定的槍械[尤指槍砲、火器 等軍火]發射蓄意自我傷害	-	-
E956	切穿工具自殺及自傷	1	0.07	1	0.07	1	0.07	1	0.07	2	0.15	X76	利用煙(烟)霧、火(災)及火焰蓄意自我傷 害	-	-
E957	由高處跳下自殺及自傷	38	2.84	34	2.55	40	2.99	28	2.08	33	2.44	X78	利用銳利(尖銳鋒利)器物蓄意自我傷害	2	0.15
E958	其他及未明示之方式自殺 及自傷	3	0.22	3	0.22	8	0.60	2	0.15	1	0.07	X80	利用從高處跳下蓄意自我傷害	37	2.74
												X82	利用機動車衝撞蓄意自我傷害	-	-
												X83	利用其他特定方式蓄意自我傷害	-	-
E959	自傷之後期影響	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X84	利用未特定的方式蓄意自我傷害	1	0.07

表42・臺北市歷年主要死因標準化死亡率
—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及 腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化死 亡率	死亡率	標準化死 亡率	死亡率	標準化死 亡率	死亡率	標準化死 亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化死 亡率
83	415.24	470.10	111.55	122.46	49.63	57.75	43.64	49.79	19.79	22.92	11.61	14.29	12.14	14.09	33.54	34.17
84	437.00	473.41	120.31	126.30	47.56	52.39	49.41	53.45	23.46	25.12	14.07	16.31	13.54	14.96	28.45	28.41
85	457.75	474.91	128.52	130.61	52.84	55.12	51.96	53.52	24.21	25.00	12.68	13.77	14.05	14.78	29.48	29.19
86	463.27	459.89	134.67	131.73	55.84	55.60	50.96	50.27	29.02	28.60	10.61	10.84	14.53	14.27	26.25	25.33
87	465.98	445.91	133.21	125.92	50.82	48.32	49.75	47.19	24.70	23.24	12.60	12.10	15.77	15.04	26.42	25.48
88	470.49	434.03	134.97	123.57	54.08	49.01	45.78	41.26	32.68	29.91	15.00	13.84	15.87	14.72	24.92	23.86
89	484.10	428.95	141.38	125.80	47.35	41.22	52.20	45.46	37.97	32.88	11.95	10.32	17.29	15.08	22.66	21.42
90	500.81	426.61	154.88	132.24	52.38	43.72	52.91	43.95	34.20	28.60	13.90	11.26	18.56	15.45	19.17	17.72
91	503.41	410.73	158.05	129.89	54.97	43.43	46.74	37.24	33.70	26.67	16.98	12.98	17.29	13.45	19.49	17.86
92	517.40	402.53	151.87	120.46	62.33	46.71	50.29	37.85	35.91	27.21	21.52	15.83	19.09	14.36	17.27	15.35
93	523.20	392.14	160.09	122.12	65.99	46.85	47.24	33.77	34.02	24.96	17.03	11.49	19.16	13.77	17.64	15.78
94	547.41	392.62	163.78	120.21	63.56	42.87	52.19	35.74	37.72	26.19	21.84	13.82	20.77	13.94	15.84	14.03
95	528.71	364.83	168.54	118.90	58.19	38.38	45.04	29.23	36.05	23.79	21.91	13.32	18.48	12.19	14.44	12.68
96	550.64	363.48	173.56	118.18	62.42	39.41	49.00	30.31	36.42	23.27	26.15	14.96	20.87	12.78	14.14	11.97
年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		敗血症		腎炎、腎微候群及 腎性病變	
	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化死 亡率	死亡率	標準化死 亡率	死亡率	標準化死 亡率	死亡率	標準化死 亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化 死亡率	死亡率	標準化死 亡率
97	575.72	366.18	170.10	112.87	76.69	46.14	45.66	27.26	36.18	20.14	27.26	16.89	19.53	11.27	18.70	11.20

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表42・臺北市歷年主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
83	6.52	6.39	13.49	14.32	2.79	3.33	9.95	11.61	5.69	6.46	1.92	2.18	4.90	5.68	2.60	3.81
84	7.79	7.56	14.38	14.81	3.63	4.04	11.05	12.14	7.19	7.76	2.88	3.05	3.03	3.20	3.75	5.51
85	8.55	8.14	14.01	13.91	5.04	5.31	12.52	13.16	6.99	7.33	3.32	3.52	4.09	4.18	3.51	4.84
86	8.22	7.65	13.41	12.87	4.96	4.93	10.99	10.90	6.99	6.88	2.42	2.46	6.92	6.88	4.07	5.46
87	7.67	7.20	14.85	13.92	4.43	4.39	10.73	10.24	7.64	7.07	2.25	2.18	4.66	4.42	2.71	3.58
88	8.03	7.12	15.30	14.31	2.65	2.45	9.47	8.60	5.91	5.32	3.07	2.73	3.75	3.34	3.11	4.40
89	8.96	7.94	14.11	12.45	3.21	2.76	7.22	6.23	5.37	4.62	4.20	3.55	4.20	3.61	3.06	4.20
90	10.98	9.70	13.83	11.89	4.39	3.57	6.33	5.24	5.64	4.72	2.84	2.28	3.37	2.80	2.54	3.64
91	12.32	10.72	11.56	9.55	4.13	3.22	6.79	5.21	4.66	3.66	2.31	1.80	3.11	2.33	2.43	3.59
92	12.15	10.29	13.93	11.22	3.53	2.56	5.39	3.98	4.37	3.21	2.43	1.79	3.72	2.74	1.56	2.41
93	13.18	10.93	12.69	9.96	3.58	2.52	6.36	4.43	4.31	2.92	2.67	1.89	2.82	2.01	1.83	3.32
94	17.83	14.79	12.33	9.20	5.73	3.78	6.18	4.14	4.16	2.79	2.94	2.06	2.29	1.62	1.49	2.66
95	17.30	14.12	12.08	8.86	5.53	3.48	6.71	4.30	3.51	2.26	3.01	1.89	2.59	1.63	1.60	2.92
96	13.84	11.27	12.58	8.92	7.15	4.07	5.36	3.17	3.69	2.23	3.04	1.87	2.17	1.32	1.82	3.51
年	慢性下呼吸道疾病		意外事故		高血壓性疾病		蓄意自我傷害(自殺)		慢性肝病及肝硬化		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		帕金森病		肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	16.98	9.27	14.81	11.94	14.24	8.21	14.09	11.40	11.27	7.69	10.70	5.87	3.54	1.88	2.89	1.59

表43・臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬男性人口

年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及 腎性病變		事故傷害	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
83	514.31	547.76	138.85	143.89	61.16	65.59	52.75	55.97	17.88	19.41	14.95	17.33	12.85	14.29	49.52	49.64
84	541.89	552.47	149.38	148.48	59.77	61.02	60.45	60.80	24.78	25.13	18.51	20.24	13.98	14.57	40.42	39.71
85	568.85	558.35	161.70	155.99	68.10	66.65	62.76	60.47	23.59	23.04	17.25	17.64	14.81	14.80	42.75	41.78
86	565.92	534.47	164.36	153.91	70.06	65.79	61.43	57.33	30.02	27.73	14.55	13.94	17.24	15.80	37.80	35.96
87	578.81	528.10	165.22	148.86	62.67	56.32	60.06	53.70	24.78	22.12	17.72	16.10	17.80	16.00	37.89	36.44
88	579.35	510.34	170.53	149.76	68.29	58.54	53.33	45.15	31.66	27.51	20.52	17.75	16.25	14.54	33.34	31.57
89	598.84	508.07	179.93	153.80	62.93	52.48	61.48	51.02	38.64	31.91	14.66	11.83	18.48	15.35	32.53	30.28
90	617.44	506.38	196.59	160.95	69.44	56.05	62.85	49.69	34.49	27.60	17.86	13.72	19.70	15.75	27.97	25.64
91	615.07	486.19	193.72	154.72	68.88	53.03	56.43	43.79	35.67	27.07	24.14	17.44	18.91	14.60	27.60	25.21
92	633.43	478.70	187.41	144.63	76.82	55.94	63.09	46.02	35.71	26.53	28.46	19.91	20.13	14.57	24.37	21.59
93	647.93	474.26	201.24	149.63	85.88	59.64	56.24	39.19	34.13	24.46	23.27	14.96	21.57	14.97	26.53	23.74
94	683.06	480.28	205.00	148.15	82.62	54.25	64.07	43.39	40.61	27.75	28.84	17.20	25.26	16.55	24.32	21.46
95	654.67	445.74	210.37	146.09	75.79	49.62	53.08	34.17	36.92	24.11	29.12	17.22	20.37	13.06	21.93	19.32
96	674.39	445.81	215.37	146.53	80.15	51.54	59.99	37.36	38.67	25.11	34.84	19.16	21.25	12.61	20.70	17.90
年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		腦血管疾病		肺炎		糖尿病		慢性下呼吸道疾病		意外事故	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	705.67	449.24	211.73	140.18	100.29	60.74	53.13	32.56	48.58	26.32	27.62	17.36	26.45	13.76	21.11	17.19

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表43・臺北市歷年男性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬男性人口

年	自殺		慢性肝病及肝硬化		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		結核病		先天性畸形	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
83	9.17	9.01	19.54	20.01	3.16	3.59	10.89	11.26	6.99	7.21	2.70	2.82	7.36	8.19	3.01	4.33
84	9.29	8.97	20.63	20.35	3.78	3.89	12.62	12.56	9.90	10.03	4.38	4.31	5.36	5.31	3.63	5.11
85	11.83	11.21	19.32	18.61	5.95	5.88	14.51	13.75	8.40	8.04	4.81	4.78	6.11	5.87	4.12	5.30
86	9.62	8.91	19.02	17.91	5.70	5.31	12.16	11.49	9.16	8.45	3.00	2.81	10.85	10.11	4.62	6.03
87	9.59	9.06	21.25	19.75	4.91	4.58	12.20	11.07	10.20	8.76	2.84	2.69	7.06	6.37	2.84	3.57
88	10.91	9.73	23.35	21.96	2.90	4.77	10.91	9.57	7.17	5.78	4.12	3.40	5.95	4.84	2.82	3.87
89	10.92	9.42	19.32	16.79	3.13	2.44	8.94	7.24	7.56	6.10	5.80	4.57	6.57	5.39	3.59	4.74
90	14.72	13.27	18.32	15.79	4.52	3.58	6.74	5.51	7.28	5.95	3.83	2.94	5.82	4.56	2.53	3.42
91	16.45	13.99	16.07	13.27	4.07	2.97	7.61	5.58	5.77	4.35	2.69	2.07	5.15	3.60	2.61	3.72
92	15.66	13.42	19.20	15.43	4.70	3.22	5.40	4.00	5.24	3.69	3.24	2.24	5.78	4.09	1.77	2.62
93	17.46	14.81	17.22	13.87	4.19	2.83	6.36	4.29	5.66	3.64	3.34	2.25	4.58	3.14	1.94	3.25
94	24.40	20.52	14.97	11.51	5.69	3.62	8.26	5.49	5.53	3.57	4.05	2.78	3.90	2.70	1.33	2.20
95	24.12	20.00	16.39	12.38	5.70	3.34	7.34	4.78	4.53	2.83	3.36	2.06	4.14	2.46	1.25	2.40
96	17.81	14.72	17.34	12.80	6.41	3.70	5.39	3.04	4.77	2.83	3.75	2.30	3.12	1.84	1.80	3.55
年	敗血症		腎炎、腎徵候群及腎性病變		蓄意自我傷害(自殺)		高血壓性疾病		慢性肝病及肝硬化		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		結核病		帕金森病	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	20.64	11.78	18.83	11.24	18.13	15.00	16.01	9.43	15.46	10.94	10.36	5.63	4.39	2.49	4.39	2.24

表44・臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬女性人口

年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病		腦血管疾病		糖尿病		、腎微候群及腎性		肺炎		自殺	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
83	315.54	383.30	84.08	97.18	38.03	48.01	34.48	42.83	21.70	27.16	11.42	14.07	8.24	10.77	3.86	3.65
84	331.81	385.49	91.16	101.11	35.31	42.12	38.34	45.36	22.13	25.80	13.11	15.50	9.62	11.80	6.29	6.04
85	346.60	384.85	95.32	102.11	37.58	42.33	41.17	46.07	24.82	27.76	13.29	14.93	8.10	9.40	5.27	5.03
86	360.94	381.88	105.07	108.40	41.67	44.63	40.52	43.01	28.01	29.90	11.82	12.55	6.68	7.30	6.83	6.47
87	354.16	359.17	101.48	100.73	39.07	39.75	39.53	40.17	24.63	25.10	13.76	13.97	7.53	7.74	5.78	5.41
88	363.23	354.77	99.92	95.83	40.07	38.68	38.35	37.28	33.68	32.98	15.49	15.09	9.55	9.41	5.19	4.62
89	371.52	347.71	103.56	96.02	32.07	29.71	43.09	39.97	37.32	34.73	16.11	14.98	9.29	8.60	7.04	6.37
90	386.85	346.12	114.12	101.60	35.72	31.32	43.21	38.11	33.92	30.31	17.45	15.28	10.03	8.53	7.34	6.33
91	394.76	336.33	123.33	105.00	41.44	34.13	37.32	30.92	31.79	26.66	15.71	13.06	10.02	8.19	8.30	7.14
92	404.96	328.28	117.42	96.19	48.28	37.79	37.90	29.85	36.10	28.60	18.09	14.30	14.80	11.55	8.75	7.39
93	402.84	312.67	120.38	94.63	46.79	34.35	38.55	28.72	33.91	26.02	16.84	12.63	11.00	7.84	9.06	8.26
94	417.20	309.11	124.20	93.11	45.27	31.66	40.78	28.68	34.94	25.11	16.46	11.53	15.11	10.25	11.52	9.63
95	408.57	288.49	128.65	92.46	41.39	27.76	37.37	24.78	35.21	23.87	16.68	11.39	15.04	9.47	10.80	8.87
96	433.35	288.22	133.94	91.74	45.61	28.56	38.57	24.01	34.28	22.06	20.51	13.06	17.92	10.74	10.07	8.15
年	所有死亡原因		惡性腫瘤		心臟疾病(高血壓性 疾病除外)		腦血管疾病		糖尿病		肺炎		腎炎、腎微候群及 腎性病變		敗血症	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	453.23	291.00	130.86	87.54	54.44	32.75	38.61	22.90	26.93	16.79	24.49	14.14	18.57	11.35	18.49	10.99

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表44・臺北市歷年女性主要死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬女性人口

年	慢性肝病及肝硬化		事故傷害		敗血症		高血壓性疾病		支氣管炎、肺氣腫及氣喘		胃及十二指腸之潰瘍		先天性畸形		貧血	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
83	7.41	8.85	17.47	18.86	2.42	3.10	9.00	11.51	4.39	5.41	1.13	1.39	2.19	3.23	0.60	0.77
84	8.11	9.33	16.44	17.14	3.49	4.19	9.47	11.43	4.47	5.14	1.36	1.60	3.86	5.94	0.76	0.82
85	8.71	9.53	16.19	16.85	4.12	4.65	10.54	12.06	5.58	6.32	1.83	2.11	2.90	4.36	0.46	0.50
86	7.83	8.20	14.74	14.94	4.22	4.57	9.82	10.47	4.84	5.11	1.84	2.02	3.53	4.85	0.69	0.79
87	8.51	8.65	15.05	14.87	3.95	4.06	9.27	9.49	5.09	5.10	1.67	1.71	2.58	3.61	0.53	0.56
88	7.37	7.15	16.62	16.43	2.41	2.42	8.05	7.76	4.66	4.58	2.03	1.95	3.38	4.95	0.45	0.45
89	8.99	8.51	12.96	12.93	3.30	3.02	5.55	5.14	3.22	2.95	2.62	2.40	2.55	3.64	1.27	1.13
90	9.44	8.56	10.56	10.05	4.27	3.70	5.92	5.13	4.04	3.49	1.87	1.60	2.55	3.86	0.97	0.86
91	7.18	6.18	11.59	11.02	4.19	3.46	5.98	4.82	3.59	2.95	1.94	1.56	2.24	3.45	0.67	0.58
92	8.82	7.44	10.39	9.44	2.39	1.84	5.38	4.13	3.51	2.70	1.64	1.31	1.35	2.20	1.05	0.84
93	8.31	6.60	9.06	7.40	2.99	2.15	6.36	4.65	2.99	2.20	2.02	1.51	1.72	3.40	1.27	0.99
94	9.80	7.32	7.71	7.05	5.76	4.00	4.19	2.87	2.84	1.97	1.87	1.36	1.65	3.15	0.97	0.76
95	7.97	5.79	7.30	6.30	5.36	3.59	6.10	3.95	2.53	1.69	2.68	1.74	1.94	3.45	1.56	1.06
96	8.07	5.54	7.92	6.42	7.85	4.59	5.33	3.29	2.67	1.66	2.37	1.45	1.85	3.44	1.48	0.96
年	高血壓性疾病		骨骼肌肉系統及結締組織之疾病		蓄意自我傷害(自殺)		意外事故		慢性下呼吸道疾病		慢性肝病及肝硬化		血管性及未明示之癱瘓症		肇因於吸入外物之肺部病況(塵肺症及肺炎除外)	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率		標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	12.58	7.27	11.02	6.25	10.28	8.19	8.88	6.98	8.06	4.57	7.32	4.87	2.81	1.48	2.81	1.57

表45・臺北市歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		2,960	111.55		3,180	120.31		3,366	128.52		3,504	134.67		3,489	133.21		3,564	134.97	
162	肺癌	1	619	23.33	1	615	23.27	1	645	24.63	1	718	27.59	1	729	27.83	1	750	28.40	
155	肝癌	2	469	17.68	2	570	21.56	2	581	22.18	2	606	23.29	2	588	22.45	2	564	21.36	
153 154	結腸直腸癌	3	309	11.65	3	329	12.45	3	386	14.74	3	366	14.07	3	398	15.20	3	417	15.79	
174	女性乳癌(1)	5	134	10.13	5	135	10.23	5	153	11.69	4	182	13.97	5	164	12.47	4	162	12.18	
151	胃癌	4	294	11.08	4	328	12.41	4	356	13.59	5	346	13.30	4	327	12.48	5	317	12.00	
185	攝護腺癌(2)	7	62	4.66	7	51	3.85	7	68	5.19	8	65	5.00	8	66	5.06	7	91	6.94	
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	8	93	3.50	10	92	3.48	8	133	5.08	7	133	5.11	7	136	5.19	8	143	5.42	
157	胰臟癌	12	79	2.98	9	97	3.67	9	111	4.24	10	109	4.19	9	112	4.28	9	122	4.62	
179 180	子宮頸癌(1)	6	103	7.79	6	108	8.18	6	102	7.79	6	128	9.82	6	102	7.75	6	113	8.50	
156	膽囊癌	10	81	3.05	15	64	2.42	14	81	3.09	16	71	2.73	11	93	3.55	12	94	3.56	
183	卵巢癌(1)	16	29	2.19	11	44	3.33	12	44	3.36	15	36	2.76	14	42	3.19	13	41	3.08	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	77	2.90	13	78	2.95	13	88	3.36	9	113	4.34	15	79	3.02	10	98	3.71	
150	食道癌	10	81	3.05	14	75	2.84	14	81	3.09	11	102	3.92	12	88	3.36	11	97	3.67	
204-208	白血病	14	78	2.94	8	100	3.78	11	89	3.40	12	94	3.61	10	99	3.78	14	76	2.88	
188	膀胱癌	17	50	1.88	17	57	2.16	17	55	2.10	17	56	2.15	16	66	2.52	16	66	2.50	
	其他		402	15.15		437	16.53		393	15.01		379	14.57		400	15.27		413	15.64	
註：	年中人口數		2,653,412			2,643,220			2,619,118			2,601,934			2,619,216			2,640,626		

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表45・臺北市歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		3,738	141.38		4,089	154.88		4,169	158.05		4,001	151.87		4,202	160.09		4,290	163.78
162	肺癌	1	751	28.41	1	883	33.45	1	889	33.70	1	847	32.15	1	880	33.53	1	870	33.21
155	肝癌	2	562	21.26	2	671	25.42	2	661	25.06	2	664	25.20	2	677	25.79	2	607	23.17
153 154	結腸直腸癌	3	462	17.47	3	444	16.82	3	490	18.58	3	436	16.55	3	518	19.73	3	542	20.69
174	女性乳癌(1)	4	169	12.66	4	199	14.90	4	192	14.36	4	208	15.55	4	203	15.20	4	224	16.76
151	胃癌	5	328	12.41	5	349	13.22	5	374	14.18	5	294	11.16	5	311	11.85	5	354	13.51
185	攝護腺癌(2)	7	93	7.10	6	120	9.20	6	106	8.15	6	107	8.25	6	122	9.46	6	133	10.37
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	9	136	5.14	8	130	4.92	8	172	6.52	8	166	6.30	9	148	5.64	7	181	6.91
157	胰臟癌	8	138	5.22	9	124	4.70	9	157	5.95	9	146	5.54	8	164	6.25	9	168	6.41
179 180	子宮頸癌(1)	6	97	7.27	7	110	8.24	7	105	7.85	7	85	6.35	7	87	6.51	8	86	6.43
156	膽囊癌	12	104	3.93	12	106	4.01	11	119	4.51	13	101	3.83	11	125	4.76	12	120	4.58
183	卵巢癌(1)	14	42	3.15	11	56	4.19	12	53	3.96	14	49	3.66	12	58	4.34	14	50	3.74
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	113	4.27	10	113	4.28	14	92	3.49	10	125	4.74	10	138	5.26	10	146	5.57
150	食道癌	11	108	4.08	13	103	3.90	10	123	4.66	12	104	3.95	14	106	4.04	11	126	4.81
204-208	白血病	13	99	3.74	14	97	3.67	13	94	3.56	11	109	4.14	13	108	4.11	13	100	3.82
188	膀胱癌	15	83	3.14	16	76	2.88	17	60	2.27	16	56	2.13	15	92	3.51	16	66	2.52
	其他		453	17.13		508	19.24		482	18.27		504	19.13		465	17.72		517	19.74

註： 年中人口數 2,643,893 2,640,138 2,637,829 2,634,497 2,624,805 2,619,424

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表45・臺北市歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		4,423	168.54		4,566	173.56	C00-C97	所有癌症死亡原因		4,467	170.10
162	肺癌	1	910	34.68	1	987	37.52	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	928	35.34
155	肝癌	2	702	26.75	2	666	25.32	C22	肝和肝內膽管癌	2	701	26.69
153 154	結腸直腸癌	3	532	20.27	3	557	21.17	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	567	21.59
174	女性乳癌(1)	4	209	15.56	4	203	15.03	C50	女性乳房癌(1)	4	228	16.87
151	胃癌	5	363	13.83	5	329	12.51	C16	胃癌	5	312	11.88
185	攝護腺癌(2)	6	129	10.07	6	136	10.62	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	124	9.73
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	8	175	6.67	7	217	8.25	C25	胰臟癌	7	192	7.31
157	胰臟癌	7	178	6.78	8	178	6.77	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	75	5.55
179 180	子宮頸癌(1)	10	81	6.03	9	89	6.59	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	9	131	4.99
156	膽囊癌	12	116	4.42	10	149	5.66	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	131	4.99
183	卵巢癌(1)	11	73	5.43	11	74	5.48	C91-C95	白血病	11	121	4.61
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	9	166	6.33	12	134	5.09	C15	食道癌	12	120	4.57
150	食道癌	14	97	3.70	13	126	4.79	C56	卵巢癌(1)	13	58	4.29
204-208	白血病	13	98	3.73	14	107	4.07	C11	鼻咽癌	14	84	3.20
188	膀胱癌	16	82	3.12	15	91	3.46	C67	膀胱癌	15	80	3.05
	其他		512	19.51		523	19.88		其他		615	23.42

註： 年中人口數 2,624,309 2,630,756 2,626,096

附註：(1)每十萬女性人口死亡率。(2)每十萬男性人口死亡率。

表46・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男性人口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		1,848	138.85		1,977	149.38		2,118	161.70		2,135	164.36		2,154	165.22		2,235	170.53
162	肺癌	1	407	30.58	2	414	31.28	1	448	34.20	1	471	36.26	1	482	36.97	1	542	41.35
155	肝癌	2	359	26.97	1	436	32.94	2	445	33.97	2	458	35.26	2	460	35.28	2	430	32.81
153 154	結腸直腸癌	4	177	13.30	4	191	14.43	4	236	18.02	4	226	17.40	4	220	16.87	3	240	18.31
151	胃癌	3	199	14.95	3	212	16.02	3	255	19.47	3	228	17.55	3	228	17.49	4	203	15.49
185	攝護腺癌	8	62	4.66	11	51	3.85	8	68	5.19	8	65	5.00	9	66	5.06	5	91	6.94
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	7	63	4.73	6	66	4.99	5	80	6.11	7	79	6.08	6	74	5.68	6	86	6.56
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	6	69	5.18	5	73	5.52	6	77	5.88	5	101	7.78	6	74	5.68	7	82	6.26
150	食道癌	5	76	5.71	8	64	4.84	7	69	5.27	6	90	6.93	5	79	6.06	7	82	6.26
157	胰臟癌	10	50	3.76	9	63	4.76	10	63	4.81	10	58	4.47	8	72	5.52	9	73	5.57
156	膽囊癌	12	48	3.61	16	27	2.04	12	40	3.05	14	34	2.62	12	56	4.30	11	52	3.97
204-208	白血病	13	45	3.38	7	65	4.91	11	55	4.20	11	53	4.08	10	64	4.91	12	49	3.74
188	膀胱癌	14	38	2.86	12	42	3.17	12	40	3.05	12	41	3.16	13	51	3.91	13	48	3.66
147	鼻咽癌	9	61	4.58	9	63	4.76	9	67	5.12	9	64	4.93	11	57	4.37	10	54	4.12
191	腦癌	10	50	3.76	14	29	2.19	14	37	2.82	12	41	3.16	15	33	2.53	15	27	2.06
161	喉癌	16	21	1.58	15	28	2.12	16	17	1.30	17	12	0.92	16	21	1.61	16	25	1.91
	其他		123	9.24		153	11.56		121	9.24		114	8.78		117	8.97		151	11.52
註： 年中人口數		1,330,909			1,323,509			1,309,828			1,298,943			1,303,713			1,310,612		

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表46・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		2,356	179.93		2,565	196.59		2,520	193.72		2,430	187.41		2,594	201.24		2,630	205.00
162	肺癌	1	514	39.26	1	619	47.44	1	588	45.20	1	572	44.12	1	599	46.47	1	562	43.81
155	肝癌	2	432	32.99	2	491	37.63	2	492	37.82	2	477	36.79	2	495	38.40	2	445	34.69
153 154	結腸直腸癌	3	264	20.16	3	261	20.00	3	285	21.91	3	246	18.97	3	306	23.74	3	306	23.85
151	胃癌	4	218	16.65	4	244	18.70	4	231	17.76	4	185	14.27	4	198	15.36	4	236	18.40
185	攝護腺癌	7	93	7.10	5	120	9.20	6	106	8.15	6	107	8.25	5	122	9.46	5	133	10.37
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	8	91	6.95	8	90	6.90	7	97	7.46	8	92	7.10	7	91	7.06	8	115	8.96
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	6	94	7.18	6	96	7.36	9	82	6.30	5	111	8.56	5	122	9.46	6	133	10.37
150	食道癌	5	100	7.64	7	92	7.05	5	116	8.92	7	96	7.40	7	91	7.06	7	116	9.04
157	胰臟癌	9	84	6.42	9	71	5.44	8	96	7.38	9	86	6.63	9	89	6.90	9	103	8.03
156	膽囊癌	11	55	4.20	13	52	3.99	10	61	4.69	12	52	4.01	11	65	5.04	10	70	5.46
204-208	白血病	10	68	5.19	10	62	4.75	12	48	3.69	10	66	5.09	10	68	5.28	11	59	4.60
188	膀胱癌	12	54	4.12	11	61	4.68	13	46	3.54	13	41	3.16	12	62	4.81	13	45	3.51
147	鼻咽癌	13	51	3.89	11	61	4.68	11	52	4.00	11	54	4.16	13	55	4.27	12	59	4.60
191	腦癌	15	26	1.99	16	28	2.15	15	28	2.15	16	21	1.62	15	26	2.02	14	32	2.49
161	喉癌	16	24	1.83	15	36	2.76	16	17	1.31	14	33	2.55	16	18	1.40	15	20	1.56
	其他		188	14.36		181	13.87		175	13.45		191	14.73		187	14.51		196	15.28
註：	年中人口數			1,309,371			1,304,744			1,300,818			1,296,600			1,289,022			1,282,908

表46・臺北市歷年男性主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬男性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		2,695	210.37		2,757	215.37	C00-C97	所有癌症死亡原因		2,698	211.73
162	肺癌	1	608	47.46	1	635	49.60	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	593	46.54
155	肝癌	2	518	40.43	2	488	38.12	C22	肝和肝內膽管癌	2	488	38.30
153 154	結腸直腸癌	3	316	24.67	3	308	24.06	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	333	26.13
151	胃癌	4	240	18.73	4	214	16.72	C16	胃癌	4	218	17.11
185	攝護腺癌	6	129	10.07	5	136	10.62	C61	前列腺(攝護腺)癌	5	124	9.73
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	7	112	8.74	6	129	10.08	C00-C06, C09- C10, C12-C14	口腔癌	6	115	9.02
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	5	147	11.47	7	117	9.14	C25	胰臟癌	7	114	8.95
150	食道癌	9	87	6.79	8	107	8.36	C15	食道癌	8	107	8.40
157	胰臟癌	8	96	7.49	9	91	7.11	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	76	5.96
156	膽囊癌	11	60	4.68	10	89	6.95	C91-C95	白血病	10	76	5.96
204-208	白血病	12	54	4.22	11	68	5.31	C11	鼻咽癌	11	61	4.79
188	膀胱癌	13	50	3.90	12	65	5.08	C67	膀胱癌	12	57	4.47
147	鼻咽癌	10	65	5.07	13	63	4.92	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	31	2.43
191	腦癌	14	33	2.58	14	26	2.03	C64-C65	腎臟癌	14	28	2.20
161	喉癌	16	20	1.56	15	19	1.48	C71	腦癌	15	26	2.04
	其他		160	12.49		202	15.78		其他		251	19.70
註：	年中人口數		1,281,102			1,280,124					1,274,252	

表47・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		1,112	84.08		1,203	91.16		1,248	95.32		1,369	105.07		1,335	101.48		1,329	99.92
162	肺癌	1	212	16.03	1	201	15.23	1	197	15.05	1	247	18.96	1	247	18.78	1	208	15.64
153 154	結腸直腸癌	3	132	9.98	2	138	10.46	3	150	11.46	4	140	10.74	2	178	13.53	2	177	13.31
174	女性乳癌	2	134	10.13	3	135	10.23	2	153	11.69	2	182	13.97	3	164	12.47	3	162	12.18
155	肝癌	4	110	8.32	4	134	10.15	4	136	10.39	3	148	11.36	4	128	9.73	4	134	10.08
151	胃癌	6	95	7.18	5	116	8.79	6	101	7.71	6	118	9.06	6	99	7.53	5	114	8.57
179 180	子宮頸癌	5	103	7.79	6	108	8.18	5	102	7.79	5	128	9.82	5	102	7.75	6	113	8.50
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	10	30	2.27	11	26	1.97	7	53	4.05	7	54	4.14	7	62	4.71	7	57	4.29
157	胰臟癌	11	29	2.19	10	34	2.58	8	48	3.67	8	51	3.91	9	40	3.04	8	49	3.68
183	卵巢癌	11	29	2.19	7	44	3.33	9	44	3.36	11	36	2.76	8	42	3.19	10	41	3.08
156	膽囊癌	8	33	2.50	8	37	2.80	10	41	3.13	10	37	2.84	10	37	2.81	9	42	3.16
204-208	白血病	8	33	2.50	9	35	2.65	11	34	2.60	9	41	3.15	11	35	2.66	11	27	2.03
182	子宮體癌	24	2	0.15	19	8	0.61	18	7	0.53	-	-	-	25	1	0.08	12	20	1.50
188	膀胱癌	15	12	0.91	15	15	1.14	15	15	1.15	15	15	1.15	15	15	1.14	13	18	1.35
191	腦癌	7	43	3.25	12	23	1.74	12	23	1.76	12	31	2.38	12	27	2.05	17	12	0.90
150	食道癌	19	5	0.38	16	11	0.83	16	12	0.92	16	12	0.92	18	9	0.68	16	15	1.13
	其他		110	8.32		138	10.46		132	10.08		129	9.90		149	11.33		140	10.53
註： 年中人口數		1,322,502			1,319,712			1,309,291			1,302,990			1,315,503			1,330,014		

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表47・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率		死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		1,382	103.56		1,524	114.12		1,649	123.33		1,571	117.42		1,608	120.38		1,660	124.20	
162	肺癌	1	237	17.76	1	264	19.77	1	301	22.51	1	275	20.55	1	281	21.04	1	308	23.05	
153 154	結腸直腸癌	2	198	14.84	3	183	13.70	2	205	15.33	3	190	14.20	2	212	15.87	2	236	17.66	
174	女性乳癌	3	169	12.66	2	199	14.90	3	192	14.36	2	208	15.55	3	203	15.20	3	224	16.76	
155	肝癌	4	130	9.74	4	180	13.48	4	169	12.64	4	187	13.98	4	182	13.62	4	162	12.12	
151	胃癌	5	110	8.24	6	105	7.86	5	143	10.70	5	109	8.15	5	113	8.46	5	118	8.83	
179 180	子宮頸癌	6	97	7.27	5	110	8.24	6	105	7.85	6	85	6.35	6	87	6.51	6	86	6.43	
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	9	45	3.37	10	40	3.00	7	75	5.61	7	74	5.53	10	57	4.27	7	66	4.94	
157	胰臟癌	7	54	4.05	9	53	3.97	8	61	4.56	8	60	4.48	7	75	5.61	8	65	4.86	
183	卵巢癌	10	42	3.15	7	56	4.19	10	53	3.96	9	49	3.66	9	58	4.34	10	50	3.74	
156	膽囊癌	8	49	3.67	8	54	4.04	9	58	4.34	9	49	3.66	8	60	4.49	9	50	3.74	
204-208	白血病	11	31	2.32	11	35	2.62	11	46	3.44	11	43	3.21	11	40	2.99	11	41	3.07	
182	子宮體癌	15	17	1.27	16	16	1.20	13	23	1.72	15	16	1.20	14	22	1.65	13	22	1.65	
188	膀胱癌	12	29	2.17	17	15	1.12	16	14	1.05	16	15	1.12	12	30	2.25	14	21	1.57	
191	腦癌	16	15	1.12	14	22	1.65	15	18	1.35	12	23	1.72	13	24	1.80	12	25	1.87	
150	食道癌	18	8	0.60	18	11	0.82	21	7	0.52	21	8	0.60	18	15	1.12	18	10	0.75	
	其他		151	11.31		181	13.55		179	13.39		180	13.45		149	11.15		176	13.17	
註：	年中人口數		1,334,522			1,335,394			1,337,010			1,337,897			1,335,782			1,336,516		

表47・臺北市歷年女性主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬女性人口

死因碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			死因碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 女性人口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		1,728	128.65		1,809	133.94	C00-C97	所有癌症死亡原因		1,769	130.86
162	肺癌	1	302	22.48	1	352	26.06	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	335	24.78
153 154	結腸直腸癌	2	216	16.08	2	249	18.44	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	234	17.31
174	女性乳癌	3	209	15.56	3	203	15.03	C50	女性乳房癌	3	228	16.87
155	肝癌	4	184	13.70	4	178	13.18	C22	肝和肝內膽管癌	4	213	15.76
151	胃癌	5	123	9.16	5	115	8.51	C16	胃癌	5	94	6.95
179 180	子宮頸癌	7	81	6.03	6	89	6.59	C25	胰臟癌	6	78	5.77
200,202,203	非何杰金淋巴瘤	9	63	4.69	7	88	6.52	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	75	5.55
157	胰臟癌	6	82	6.10	8	87	6.44	C56	卵巢癌	8	58	4.29
183	卵巢癌	8	73	5.43	9	74	5.48	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	55	4.07
156	膽囊癌	10	56	4.17	10	60	4.44	C91-C95	白血病	10	45	3.33
204-208	白血病	11	44	3.28	11	39	2.89	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	11	35	2.59
182	子宮體癌	13	25	1.86	12	26	1.93	C54	子宮體癌	12	28	2.07
188	膀胱癌	15	32	2.38	13	26	1.93	C45-C49	間皮和軟組織癌	13	26	1.92
191	腦癌	16	22	1.64	14	20	1.48	C64-C65	腎臟癌	14	26	1.92
150	食道癌	19	10	0.74	15	19	1.41	C11	鼻咽癌	15	23	1.70
	其他		206	15.34		184	13.62		其他		216	15.98
註：	年中人口數		1,343,207			1,350,632					1,351,844	

表48・臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		女性乳癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
83	111.55	122.46	23.33	25.64	17.68	19.07	11.65	12.98	10.13	11.09	11.08	12.33	4.66	5.14	3.50	3.71
84	120.31	126.30	23.27	24.58	21.56	22.67	12.45	13.21	10.23	10.58	12.41	12.94	3.85	3.72	3.48	3.72
85	128.52	130.61	24.63	25.11	22.18	22.54	14.74	15.13	11.69	11.54	13.59	13.65	5.19	4.70	5.08	5.21
86	134.67	131.73	27.59	26.66	23.29	22.95	14.07	13.85	13.97	13.25	13.30	12.96	5.00	4.66	5.11	5.10
87	133.21	125.92	27.83	25.93	22.45	21.54	15.20	14.56	12.47	11.87	12.48	11.57	5.06	4.30	5.19	5.01
88	134.97	123.57	28.40	25.63	21.36	19.93	15.79	14.44	12.18	11.19	12.00	10.83	6.94	5.68	5.42	4.86
89	141.38	125.80	28.41	24.95	21.26	19.43	17.47	15.37	12.66	11.48	12.41	10.71	7.10	5.68	5.14	4.61
90	154.88	132.24	33.45	28.02	25.42	22.35	16.82	14.23	14.90	12.94	13.22	11.07	9.20	6.83	4.92	4.15
91	158.05	129.89	33.70	27.17	25.06	21.27	18.58	15.06	14.36	12.05	14.18	11.21	8.15	5.70	6.52	5.31
92	151.87	120.46	32.15	25.14	25.20	20.37	16.55	12.76	15.55	12.66	11.16	8.52	8.25	5.53	6.30	5.13
93	160.09	122.12	33.53	25.03	25.79	20.05	19.73	14.86	15.20	11.80	11.85	8.66	9.46	5.88	5.64	4.32
94	163.78	120.21	33.21	23.58	23.17	17.60	20.69	14.85	16.76	12.67	13.51	9.41	10.37	6.14	6.91	5.12
95	168.54	118.90	34.68	23.70	26.75	19.75	20.27	14.03	15.56	11.37	13.83	9.15	10.07	5.68	6.67	4.78
96	173.56	118.18	37.52	24.65	25.32	18.14	21.17	14.02	15.03	10.59	12.51	8.11	10.62	5.89	8.25	5.68
年	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		女性乳房癌		胃癌		前列腺(攝護腺)癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	170.10	112.87	35.34	22.90	26.69	18.47	21.59	13.90	16.87	11.66	11.88	7.51	9.73	5.35	7.31	4.85

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表48・臺北市歷年主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬人口

年	胰臟癌		子宮頸癌		膽囊癌		卵巢癌		口腔癌		食道癌		白血病		膀胱癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
83	2.98	3.15	7.79	8.86	3.05	3.43	2.19	2.51	2.90	3.12	3.05	3.39	2.94	3.15	1.88	2.18
84	3.67	3.83	8.18	9.11	2.42	2.52	3.33	3.42	2.95	3.10	2.84	3.00	3.78	3.99	2.16	2.37
85	4.24	4.31	7.79	8.16	3.09	3.24	3.36	3.51	3.36	3.49	3.09	3.20	3.40	3.51	2.10	2.13
86	4.19	4.01	9.82	10.16	2.73	2.76	2.76	2.82	4.34	4.20	3.92	3.80	3.61	3.61	2.15	2.12
87	4.28	4.00	7.75	7.32	3.55	3.45	3.19	3.00	3.02	2.76	3.36	3.16	3.78	3.66	2.52	2.37
88	4.62	4.19	8.50	7.95	3.56	3.28	3.08	2.90	3.71	3.51	3.67	3.49	2.88	2.79	2.50	2.25
89	5.22	4.57	7.27	6.51	3.93	3.55	3.15	2.85	4.27	3.84	4.08	3.62	3.74	3.48	3.14	2.78
90	4.70	3.91	8.24	7.39	4.01	3.40	4.19	3.62	4.28	3.71	3.90	3.42	3.67	3.19	2.88	2.28
91	5.95	4.89	7.85	6.60	4.51	3.72	3.96	3.31	3.49	3.00	4.66	3.88	3.56	3.15	2.27	1.80
92	5.54	4.31	6.35	5.09	3.83	2.96	3.66	3.05	4.74	3.93	3.95	3.16	4.14	3.70	2.13	1.58
93	6.25	4.84	6.51	4.90	4.76	3.56	4.34	3.38	5.26	4.26	4.04	3.19	4.11	3.43	3.51	2.44
94	6.41	4.61	6.43	4.89	4.58	3.44	3.74	2.76	5.57	4.30	4.81	3.76	3.82	3.07	2.52	1.74
95	6.78	4.75	6.03	4.26	4.42	3.04	5.43	3.91	6.33	4.81	3.70	2.66	3.73	2.77	3.12	1.97
96	6.77	4.54	6.59	4.39	5.66	3.84	5.48	3.91	5.09	3.77	4.79	3.32	4.07	3.05	3.46	2.09
年	子宮頸及部位未明示子宮癌		口腔癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		食道癌		卵巢癌		鼻咽癌		膀胱癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	5.55	3.62	4.99	3.43	4.99	3.18	4.61	3.42	4.57	3.16	4.29	2.96	3.20	2.35	3.05	1.83

表49・臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬男性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		非何杰金淋巴瘤		口腔癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
83	138.85	143.89	30.58	31.11	26.97	27.67	13.30	13.85	14.95	15.73	4.66	5.14	4.73	4.79	5.18	5.38
84	149.38	148.48	31.28	30.89	32.94	33.34	14.43	14.42	16.02	15.72	3.85	3.72	4.99	5.08	5.52	5.79
85	161.70	155.99	34.20	32.85	33.97	33.64	18.02	17.08	19.47	18.18	5.19	4.70	6.11	5.84	5.88	6.16
86	164.36	153.91	36.26	32.50	35.26	33.96	17.40	16.38	17.55	16.28	5.00	4.66	6.08	5.66	7.78	7.49
87	165.22	148.86	36.97	31.79	35.28	32.90	16.87	15.20	17.49	15.13	5.06	4.30	5.68	5.32	5.68	5.23
88	170.53	149.76	41.35	35.19	32.81	29.90	18.31	15.99	15.49	13.17	6.94	5.68	6.56	5.54	6.26	6.04
89	179.93	153.80	39.26	32.31	32.99	29.86	20.16	16.82	16.65	13.60	7.10	5.68	6.95	5.93	7.18	6.62
90	196.59	160.95	47.44	37.48	37.63	32.68	20.00	16.23	18.70	14.79	9.20	6.83	6.90	5.62	7.36	6.51
91	193.72	154.72	45.20	34.72	37.82	32.06	21.91	17.15	17.76	13.19	8.15	5.70	7.46	5.76	6.30	5.62
92	187.41	144.63	44.12	33.18	36.79	29.57	18.97	14.09	14.27	10.49	8.25	5.53	7.10	5.52	8.56	7.37
93	201.24	149.63	46.47	33.20	38.40	30.08	23.74	17.23	15.36	10.60	9.46	5.88	7.06	5.28	9.46	7.95
94	205.00	148.15	43.81	30.08	34.69	26.89	23.85	16.86	18.40	12.46	10.37	6.14	8.96	6.51	10.37	8.18
95	210.37	146.09	47.46	31.25	40.43	30.73	24.67	17.02	18.73	11.98	10.07	5.68	8.74	6.09	11.47	9.00
96	215.37	146.53	49.60	31.94	38.12	28.37	24.06	16.02	16.72	10.74	10.62	5.89	10.08	6.76	9.14	7.00
年	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		肝和肝內膽管癌		結腸、直腸和肛門癌		胃癌		前列腺(攝護腺)癌		口腔癌		胰臟癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	211.73	140.18	46.54	29.96	38.30	27.11	26.13	16.86	17.11	10.69	9.73	5.35	9.02	6.44	8.95	6.11

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表49・臺北市歷年男性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬男性人口

年	食道癌		胰臟癌		膽囊癌		白血病		膀胱癌		鼻咽癌		腦癌		喉癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
83	5.71	5.99	3.76	3.86	3.61	3.92	3.38	3.41	2.86	3.06	4.58	4.79	3.76	3.86	1.58	1.69
84	4.84	4.72	4.76	4.70	2.04	1.98	4.91	5.00	3.17	3.08	4.76	4.48	2.19	2.11	2.12	2.22
85	5.27	5.11	4.81	4.51	3.05	3.09	4.20	4.09	3.05	2.94	5.12	4.97	2.82	2.58	1.30	1.19
86	6.93	6.52	4.47	3.94	2.62	2.49	4.08	3.97	3.16	2.95	4.93	4.81	3.16	3.31	0.92	0.86
87	6.06	5.53	5.52	4.87	4.30	4.04	4.91	4.67	3.91	3.40	4.37	4.25	2.53	2.44	1.61	1.43
88	6.26	5.88	5.57	4.66	3.97	3.50	3.74	3.61	3.66	3.12	4.12	3.78	2.06	1.89	1.91	1.78
89	7.64	6.64	6.42	5.28	4.20	3.54	5.19	4.62	4.12	3.52	3.89	3.66	1.99	1.82	1.83	1.60
90	7.05	6.06	5.44	4.27	3.99	3.21	4.75	4.16	4.68	4.03	4.68	3.42	2.15	1.80	2.76	2.35
91	8.92	7.40	7.38	6.10	4.69	3.73	3.69	3.21	3.54	2.61	4.00	3.50	2.15	1.84	1.31	1.05
92	7.40	5.96	6.63	5.08	4.01	2.99	5.09	4.35	3.16	2.26	4.16	3.52	1.62	1.34	2.55	2.01
93	7.06	5.68	6.90	5.20	5.04	3.74	5.28	4.16	4.81	3.12	4.27	3.39	2.02	1.75	1.40	1.00
94	9.04	7.40	8.03	5.72	5.46	4.02	4.60	3.50	3.51	2.20	4.60	3.67	2.49	2.11	1.56	1.04
95	6.79	4.87	7.49	5.21	4.68	3.22	4.22	2.91	3.90	2.30	5.07	4.16	2.58	2.02	1.56	0.99
96	8.36	5.92	7.11	4.75	6.95	4.60	5.31	4.04	5.08	2.98	4.92	3.81	2.03	1.48	1.48	0.99
年	食道癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血病		鼻咽癌		膀胱癌		膽囊和其他膽道癌		腎臟癌		腦癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	8.40	5.90	5.96	3.65	5.96	4.28	4.79	3.61	4.47	2.62	2.43	1.62	2.20	1.45	2.04	1.86

表50・臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬女性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		子宮頸癌		非何杰金淋巴瘤	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
83	84.08	97.18	16.03	18.61	9.98	11.93	10.13	11.09	8.32	9.77	7.18	8.35	7.79	8.86	2.27	2.60
84	91.16	101.11	15.23	17.38	10.46	11.87	10.23	10.58	10.15	11.33	8.79	9.62	8.18	9.11	1.97	2.24
85	95.32	102.11	15.05	16.32	11.46	12.60	11.69	11.54	10.39	11.19	7.71	8.31	7.79	8.16	4.05	4.52
86	105.07	108.40	18.96	19.84	10.74	11.24	13.97	13.25	11.36	11.98	9.06	9.12	9.82	10.16	4.14	4.58
87	101.48	100.73	18.78	18.93	13.53	13.74	12.47	11.87	9.73	9.98	7.53	7.45	7.75	7.32	4.71	4.70
88	99.92	95.83	15.64	15.01	13.31	12.87	12.18	11.19	10.08	9.99	8.57	8.16	8.50	7.95	4.29	4.14
89	103.56	96.02	17.76	16.76	14.84	13.81	12.66	11.48	9.74	9.23	8.24	7.39	7.27	6.51	3.37	3.15
90	114.12	101.60	19.77	17.50	13.70	12.12	14.90	12.94	13.48	12.35	7.86	6.94	8.24	7.39	3.00	2.70
91	123.33	105.00	22.51	19.16	15.33	12.92	14.36	12.05	12.64	11.00	10.70	8.90	7.85	6.60	5.61	4.83
92	117.42	96.19	20.55	16.75	14.20	11.38	15.55	12.66	13.98	11.62	8.15	6.45	6.35	5.09	5.53	4.79
93	120.38	94.63	21.04	16.41	15.87	12.42	15.20	11.80	13.62	10.67	8.46	6.55	6.51	4.90	4.27	3.40
94	124.20	93.11	23.05	16.99	17.66	12.94	16.76	12.67	12.12	9.11	8.83	6.35	6.43	4.89	4.94	3.79
95	128.65	92.46	22.48	15.97	16.08	11.23	15.56	11.37	13.70	9.88	9.16	6.31	6.03	4.26	4.69	3.44
96	133.94	91.74	26.06	17.61	18.44	12.25	15.03	10.59	13.18	9.11	8.51	5.61	6.59	4.39	6.52	4.63
年	所有癌症死亡原因		氣管、支氣管和肺癌		結腸、直腸和肛門癌		女性乳房癌		肝和肝內膽管癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸及部位未明示子宮癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	130.86	87.54	24.78	16.27	17.31	11.20	16.87	11.66	15.76	10.79	6.95	4.47	5.77	3.76	5.55	3.62

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表50・臺北市歷年女性主要癌症死因標準化死亡率(續)

—以2000年W.H.O.之世界標準人口數為準—

單位：人／每十萬女性人口

年	胰臟癌		卵巢癌		膽囊癌		白血癆		子宮體癌		膀胱癌		腦癌		食道癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
83	2.19	2.51	2.19	2.53	2.50	2.80	2.50	2.95	0.15	0.16	0.91	1.17	3.25	3.49	0.38	0.49
84	2.58	3.03	3.33	3.42	2.80	3.17	2.65	2.85	0.61	0.65	1.14	1.41	1.74	1.87	0.83	0.99
85	3.67	4.07	3.36	3.51	3.13	3.47	2.60	2.82	0.53	0.59	1.15	1.26	1.76	1.84	0.92	1.04
86	3.91	4.15	2.76	2.82	2.84	3.08	3.15	3.26	0.00	0.00	1.15	1.22	2.38	2.48	0.92	0.91
87	3.04	3.07	3.19	3.00	2.81	2.90	2.66	2.63	0.08	0.07	1.14	1.20	2.05	2.08	0.68	0.70
88	3.68	3.64	3.08	2.90	3.16	3.12	2.03	1.96	1.50	1.46	1.35	1.25	0.90	0.86	1.13	1.09
89	4.05	3.77	3.15	2.85	3.67	3.51	2.32	2.26	1.27	1.21	2.17	2.03	1.12	1.06	0.60	0.55
90	3.97	3.50	4.19	3.62	4.04	3.59	2.62	2.46	1.20	1.12	1.12	0.98	1.65	1.63	0.82	0.73
91	4.56	3.82	3.96	3.31	4.34	3.80	3.44	3.11	1.72	1.46	1.05	0.91	1.35	1.21	0.52	0.44
92	4.48	3.58	3.66	3.05	3.66	2.97	3.21	3.00	1.20	0.99	1.12	0.88	1.72	1.44	0.60	0.48
93	5.61	4.50	4.34	3.38	4.49	3.43	2.99	2.65	1.65	1.34	2.25	1.66	1.80	1.70	1.12	0.86
94	4.86	3.55	3.74	2.76	3.74	2.88	3.07	2.58	1.65	1.33	1.57	1.20	1.87	1.63	0.75	0.52
95	6.10	4.35	5.43	3.91	4.17	2.93	3.28	2.52	1.86	1.41	2.38	1.62	1.64	1.30	0.74	0.56
96	6.44	4.41	5.48	3.91	4.44	3.11	2.89	2.10	1.93	1.34	1.93	1.23	1.48	1.13	1.41	0.94
年	卵巢癌		非何杰金氏淋巴瘤		白血癆		膽囊和其他膽道癌		子宮體癌		間皮和軟組織癌		腎臟癌		鼻咽癌	
	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率	死亡率	標準化死亡率
97	4.29	2.96	4.07	2.73	3.33	2.61	2.59	1.68	2.07	1.42	1.92	1.35	1.92	1.24	1.70	1.21

肆、歷年死因統計

二、行政區別死因統計

表51-1・臺北市松山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		750	351.63		797	375.45		837	397.63		832	400.24		838	404.81		894	430.00
08-14	惡性腫瘤	1	227	106.43	1	224	105.52	1	254	120.67	1	256	123.15	1	261	126.08	1	249	119.77
25-27-28*	心臟疾病	2	95	44.54	3	91	42.87	2	104	49.41	2	85	40.89	2	93	44.93	2	91	43.77
29	腦血管疾病	3	59	27.66	2	103	48.52	3	99	47.03	3	83	39.93	3	92	44.44	4	82	39.44
181	糖尿病	5	37	17.35	4	42	19.79	5	41	19.48	4	57	27.42	4	47	22.70	4	82	39.44
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	17	7.97	7	26	12.25	8	19	9.03	7	22	10.58	7	23	11.11	7	25	12.02
321	肺炎	6	26	12.19	6	27	12.72	6	32	15.20	8	20	9.62	7	23	11.11	6	29	13.95
E54	自殺	10	14	6.56	10	17	8.01	11	15	7.13	10	13	6.25	6	24	11.59	10	12	5.77
E47-E53	事故傷害	4	51	23.91	5	30	14.13	4	50	23.75	5	47	22.61	4	47	22.70	3	89	42.81
347	慢性肝病及肝硬化	7	18	8.44	8	21	9.89	8	19	9.03	9	19	9.14	10	17	8.21	8	23	11.06
038	敗血症	16	3	1.41	12	7	3.30	13	7	3.33	13	9	4.33	14	5	2.42	14	4	1.92
	其他		203	95.17		209	98.45		197	93.59		221	106.31		206	99.51		208	100.05

註： 年中人口數 213,293 212,280 210,498 207,878 207,010 207,906

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-1・臺北市松山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		901	434.30		913	442.84		938	457.20		936	455.61		960	466.52		1,024	494.61
08-14	惡性腫瘤	1	309	148.95	1	299	145.03	1	280	136.48	1	307	149.43	1	304	147.73	1	313	151.18
25-27-28*	心臟疾病	3	75	36.15	3	89	43.17	2	121	58.98	2	92	44.78	2	101	49.08	2	134	64.72
29	腦血管疾病	2	104	50.13	2	96	46.56	3	88	42.89	4	66	32.13	3	81	39.36	3	91	43.95
181	糖尿病	4	64	30.85	4	56	27.16	4	63	30.71	3	79	38.45	4	62	30.13	4	67	32.36
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	31	14.94	7	26	12.61	5	37	18.03	7	29	14.12	7	27	13.12	7	33	15.94
321	肺炎	9	16	7.71	5	39	18.92	6	34	16.57	6	31	15.09	5	42	20.41	5	41	19.80
E54	自殺	10	14	6.75	9	20	9.70	7	24	11.70	9	19	9.25	9	18	8.75	9	20	9.66
E47-E53	事故傷害	5	39	18.80	6	34	16.49	8	23	11.21	5	41	19.96	6	38	18.47	6	35	16.91
347	慢性肝病及肝硬化	7	23	11.09	8	21	10.19	10	13	6.34	8	23	11.20	8	20	9.72	8	22	10.63
038	敗血症	13	5	2.41	12	7	3.40	11	9	4.39	11	10	4.87	12	9	4.37	11	10	4.83
	其他		221	106.53		226	109.62		246	119.91		239	116.34		258	125.38		258	124.62
註：	年中人口數			207,459			206,167			205,160			205,441			205,778			207,032

表51-1・臺北市松山區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		963	461.29		1,011	480.96	A00-Y98	所有死亡原因		1,057	502.04
08-14	惡性腫瘤	1	345	165.26	1	332	157.94	C00-C97	惡性腫瘤	1	306	145.34
25-27-28*	心臟疾病	2	104	49.82	2	108	51.38	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	140	66.50
29	腦血管疾病	3	73	34.97	3	86	40.91	I60-I69	腦血管疾病	3	87	41.32
181	糖尿病	4	65	31.14	4	79	37.58	J12-J18	肺炎	4	63	29.92
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	26	12.45	5	41	19.50	E10-E14	糖尿病	5	49	23.27
321	肺炎	7	28	13.41	6	37	17.60	A40-A41	敗血症	6	46	21.85
E54	自殺	6	30	14.37	7	29	13.80	I10-I15	高血壓性疾病	7	37	17.57
E47-E53	事故傷害	5	34	16.29	8	26	12.37	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	31	14.72
347	慢性肝病及肝硬化	8	26	12.45	9	17	8.09	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	27	12.82
038	敗血症	15	3	1.44	10	14	6.66	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	10	22	10.45
	其他		229	109.69		242	115.13		其他		249	118.27

註： 年中人口數 208,762 210,204 210,542

表51-2・臺北市信義區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,138	462.43		1,176	479.31		1,172	484.31		1,208	503.23		1,305	541.06		1,230	507.83
08-14	惡性腫瘤	1	285	115.81	1	303	123.50	1	306	126.45	1	327	136.22	1	371	153.82	1	343	141.61
25-27-28*	心臟疾病	2	163	66.24	2	121	49.32	2	135	55.79	2	159	66.24	2	141	58.46	2	145	59.87
29	腦血管疾病	3	122	49.58	3	120	48.91	3	128	52.89	3	134	55.82	3	134	55.56	3	108	44.59
181	糖尿病	5	54	21.94	5	59	24.05	4	71	29.34	4	93	38.74	4	67	27.78	4	89	36.75
321	肺炎	6	39	15.85	6	48	19.56	6	47	19.42	8	30	12.50	8	38	15.75	5	63	26.01
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	11	21	8.53	9	33	13.45	7	45	18.60	6	33	13.75	7	46	19.07	7	45	18.58
347	慢性肝病及肝硬化	8	29	11.78	7	36	14.67	9	31	12.81	7	31	12.91	6	51	21.14	8	36	14.86
E54	自殺	9	23	9.35	11	16	6.52	10	30	12.40	12	16	6.67	9	26	10.78	10	26	10.73
E47-E53	事故傷害	4	93	37.79	4	81	33.01	5	63	26.03	5	57	23.75	5	56	23.22	6	58	23.95
26	高血壓性疾病	7	30	12.19	8	34	13.86	8	34	14.05	9	29	12.08	10	25	10.37	9	29	11.97
	其他		279	113.37		325	132.46		282	116.53		299	124.56		350	145.11		288	118.91

註： 年中人口數 246,090 245,352 241,996 240,050 241,194 242,208

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-2・臺北市信義區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		1,239	513.88		1,355	567.15		1,308	550.86		1,353	573.36		1,331	569.90		1,366	589.70	
08-14	惡性腫瘤	1	351	145.58	1	410	171.61	1	383	161.30	1	367	155.52	1	373	159.71	1	430	185.63	
25-27-28*	心臟疾病	2	132	54.75	2	151	63.20	2	161	67.80	2	166	70.35	2	178	76.22	3	159	68.64	
29	腦血管疾病	3	124	51.43	3	141	59.02	3	111	46.75	3	128	54.24	3	115	49.24	2	163	70.37	
181	糖尿病	4	92	38.16	4	90	37.67	5	52	21.90	4	106	44.92	4	74	31.69	4	80	34.54	
321	肺炎	8	30	12.44	6	41	17.16	4	73	30.74	5	52	22.04	6	52	22.27	5	51	22.02	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	36	14.93	7	35	14.65	7	43	18.11	6	50	21.19	5	59	25.26	6	50	21.58	
347	慢性肝病及肝硬化	6	39	16.18	8	34	14.23	9	25	10.53	9	32	13.56	9	32	13.70	8	31	13.38	
E54	自殺	9	21	8.71	9	31	12.98	8	36	15.16	7	39	16.53	8	35	14.99	7	45	19.43	
E47-E53	事故傷害	5	54	22.40	5	49	20.51	6	44	18.53	8	37	15.68	7	39	16.70	9	27	11.66	
26	高血壓性疾病	10	17	7.05	12	12	5.02	10	20	8.42	10	15	6.36	10	21	8.99	10	18	7.77	
	其他		343	142.26		361	151.10		360	151.61		361	152.98		353	151.15		312	134.69	
註：	年中人口數		241,106			238,912			237,446			235,976			233,548			231,643		

表51-2・臺北市信義區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,271	549.91		1,363	592.17	A00-Y98	所有死亡原因		1,342	587.77
08-14	惡性腫瘤	1	401	173.50	1	427	185.51	C00-C97	惡性腫瘤	1	397	173.88
25-27-28*	心臟疾病	2	134	57.98	2	167	72.55	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	181	79.28
29	腦血管疾病	3	105	45.43	3	133	57.78	I60-I69	腦血管疾病	3	115	50.37
181	糖尿病	3	105	45.43	4	76	33.02	J12-J18	肺炎	4	87	38.10
321	肺炎	5	61	26.39	5	65	28.24	E10-E14	糖尿病	5	51	22.34
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	45	19.47	6	40	17.38	A40-A41	敗血症	6	47	20.59
347	慢性肝病及肝硬化	9	23	9.95	7	29	12.60	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	7	47	20.59
E54	自殺	7	40	17.31	8	27	11.73	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	45	19.71
E47-E53	事故傷害	8	28	12.11	9	24	10.43	I10-I15	高血壓性疾病	9	41	17.96
26	高血壓性疾病	10	17	7.36	10	15	6.52	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	10	34	14.89
	其他		312	134.99		360	156.40		其他		297	130.08

註： 年中人口數 231,128 230,172 228,319

表51-3・臺北市大安區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,306	387.94		1,416	424.70		1,431	442.54		1,435	454.53		1,414	446.61		1,471	462.50
08-14	惡性腫瘤	1	387	114.96	1	410	122.97	1	455	140.71	1	444	140.64	1	410	129.50	1	438	137.71
25-27-28*	心臟疾病	2	162	48.12	2	184	55.19	2	154	47.63	2	176	55.75	2	181	57.17	2	177	55.65
29	腦血管疾病	3	119	35.35	3	169	50.69	3	148	45.77	3	143	45.29	3	140	44.22	3	151	47.48
181	糖尿病	5	62	18.42	5	74	22.19	5	74	22.88	4	85	26.92	5	65	20.53	4	102	32.07
321	肺炎	6	42	12.48	6	49	14.70	6	43	13.30	9	35	11.09	8	42	13.27	7	43	13.52
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	38	11.29	7	45	13.50	8	41	12.68	7	49	15.52	6	54	17.06	6	49	15.41
E47-E53	事故傷害	4	101	30.00	4	80	23.99	4	79	24.43	5	57	18.05	4	70	22.11	5	66	20.75
E54	自殺	11	13	3.86	9	24	7.20	13	10	3.09	10	28	8.87	13	13	4.11	11	13	4.09
038	敗血症	13	11	3.27	12	10	3.00	11	16	4.95	12	15	4.75	11	15	4.74	16	5	1.57
347	慢性肝病及肝硬化	8	34	10.10	10	22	6.60	9	37	11.44	8	37	11.72	9	29	9.16	8	39	12.26
	其他		337	100.10		349	104.68		374	115.66		366	115.93		395	124.76		388	121.99

註： 年中人口數 336,651 333,412 323,358 315,709 316,610 318,056

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-3・臺北市大安區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,448	456.72		1,507	476.30		1,509	477.89		1,570	499.42		1,584	506.42		1,638	524.39
08-14	惡性腫瘤	1	409	129.00	1	481	152.02	1	514	162.78	1	488	155.23	1	527	168.49	1	501	160.39
25-27-28*	心臟疾病	3	151	47.63	2	179	56.57	2	158	50.04	2	198	62.98	2	210	67.14	2	225	72.03
29	腦血管疾病	2	157	49.52	3	151	47.72	3	122	38.64	3	139	44.22	3	126	40.28	3	142	45.46
181	糖尿病	4	112	35.33	4	89	28.13	4	111	35.15	4	114	36.26	4	107	34.21	4	106	33.94
321	肺炎	8	35	11.04	6	45	14.22	7	57	18.05	5	76	24.18	6	51	16.31	5	89	28.49
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	54	17.03	5	54	17.07	5	60	19.00	7	54	17.18	5	63	20.14	6	78	24.97
E47-E53	事故傷害	5	62	19.56	7	44	13.91	6	58	18.37	6	62	19.72	7	43	13.75	7	44	14.09
E54	自殺	10	21	6.62	9	24	7.59	8	37	11.72	10	23	7.32	8	35	11.19	8	40	12.81
038	敗血症	14	9	2.84	12	14	4.42	12	10	3.17	12	9	2.86	12	11	3.52	14	6	1.92
347	慢性肝病及肝硬化	7	38	11.99	8	35	11.06	9	30	9.50	8	37	11.77	9	25	7.99	9	30	9.60
	其他		400	126.17		391	123.58		382	120.98		370	117.70		386	123.41		377	120.69
註：	年中人口數			317,044			316,398			315,766			314,362			312,782			312,360

表51-3・臺北市大安區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,546	493.66		1,598	508.03	A00-Y98	所有死亡原因		1,715	545.51
08-14	惡性腫瘤	1	495	158.06	1	473	150.37	C00-C97	惡性腫瘤	1	501	159.36
25-27-28*	心臟疾病	2	174	55.56	2	194	61.68	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	237	75.39
29	腦血管疾病	3	121	38.64	3	145	46.10	I60-I69	腦血管疾病	3	131	41.67
181	糖尿病	4	105	33.53	4	118	37.51	J12-J18	肺炎	4	92	29.26
321	肺炎	6	46	14.69	5	78	24.80	E10-E14	糖尿病	5	74	23.54
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	58	18.52	6	61	19.39	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	6	63	20.04
E47-E53	事故傷害	8	37	11.81	7	37	11.76	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	7	55	17.49
E54	自殺	7	40	12.77	8	36	11.45	A40-A41	敗血症	8	54	17.18
038	敗血症	11	22	7.02	9	25	7.95	I10-I15	高血壓性疾病	9	45	14.31
347	慢性肝病及肝硬化	8	37	11.81	10	22	6.99	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	10	45	14.31
	其他		411	131.24		409	130.03		其他		418	132.96
註：	年中人口數		313,169			314,548					314,386	

表51-4・臺北市中山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		957	422.20		987	440.48		972	444.28		1,037	484.33		989	462.79		949	441.58
08-14	惡性腫瘤	1	249	109.85	1	289	128.97	1	281	128.44	1	323	150.86	1	302	141.32	1	293	136.34
25-27-28*	心臟疾病	3	113	49.85	2	124	55.34	3	120	54.85	3	106	49.51	3	96	44.92	2	99	46.07
29	腦血管疾病	2	117	51.62	3	106	47.31	2	129	58.96	2	111	51.84	2	105	49.13	3	91	42.34
181	糖尿病	5	49	21.62	5	47	20.98	5	46	21.03	5	64	29.89	4	56	26.20	4	59	27.45
321	肺炎	8	28	12.35	7	32	14.28	9	17	7.77	8	30	14.01	8	26	12.17	8	29	13.49
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	29	12.79	8	25	11.16	6	29	13.26	6	37	17.28	7	34	15.91	7	33	15.36
E47-E53	事故傷害	4	76	33.53	4	64	28.56	4	63	28.80	4	75	35.03	5	49	22.93	5	49	22.80
E54	自殺	11	13	5.74	10	20	8.93	9	17	7.77	10	17	7.94	11	17	7.95	9	22	10.24
347	慢性肝病及肝硬化	6	33	14.56	6	37	16.51	8	22	10.06	7	32	14.95	6	39	18.25	6	38	17.68
038	敗血症	12	10	4.41	15	4	1.79	11	13	5.94	13	13	6.07	13	8	3.74	15	5	2.33
	其他		240	105.88		239	106.66		235	107.41		229	106.95		257	120.26		231	107.49

註： 年中人口數 226,670 224,076 218,782 214,109 213,703 214,910

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-4・臺北市中山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		1,017	472.82		1,074	497.71		1,045	482.00		1,114	512.69		1,123	517.67		1,178	543.14	
08-14	惡性腫瘤	1	325	151.10	1	349	161.73	1	359	165.59	1	354	162.92	1	370	170.56	1	374	172.44	
25-27-28*	心臟疾病	3	88	40.91	2	110	50.98	2	114	52.58	2	120	55.23	2	154	70.99	2	146	67.32	
29	腦血管疾病	2	99	46.03	3	104	48.20	3	87	40.13	3	104	47.86	3	83	38.26	3	102	47.03	
181	糖尿病	3	88	40.91	4	100	46.34	4	82	37.82	4	58	26.69	4	71	32.73	4	91	41.96	
321	肺炎	9	17	7.90	7	25	11.59	8	26	11.99	7	35	16.11	5	35	16.13	5	49	22.59	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	52	24.18	5	52	24.10	6	31	14.30	5	57	26.23	7	31	14.29	7	36	16.60	
E47-E53	事故傷害	6	46	21.39	6	38	17.61	5	41	18.91	6	36	16.57	9	27	12.45	8	33	15.22	
E54	自殺	8	25	11.62	7	25	11.59	7	27	12.45	9	27	12.43	5	35	16.13	6	44	20.29	
347	慢性肝病及肝硬化	7	28	13.02	9	23	10.66	9	23	10.61	8	30	13.81	8	30	13.83	9	27	12.45	
038	敗血症	13	10	4.65	12	8	3.71	12	6	2.77	13	7	3.22	12	5	2.30	10	15	6.92	
	其他		239	111.12		240	111.22		249	114.85		286	131.62		282	129.99		261	120.34	
註：	年中人口數		215,092			215,788			216,806			217,284			216,934			216,887		

表51-4・臺北市中山區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,106	506.77		1,230	561.56	A00-Y98	所有死亡原因		1,264	578.06
08-14	惡性腫瘤	1	351	160.83	1	384	175.32	C00-C97	惡性腫瘤	1	382	174.70
25-27-28*	心臟疾病	2	138	63.23	2	147	67.11	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	167	76.37
29	腦血管疾病	3	105	48.11	3	109	49.76	I60-I69	腦血管疾病	3	112	51.22
181	糖尿病	4	71	32.53	4	86	39.26	J12-J18	肺炎	4	70	32.01
321	肺炎	6	48	21.99	5	67	30.59	E10-E14	糖尿病	5	69	31.56
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	27	12.37	6	44	20.09	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	6	40	18.29
E47-E53	事故傷害	8	23	10.54	7	31	14.15	A40-A41	敗血症	7	37	16.92
E54	自殺	5	49	22.45	8	29	13.24	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	36	16.46
347	慢性肝病及肝硬化	9	22	10.08	9	23	10.50	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	32	14.63
038	敗血症	11	11	5.04	10	21	9.59	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	30	13.72
	其他		261	119.59		289	131.94		其他		289	132.17

註： 年中人口數 218,244 219,033 218,662

表51-5・臺北市中正區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		764	436.61		786	454.91		821	486.17		778	468.89		802	483.88		840	506.24
08-14	惡性腫瘤	1	213	121.73	1	244	141.22	1	210	124.35	1	242	145.85	1	227	136.96	1	247	148.86
25-27-28*	心臟疾病	3	68	38.86	3	77	44.57	2	100	59.22	2	103	62.08	2	101	60.94	2	111	66.90
29	腦血管疾病	2	76	43.43	2	86	49.77	3	97	57.44	3	69	41.59	3	80	48.27	3	66	39.78
181	糖尿病	5	36	20.57	4	39	22.57	4	49	29.02	4	47	28.33	5	38	22.93	4	44	26.52
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	23	13.14	9	20	11.58	6	30	17.76	6	24	14.46	7	27	16.29	6	31	18.68
321	肺炎	9	20	11.43	7	27	15.63	8	27	15.99	9	18	10.85	8	25	15.08	7	28	16.87
E47-E53	事故傷害	4	56	32.00	5	32	18.52	5	45	26.65	5	40	24.11	4	46	27.75	5	37	22.30
E54	自殺	12	6	3.43	11	8	4.63	10	13	7.70	15	5	3.01	12	5	3.02	11	11	6.63
347	慢性肝病及肝硬化	6	32	18.29	7	27	15.63	9	25	14.80	7	21	12.66	6	33	19.91	7	28	16.87
26	高血壓性疾病	8	21	12.00	6	30	17.36	7	28	16.58	8	19	11.45	9	14	8.45	9	19	11.45
	其他		213	121.73		196	113.44		197	116.66		190	114.51		206	124.29		218	131.38

註： 年中人口數 174,984 172,780 168,872 165,924 165,744 165,928

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-5・臺北市中正區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		917	558.44		864	532.14		905	559.60		870	541.37		858	539.48		892	564.88	
08-14	惡性腫瘤	1	275	167.47	1	267	164.45	1	288	178.08	1	245	152.45	1	245	154.05	1	282	178.58	
25-27-28*	心臟疾病	2	97	59.07	2	111	68.37	2	101	62.45	2	111	69.07	2	113	71.05	2	102	64.59	
29	腦血管疾病	3	88	53.59	3	94	57.90	3	88	54.41	3	73	45.43	3	89	55.96	3	88	55.73	
181	糖尿病	4	66	40.19	4	58	35.72	4	62	38.34	4	64	39.82	4	59	37.10	4	58	36.73	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	30	18.27	5	32	19.71	7	25	15.46	6	32	19.91	5	34	21.38	7	23	14.57	
321	肺炎	8	24	14.62	6	26	16.01	5	34	21.02	5	56	34.85	6	24	15.09	5	30	19.00	
E47-E53	事故傷害	5	38	23.14	7	22	13.55	6	29	17.93	8	16	9.96	8	21	13.20	6	24	15.20	
E54	自殺	11	10	6.09	9	12	7.39	8	20	12.37	7	18	11.20	7	22	13.83	8	19	12.03	
347	慢性肝病及肝硬化	7	27	16.44	8	19	11.70	10	12	7.42	9	15	9.33	8	21	13.20	9	18	11.40	
26	高血壓性疾病	9	20	12.18	10	10	6.16	9	17	10.51	10	14	8.71	10	11	6.92	10	10	6.33	
	其他		242	147.37		213	131.19		229	141.60		226	140.63		219	137.70		238	150.72	
註：	年中人口數		164,207			162,362			161,722			160,704			159,042			157,911		

表51-5・臺北市中正區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		843	533.65		874	549.53	A00-Y98	所有死亡原因		957	600.33
08-14	惡性腫瘤	1	267	169.02	1	258	162.22	C00-C97	惡性腫瘤	1	303	190.07
25-27-28*	心臟疾病	2	80	50.64	2	86	54.07	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	127	79.67
29	腦血管疾病	3	62	39.25	3	75	47.16	I60-I69	腦血管疾病	3	71	44.54
181	糖尿病	4	53	33.55	4	58	36.47	J12-J18	肺炎	4	70	43.91
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	31	19.62	5	52	32.70	A40-A41	敗血症	5	41	25.72
321	肺炎	5	51	32.28	6	38	23.89	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	6	35	21.96
E47-E53	事故傷害	8	25	15.83	7	25	15.72	E10-E14	糖尿病	7	30	18.82
E54	自殺	9	24	15.19	8	22	13.83	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	22	13.80
347	慢性肝病及肝硬化	7	26	16.46	9	17	10.69	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	9	21	13.17
26	高血壓性疾病	10	14	8.86	10	10	6.29	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	10	19	11.92
	其他		210	132.94		233	146.50		其他		218	136.75

註： 年中人口數 157,970 159,045 159,412

表51-6・臺北市大同區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死亡率
01-56	所有死亡原因		693	496.61		733	536.47		711	528.07		756	564.51		778	580.11		775	578.22
08-14	惡性腫瘤	1	173	123.97	1	230	168.33	1	194	144.09	1	232	173.24	1	204	152.11	1	223	166.38
25-27-28*	心臟疾病	2	82	58.76	2	73	53.43	2	88	65.36	2	111	82.88	2	96	71.58	2	91	67.89
29	腦血管疾病	3	80	57.33	3	72	52.70	3	84	62.39	3	89	66.46	3	94	70.09	3	87	64.91
181	糖尿病	4	41	29.38	4	48	35.13	5	43	31.94	5	39	29.12	4	54	40.26	4	48	35.81
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	21	15.05	6	30	21.96	6	30	22.28	7	26	19.41	6	31	23.12	8	23	17.16
321	肺炎	8	20	14.33	8	22	16.10	9	15	11.14	8	17	12.69	8	17	12.68	7	24	17.91
E47-E53	事故傷害	5	40	28.66	5	47	34.40	4	46	34.17	4	42	31.36	5	53	39.52	5	33	24.62
347	慢性肝病及肝硬化	6	28	20.07	7	25	18.30	7	21	15.60	6	28	20.91	7	19	14.17	6	30	22.38
E54	自殺	12	8	5.73	11	10	7.32	12	7	5.20	13	7	5.23	10	11	8.20	14	6	4.48
038	敗血症	11	11	7.88	10	12	8.78	11	9	6.68	13	7	5.23	9	13	9.69	16	2	1.49
	其他		189	135.44		164	120.03		174	129.23		158	117.98		186	138.69		208	155.19

註： 年中人口數 139,546 136,634 134,640 133,922 134,112 134,033

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-6・臺北市大同區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		747	561.24		749	567.34		811	618.09		812	623.38		766	593.91		867	679.14	
08-14	惡性腫瘤	1	201	151.02	1	223	168.92	1	250	190.53	1	242	185.78	1	205	158.94	1	228	178.60	
25-27-28*	心臟疾病	4	68	51.09	3	73	55.30	2	93	70.88	2	97	74.47	2	89	69.01	2	95	74.42	
29	腦血管疾病	2	101	75.88	2	88	66.66	3	69	52.59	3	80	61.42	3	73	56.60	3	89	69.72	
181	糖尿病	3	69	51.84	4	51	38.63	4	62	47.25	4	56	42.99	4	60	46.52	4	63	49.35	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	26	19.53	5	36	27.27	5	29	22.10	5	42	32.24	5	33	25.59	5	42	32.90	
321	肺炎	8	24	18.03	9	15	11.36	6	27	20.58	6	26	19.96	6	32	24.81	7	25	19.58	
E47-E53	事故傷害	5	37	27.80	6	29	21.97	8	19	14.48	7	24	18.42	8	20	15.51	8	24	18.80	
347	慢性肝病及肝硬化	7	25	18.78	7	24	18.18	7	21	16.00	8	22	16.89	7	21	16.28	9	22	17.23	
E54	自殺	9	13	9.77	8	17	12.88	8	19	14.48	9	15	11.52	9	19	14.73	6	30	23.50	
038	敗血症	12	4	3.01	11	11	8.33	12	6	4.57	12	5	3.84	12	6	4.65	10	18	14.10	
	其他		179	134.49		182	137.86		216	164.62		203	155.84		208	161.27		231	180.95	
註：	年中人口數		133,098			132,018			131,210			130,258			128,976			127,661		

表51-6・臺北市大同區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		802	632.16		810	640.19	A00-Y98	所有死亡原因		893	712.18
08-14	惡性腫瘤	1	273	215.19	1	259	204.70	C00-C97	惡性腫瘤	1	267	212.93
25-27-28*	心臟疾病	2	96	75.67	2	94	74.29	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	118	94.11
29	腦血管疾病	4	55	43.35	3	68	53.74	I60-I69	腦血管疾病	3	65	51.84
181	糖尿病	3	56	44.14	4	50	39.52	J12-J18	肺炎	4	61	48.65
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	25	19.71	5	35	27.66	E10-E14	糖尿病	5	55	43.86
321	肺炎	5	29	22.86	6	29	22.92	A40-A41	敗血症	6	32	25.52
E47-E53	事故傷害	8	20	15.76	7	24	18.97	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	26	20.74
347	慢性肝病及肝硬化	10	10	7.88	7	24	18.97	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	23	18.34
E54	自殺	7	22	17.34	9	18	14.23	M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	9	21	16.75
038	敗血症	9	11	8.67	10	13	10.27	I10-I15	高血壓性疾病	10	21	16.75
	其他		205	161.59		196	154.91		其他		204	162.69

註： 年中人口數 126,867 126,526 125,391

表51-7・臺北市萬華區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,154	526.31		1,094	506.93		1,218	573.08		1,227	584.91		1,186	567.13		1,283	614.28
08-14	惡性腫瘤	1	293	133.63	1	270	125.11	1	317	149.15	1	322	153.50	1	301	143.94	1	366	175.24
25-27-28*	心臟疾病	2	143	65.22	2	136	63.02	2	151	71.05	2	167	79.61	2	128	61.21	2	145	69.42
29	腦血管疾病	3	129	58.83	3	127	58.85	3	132	62.11	3	131	62.45	3	123	58.82	3	127	60.81
181	糖尿病	5	58	26.45	5	57	26.41	5	63	29.64	4	83	39.57	4	72	34.43	4	100	47.88
321	肺炎	8	32	14.59	8	30	13.90	10	23	10.82	10	24	11.44	9	25	11.95	8	29	13.88
350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	53	24.17	7	35	16.22	7	35	16.47	7	33	15.73	6	46	22.00	7	45	21.55
347	慢性肝病及肝硬化	7	51	23.26	6	43	19.93	6	54	25.41	6	47	22.40	7	45	21.52	6	49	23.46
E54	自殺	10	19	8.67	11	19	8.80	9	27	12.70	8	27	12.87	11	20	9.56	11	16	7.66
E47-E53	事故傷害	4	88	40.13	4	73	33.83	4	89	41.88	5	71	33.85	5	67	32.04	5	65	31.12
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	11	14	6.38	9	24	11.12	11	19	8.94	11	23	10.96	9	25	11.95	10	22	10.53
	其他		274	124.96		280	129.74		308	144.92		299	142.53		334	159.72		319	152.73

註： 年中人口數 219,264 215,808 212,537 209,778 209,122 208,862

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-7・臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,269	611.86		1,344	654.21		1,335	655.25		1,389	688.11		1,391	699.50		1,454	741.48
08-14	惡性腫瘤	1	332	160.08	1	377	183.51	1	386	189.46	1	388	192.21	1	414	208.19	1	431	219.79
25-27-28*	心臟疾病	3	123	59.31	3	149	72.53	2	153	75.10	2	147	72.82	2	160	80.46	2	142	72.41
29	腦血管疾病	2	129	62.20	2	152	73.99	3	133	65.28	3	134	66.38	3	125	62.86	3	139	70.88
181	糖尿病	4	106	51.11	4	100	48.68	4	88	43.19	4	108	53.50	4	92	46.26	4	113	57.63
321	肺炎	9	26	12.54	8	34	16.55	5	55	27.00	5	73	36.16	8	43	21.62	5	60	30.60
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	49	23.63	5	55	26.77	7	46	22.58	7	54	26.75	6	54	27.16	7	45	22.95
347	慢性肝病及肝硬化	7	34	16.39	7	43	20.93	8	43	21.11	8	53	26.26	7	53	26.65	9	28	14.28
E54	自殺	8	29	13.98	9	32	15.58	9	28	13.74	9	30	14.86	9	33	16.59	6	58	29.58
E47-E53	事故傷害	5	64	30.86	6	50	24.34	6	52	25.52	6	57	28.24	5	60	30.17	8	37	18.87
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	13	14	6.75	10	22	10.71	12	12	5.89	10	13	6.44	13	11	5.53	11	16	8.16
	其他		363	175.02		330	160.63		339	166.39		332	164.47		346	174.00		385	196.33
註：	年中人口數	207,399			205,440			203,738			201,858			198,856			196,094		

表51-7・臺北市萬華區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,428	733.02		1,493	770.88	A00-Y98	所有死亡原因		1,502	784.68
08-14	惡性腫瘤	1	427	219.19	1	458	236.48	C00-C97	惡性腫瘤	1	394	205.83
25-27-28*	心臟疾病	2	149	76.48	2	160	82.61	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	203	106.05
29	腦血管疾病	3	138	70.84	3	126	65.06	J12-J18	肺炎	3	111	57.99
181	糖尿病	4	119	61.08	4	109	56.28	I60-I69	腦血管疾病	4	102	53.29
321	肺炎	6	49	25.15	5	87	44.92	E10-E14	糖尿病	5	88	45.97
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	58	29.77	6	63	32.53	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	6	61	31.87
347	慢性肝病及肝硬化	8	35	17.97	7	42	21.69	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	50	26.12
E54	自殺	6	49	25.15	8	37	19.10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	8	47	24.55
E47-E53	事故傷害	9	32	16.43	9	34	17.56	A40-A41	敗血症	9	46	24.03
323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	13	7	3.59	10	14	7.23	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	10	45	23.51
	其他		365	187.36		363	187.43		其他		355	185.46
註： 年中人口數			194,811			193,675					191,416	

表51-8・臺北市文山區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		894	400.16		1,041	461.94		1,086	474.55		1,057	454.28		1,125	469.43		1,130	458.85
08-14	惡性腫瘤	1	223	99.82	1	274	121.59	1	282	123.23	1	279	119.91	1	305	127.27	1	312	126.69
25-27-28*	心臟疾病	3	95	42.52	3	95	42.16	3	108	47.19	2	132	56.73	3	112	46.73	2	124	50.35
29	腦血管疾病	2	102	45.66	2	121	53.69	2	129	56.37	3	113	48.57	2	118	49.24	3	123	49.95
181	糖尿病	5	39	17.46	5	70	31.06	5	60	26.22	4	62	26.65	5	61	25.45	4	79	32.08
321	肺炎	10	21	9.40	8	30	13.31	7	28	12.24	8	31	13.32	8	29	12.10	7	35	14.21
E54	自殺	9	23	10.29	12	11	4.88	11	19	8.30	10	20	8.60	11	14	5.84	10	21	8.53
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	35	15.67	6	43	19.08	6	37	16.17	6	40	17.19	6	43	17.94	6	42	17.05
E47-E53	事故傷害	4	75	33.57	4	88	39.05	4	84	36.71	5	58	24.93	4	63	26.29	5	61	24.77
347	慢性肝病及肝硬化	8	24	10.74	9	29	12.87	8	27	11.80	7	33	14.18	7	37	15.44	8	33	13.40
038	敗血症	16	4	1.79	14	9	3.99	12	15	6.55	13	13	5.59	12	13	5.42	19	2	0.81
	其他		253	113.24		271	120.25		297	129.78		276	118.62		330	137.70		298	121.01

註： 年中人口數 223,412 225,355 228,850 232,676 239,650 246,270

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-8・臺北市文山區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每十萬 人 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		1,174	467.98		1,180	465.44		1,227	480.75		1,143	445.58		1,277	496.35		1,297	501.74	
08-14	惡性腫瘤	1	336	133.94	1	365	143.97	1	373	146.15	1	307	119.68	1	406	157.81	1	384	148.55	
25-27-28*	心臟疾病	3	101	40.26	3	122	48.12	2	145	56.81	2	159	61.98	2	165	64.13	2	148	57.25	
29	腦血管疾病	2	122	48.63	2	129	50.88	3	119	46.63	3	122	47.56	3	133	51.70	3	113	43.71	
181	糖尿病	4	81	32.29	4	67	26.43	4	87	34.09	4	69	26.90	4	79	30.71	4	79	30.56	
321	肺炎	8	34	13.55	8	33	13.02	7	39	15.28	5	45	17.54	6	41	15.94	5	57	22.05	
E54	自殺	9	22	8.77	9	29	11.44	9	22	8.62	7	31	12.08	7	35	13.60	7	44	17.02	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	43	17.14	7	36	14.20	5	43	16.85	9	22	8.58	5	42	16.32	6	51	19.73	
E47-E53	事故傷害	5	70	27.90	5	49	19.33	6	41	16.06	6	38	14.81	9	27	10.49	8	42	16.25	
347	慢性肝病及肝硬化	7	36	14.35	6	44	17.36	8	23	9.01	7	31	12.08	8	30	11.66	9	29	11.22	
038	敗血症	12	11	4.38	15	6	2.37	13	9	3.53	13	8	3.12	13	7	2.72	11	15	5.80	
	其他		318	126.76		300	118.33		326	127.73		311	121.24		312	121.27		335	129.59	
註：	年中人口數		250,866			253,526			255,224			256,517			257,276			258,500		

表51-8・臺北市文山區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,301	500.03		1,402	536.05	A00-Y98	所有死亡原因		1,388	530.39
08-14	惡性腫瘤	1	411	157.96	1	411	157.15	C00-C97	惡性腫瘤	1	426	162.79
25-27-28*	心臟疾病	2	133	51.12	2	168	64.23	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	188	71.84
29	腦血管疾病	3	119	45.74	3	116	44.35	I60-I69	腦血管疾病	3	102	38.98
181	糖尿病	4	71	27.29	4	84	32.12	J12-J18	肺炎	4	86	32.86
321	肺炎	5	59	22.68	5	74	28.29	E10-E14	糖尿病	5	60	22.93
E54	自殺	7	42	16.14	6	51	19.50	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	6	46	17.58
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	49	18.83	7	47	17.97	A40-A41	敗血症	7	45	17.20
E47-E53	事故傷害	8	33	12.68	8	35	13.38	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	8	41	15.67
347	慢性肝病及肝硬化	9	27	10.38	9	29	11.09	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	38	14.52
038	敗血症	11	17	6.53	10	20	7.65	I10-I15	高血壓性疾病	10	35	13.37
	其他		340	130.68		367	140.32		其他		321	122.66

註： 年中人口數 260,185 261,542 261,693

表51-9・臺北市南港區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		450	393.72		469	415.37		521	464.88		529	475.05		489	437.23		528	467.73
08-14	惡性腫瘤	1	125	109.37	1	139	123.11	1	139	124.03	1	149	133.80	1	137	122.50	1	146	129.34
25-27-28*	心臟疾病	3	47	41.12	3	43	38.08	3	51	45.51	3	51	45.80	3	54	48.28	3	47	41.64
29	腦血管疾病	4	37	32.37	2	49	43.40	2	55	49.08	2	56	50.29	2	55	49.18	2	57	50.49
181	糖尿病	5	20	17.50	5	27	23.91	5	26	23.20	5	32	28.74	6	19	16.99	4	29	25.69
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	13	11.37	10	8	7.09	8	15	13.38	6	16	14.37	9	12	10.73	7	20	17.72
347	慢性肝病及肝硬化	7	16	14.00	6	23	20.37	6	23	20.52	7	14	12.57	5	21	18.78	6	21	18.60
E47-E53	事故傷害	2	49	42.87	4	32	28.34	3	51	45.51	4	49	44.00	4	28	25.04	5	28	24.80
E54	自殺	10	8	7.00	8	11	9.74	11	8	7.14	7	14	12.57	12	6	5.36	9	12	10.63
321	肺炎	6	17	14.87	13	7	6.20	9	13	11.60	9	13	11.67	7	18	16.09	8	17	15.06
038	敗血症	14	2	1.75	14	5	4.43	13	5	4.46	12	7	6.29	13	4	3.58	13	4	3.54
	其他		116	101.49		125	110.71		135	120.46		128	114.94		135	120.71		147	130.22

註： 年中人口數 114,294 112,912 112,072 111,358 111,840 112,884

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-9・臺北市南港區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		568	499.97		568	498.07		568	498.74		570	502.29		567	501.54		587	519.39	
08-14	惡性腫瘤	1	166	146.12	1	202	177.13	1	177	155.42	1	176	155.09	1	193	170.72	1	186	164.58	
25-27-28*	心臟疾病	3	57	50.17	2	47	41.21	3	56	49.17	2	82	72.26	2	78	68.99	2	66	58.40	
29	腦血管疾病	2	64	56.33	3	38	33.32	2	65	57.07	3	66	58.16	3	48	42.46	3	55	48.67	
181	糖尿病	4	41	36.09	5	31	27.18	4	40	35.12	4	32	28.20	4	34	30.07	4	44	38.93	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	21	18.48	8	16	14.03	7	16	14.05	8	16	14.10	6	22	19.46	7	23	20.35	
347	慢性肝病及肝硬化	6	21	18.48	6	25	21.92	7	16	14.05	5	21	18.51	7	17	15.04	9	10	8.85	
E47-E53	事故傷害	5	29	25.53	4	35	30.69	5	24	21.07	7	18	15.86	5	30	26.54	5	25	22.12	
E54	自殺	9	11	9.68	9	14	12.28	6	19	16.68	9	15	13.22	8	13	11.50	6	24	21.24	
321	肺炎	8	14	12.32	7	24	21.05	9	15	13.17	6	19	16.74	9	10	8.85	8	11	9.73	
038	敗血症	16	2	1.76	13	4	3.51	10	8	7.02	10	8	7.02	11	3	2.65	12	5	4.42	
	其他		142	124.99		132	115.75		132	115.90		117	103.10		119	105.26		138	122.11	
註：	年中人口數		113,607			114,040			113,888			113,480			113,052			113,017		

表51-9・臺北市南港區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		649	573.55		596	525.17	A00-Y98	所有死亡原因		629	553.24
08-14	惡性腫瘤	1	206	182.05	1	195	171.83	C00-C97	惡性腫瘤	1	186	163.60
25-27-28*	心臟疾病	2	68	60.09	2	64	56.39	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	75	65.97
29	腦血管疾病	3	61	53.91	3	60	52.87	J12-J18	肺炎	3	58	51.01
181	糖尿病	4	41	36.23	4	27	23.79	I60-I69	腦血管疾病	4	52	45.74
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	17	15.02	5	25	22.03	E10-E14	糖尿病	5	31	27.27
347	慢性肝病及肝硬化	9	15	13.26	6	22	19.39	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	6	24	21.11
E47-E53	事故傷害	5	30	26.51	7	19	16.74	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	21	18.47
E54	自殺	5	30	26.51	8	14	12.34	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	20	17.59
321	肺炎	7	28	24.74	8	14	12.34	A40-A41	敗血症	9	19	16.71
038	敗血症	11	7	6.19	10	10	8.81	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	10	19	16.71
	其他		146	129.03		146	128.65		其他		124	109.06

註： 年中人口數 113,155 113,487 113,694

表51-10・臺北市內湖區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		707	324.24		782	350.67		828	361.55		867	369.47		906	375.94		845	341.95
08-14	惡性腫瘤	1	185	84.84	1	198	88.79	1	229	99.99	1	235	100.14	1	256	106.23	1	232	93.88
25-27-28*	心臟疾病	2	82	37.61	2	84	37.67	2	84	36.68	3	91	38.78	2	99	41.08	2	102	41.28
29	腦血管疾病	3	61	27.98	3	71	31.84	3	83	36.24	2	108	46.02	3	87	36.10	3	87	35.21
181	糖尿病	5	25	11.47	5	41	18.39	5	43	18.78	4	58	24.72	5	42	17.43	4	69	27.92
321	肺炎	10	14	6.42	8	24	10.76	9	22	9.61	10	13	5.54	9	25	10.37	11	13	5.26
E54	自殺	8	19	8.71	7	26	11.66	7	24	10.48	9	15	6.39	8	29	12.03	8	18	7.28
E47-E53	事故傷害	4	59	27.06	4	56	25.11	4	58	25.33	5	46	19.60	4	68	28.22	5	47	19.02
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	21	9.63	10	20	8.97	10	18	7.86	8	23	9.80	7	31	12.86	7	27	10.93
347	慢性肝病及肝硬化	6	23	10.55	6	30	13.45	6	28	12.23	6	31	13.21	6	32	13.28	6	33	13.35
26	高血壓性疾病	9	17	7.80	11	16	7.17	8	23	10.04	7	24	10.23	10	19	7.88	9	16	6.47
	其他		201	92.18		216	96.86		216	94.32		223	95.03		218	90.46		201	81.34

註： 年中人口數 218,050 223,003 229,014 234,660 240,996 247,115

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-10・臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		969	385.16		976	384.17		976	380.41		1,010	389.66		1,097	421.12		1,048	400.74	
08-14	惡性腫瘤	1	269	106.92	1	293	115.33	1	342	133.30	1	302	116.51	1	314	120.54	1	306	117.01	
25-27-28*	心臟疾病	3	112	44.52	2	90	35.43	2	90	35.08	2	121	46.68	2	160	61.42	2	115	43.97	
29	腦血管疾病	2	114	45.31	3	88	34.64	2	90	35.08	3	91	35.11	3	90	34.55	3	107	40.91	
181	糖尿病	4	78	31.00	4	71	27.95	4	57	22.22	4	60	23.15	4	65	24.95	4	74	28.30	
321	肺炎	7	29	11.53	8	29	11.41	9	15	5.85	9	26	10.03	8	31	11.90	9	35	13.38	
E54	自殺	9	19	7.55	9	23	9.05	6	32	12.47	7	36	13.89	6	39	14.97	6	39	14.91	
E47-E53	事故傷害	5	56	22.26	5	50	19.68	5	48	18.71	5	47	18.13	5	52	19.96	8	36	13.77	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	25	9.94	7	36	14.17	7	31	12.08	6	40	15.43	7	33	12.67	7	39	14.91	
347	慢性肝病及肝硬化	6	31	12.32	6	38	14.96	8	30	11.69	8	31	11.96	9	28	10.75	5	41	15.68	
26	高血壓性疾病	12	7	2.78	10	17	6.69	10	11	4.29	14	5	1.93	11	11	4.22	10	23	8.79	
	其他		229	91.02		241	94.86		230	89.65		251	96.84		274	105.18		233	89.09	
註：	年中人口數		251,586			254,052			256,566			259,200			260,495			261,519		

表51-10・臺北市內湖區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,044	396.61		1,107	417.62	A00-Y98	所有死亡原因		1,183	444.46
08-14	惡性腫瘤	1	357	135.62	1	373	140.72	C00-C97	惡性腫瘤	1	366	137.51
25-27-28*	心臟疾病	2	105	39.89	2	134	50.55	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	153	57.48
29	腦血管疾病	3	104	39.51	3	96	36.22	I60-I69	腦血管疾病	3	101	37.95
181	糖尿病	4	60	22.79	4	73	27.54	E10-E14	糖尿病	4	68	25.55
321	肺炎	7	37	14.06	5	51	19.24	J12-J18	肺炎	5	63	23.67
E54	自殺	5	43	16.34	6	34	12.83	A40-A41	敗血症	6	42	15.78
E47-E53	事故傷害	8	35	13.30	6	34	12.83	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	7	38	14.28
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	42	15.96	8	33	12.45	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	8	33	12.40
347	慢性肝病及肝硬化	9	34	12.92	9	30	11.32	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	9	33	12.40
26	高血壓性疾病	10	14	5.32	10	15	5.66	I10-I15	高血壓性疾病	10	28	10.52
	其他		213	80.92		234	88.28		其他		258	96.93

註： 年中人口數 263,231 265,071 266,163

表51-11・臺北市士林區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,160	388.25		1,192	399.07		1,271	428.91		1,246	423.71		1,241	420.29		1,288	435.12
08-14	惡性腫瘤	1	323	108.11	1	322	107.80	1	383	129.25	1	388	131.94	1	389	131.74	1	371	125.33
25-27-28*	心臟疾病	2	139	46.52	3	129	43.19	2	157	52.98	2	152	51.69	2	143	48.43	2	160	54.05
29	腦血管疾病	2	139	46.52	2	163	54.57	3	150	50.62	2	152	51.69	3	134	45.38	3	127	42.90
181	糖尿病	5	61	20.42	5	65	21.76	5	51	17.21	5	59	20.06	5	70	23.71	4	83	28.04
321	肺炎	8	25	8.37	7	40	13.39	10	25	8.44	10	22	7.48	6	34	11.51	8	40	13.51
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	7	29	9.71	8	37	12.39	9	27	9.11	6	35	11.90	6	34	11.51	7	41	13.85
E47-E53	事故傷害	4	95	31.80	4	85	28.46	4	71	23.96	4	77	26.18	4	72	24.38	5	50	16.89
E54	自殺	11	13	4.35	9	26	8.70	7	40	13.50	8	27	9.18	9	19	6.43	9	31	10.47
347	慢性肝病及肝硬化	6	35	11.71	6	41	13.73	6	44	14.85	7	31	10.54	8	30	10.16	6	45	15.20
038	敗血症	13	6	2.01	13	8	2.68	13	13	4.39	11	18	6.12	14	9	3.05	14	10	3.38
	其他		295	98.74		276	92.40		310	104.61		285	96.92		307	103.97		330	111.48

註： 年中人口數 298,773 298,691 296,330 294,068 295,270 296,010

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-11・臺北市士林區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
01-56	所有死亡原因		1,363	462.31		1,406	479.42		1,371	469.85		1,519	523.17		1,462	505.78		1,588	550.74	
08-14	惡性腫瘤	1	408	138.39	1	424	144.58	1	461	157.99	1	433	149.13	1	476	164.67	1	456	158.15	
25-27-28*	心臟疾病	3	131	44.43	3	139	47.40	2	132	45.24	2	187	64.41	2	161	55.70	2	171	59.31	
29	腦血管疾病	2	161	54.61	2	162	55.24	3	130	44.55	3	168	57.86	3	150	51.89	3	135	46.82	
181	糖尿病	4	114	38.67	4	104	35.46	4	93	31.87	4	108	37.20	4	107	37.02	4	105	36.42	
321	肺炎	7	40	13.57	9	29	9.89	7	39	13.37	5	63	21.70	7	42	14.53	5	77	26.70	
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	5	48	16.28	6	50	17.05	6	44	15.08	7	55	18.94	6	44	15.22	6	61	21.16	
E47-E53	事故傷害	5	48	16.28	5	61	20.80	5	46	15.76	6	56	19.29	5	63	21.79	8	43	14.91	
E54	自殺	9	27	9.16	7	43	14.66	9	32	10.97	9	35	12.05	8	30	10.38	7	49	16.99	
347	慢性肝病及肝硬化	7	40	13.57	8	39	13.30	8	34	11.65	8	40	13.78	9	24	8.30	9	36	12.49	
038	敗血症	15	7	2.37	11	12	4.09	12	12	4.11	12	12	4.13	10	13	4.50	10	19	6.59	
	其他		339	114.98		343	116.96		348	119.26		362	124.68		352	121.77		436	151.21	
註：	年中人口數		294,826			293,270			291,794			290,344			289,058			288,337		

表51-11・臺北市士林區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,527	530.24		1,569	545.49	A00-Y98	所有死亡原因		1,652	576.50
08-14	惡性腫瘤	1	489	169.80	1	533	185.31	C00-C97	惡性腫瘤	1	475	165.76
25-27-28*	心臟疾病	2	171	59.38	2	162	56.32	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	231	80.61
29	腦血管疾病	3	107	37.16	3	137	47.63	I60-I69	腦血管疾病	3	129	45.02
181	糖尿病	4	105	36.46	4	107	37.20	J12-J18	肺炎	4	97	33.85
321	肺炎	5	71	24.65	5	76	26.42	E10-E14	糖尿病	5	75	26.17
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	53	18.40	6	60	20.86	A40-A41	敗血症	6	59	20.59
E47-E53	事故傷害	7	45	15.63	7	43	14.95	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	7	53	18.50
E54	自殺	8	43	14.93	8	38	13.21	V01-X59, Y85-Y86	意外事故	8	49	17.10
347	慢性肝病及肝硬化	9	30	10.42	9	31	10.78	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	9	46	16.05
038	敗血症	11	18	6.25	10	19	6.61	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	10	46	16.05
	其他		395	137.16		363	126.20		其他		392	136.80
註：	年中人口數		287,983			287,630					286,557	

表51-12・臺北市北投區歷年主要死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
01-56	所有死亡原因		1,045	431.14		1,078	443.77		1,121	462.90		1,082	447.47		1,132	464.00		1,191	483.28
08-14	惡性腫瘤	1	277	114.28	1	277	114.03	1	316	130.49	1	307	126.96	1	326	133.63	1	344	139.59
25-27-28*	心臟疾病	2	128	52.81	3	100	41.17	2	132	54.51	3	120	49.63	3	87	35.66	2	136	55.19
29	腦血管疾病	3	117	48.27	2	119	48.99	3	127	52.44	2	137	56.66	2	141	57.80	3	103	41.79
181	糖尿病	5	43	17.74	5	51	20.99	5	67	27.67	4	76	31.43	5	56	22.95	4	79	32.06
321	肺炎	7	24	9.90	7	36	14.82	7	40	16.52	10	23	9.51	8	28	11.48	6	46	18.67
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	8	22	9.08	7	36	14.82	6	42	17.34	6	40	16.54	7	32	13.12	7	38	15.42
347	慢性肝病及肝硬化	6	35	14.44	6	46	18.94	8	36	14.87	8	25	10.34	6	36	14.76	8	29	11.77
E47-E53	事故傷害	4	107	44.15	4	84	34.58	4	73	30.14	5	64	26.47	4	73	29.92	5	75	30.43
E54	自殺	11	14	5.78	10	18	7.41	11	14	5.78	8	25	10.34	12	17	6.97	9	24	9.74
038	敗血症	13	8	3.30	14	12	4.94	11	14	5.78	14	9	3.72	13	13	5.33	12	14	5.68
	其他		270	111.39		299	123.09		260	107.36		256	105.87		323	132.40		303	122.95

註： 年中人口數 242,382 242,918 242,168 241,802 243,964 246,442

附註：83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表51-12・臺北市北投區歷年主要死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,187	479.40		1,286	518.20		1,286	517.49		1,345	540.00		1,317	528.90		1,400	563.46
08-14	惡性腫瘤	1	357	144.18	1	399	160.78	1	356	143.25	1	392	157.38	1	375	150.60	1	399	160.59
25-27-28*	心臟疾病	2	117	47.25	3	123	49.56	3	126	50.70	2	162	65.04	2	163	65.46	2	168	67.62
29	腦血管疾病	2	117	47.25	2	154	62.06	2	131	52.71	3	154	61.83	3	127	51.00	3	137	55.14
181	糖尿病	4	93	37.56	4	86	34.65	4	92	37.02	4	92	36.94	4	83	33.33	4	108	43.47
321	肺炎	8	27	10.90	7	32	12.89	7	45	18.11	5	55	22.08	6	48	19.28	7	47	18.92
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	42	16.96	6	49	19.74	6	54	21.73	6	50	20.07	7	46	18.47	5	63	25.36
347	慢性肝病及肝硬化	7	31	12.52	8	20	8.06	8	35	14.08	8	32	12.85	8	32	12.85	9	29	11.67
E47-E53	事故傷害	5	56	22.62	5	53	21.36	5	75	30.18	7	35	14.05	5	54	21.69	8	45	18.11
E54	自殺	9	25	10.10	8	20	8.06	9	29	11.67	8	32	12.85	8	32	12.85	6	55	22.14
038	敗血症	14	8	3.23	10	18	7.25	11	16	6.44	13	8	3.21	12	9	3.61	10	15	6.04
	其他		314	126.82		332	133.78		327	131.58		333	133.70		348	139.75		334	134.43
註：	年中人口數	247,603			248,166			248,510			249,072			249,009			248,464		

表51-12・臺北市北投區歷年主要死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
01-56	所有死亡原因		1,395	560.68		1,433	573.60	A00-Y98	所有死亡原因		1,537	615.13
08-14	惡性腫瘤	1	401	161.17	1	463	185.33	C00-C97	惡性腫瘤	1	464	185.70
25-27-28*	心臟疾病	2	175	70.34	2	158	63.24	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	194	77.64
29	腦血管疾病	3	132	53.05	3	138	55.24	I60-I69	腦血管疾病	3	132	52.83
181	糖尿病	4	95	38.18	4	91	36.43	J12-J18	肺炎	4	92	36.82
321	肺炎	5	68	27.33	5	72	28.82	E10-E14	糖尿病	5	66	26.41
350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	54	21.70	6	48	19.21	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病徵候群及腎病變	6	52	20.81
347	慢性肝病及肝硬化	9	32	12.86	7	45	18.01	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	51	20.41
E47-E53	事故傷害	8	37	14.87	8	40	16.01	A40-A41	敗血症	8	45	18.01
E54	自殺	7	42	16.88	9	29	11.61	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	9	43	17.21
038	敗血症	10	18	7.23	10	18	7.21	I10-I15	高血壓性疾病	10	38	15.21
	其他		341	137.24		331	132.49		其他		360	144.08
註：年中人口數			248,464			249,825					249,864	

表52-1・臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		227	106.43		224	105.52		254	120.67		256	123.15		261	126.08		249	119.77
162	肺癌	1	64	30.01	1	38	17.90	2	33	15.68	1	55	26.46	1	55	26.57	1	49	23.57
155	肝癌	2	24	11.25	2	34	16.02	1	41	19.48	2	44	21.17	2	45	21.74	2	41	19.72
153 154	結腸直腸癌	5	22	10.31	2	34	16.02	3	31	14.73	4	25	12.03	3	28	13.53	3	32	15.39
174	女性乳癌(1)	4	12	11.03	4	9	8.30	4	15	13.92	5	11	10.32	4	14	13.17	5	10	9.35
185	攝護腺癌(2)	17	1	0.96	11	3	2.89	6	7	6.81	17	1	0.99	6	9	8.94	6	9	8.92
179 180	子宮頸癌(1)	6	10	9.20	7	6	5.53	10	5	4.64	16	2	1.88	7	6	5.64	8	7	6.54
151	胃癌	2	24	11.25	5	16	7.54	5	27	12.83	3	36	17.32	5	22	10.63	4	26	12.51
200 202 203	非何杰金淋巴瘤	8	7	3.28	10	7	3.30	7	11	5.23	7	13	6.25	9	11	5.31	7	14	6.73
157	胰臟癌	8	7	3.28	9	8	3.77	7	11	5.23	6	15	7.22	10	10	4.83	9	8	3.85
204-208	白血病	10	5	2.34	14	5	2.36	12	9	4.28	8	7	3.37	14	5	2.42	10	7	3.37
	其他		51	23.91		64	30.15		64	17.84		47	22.61		56	27.05		46	22.13

註： 年中人口數 213,293 212,280 210,498 207,878 207,010 207,906

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-1・臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		309	148.95		299	145.03		280	136.48		307	149.43		304	147.73		313	151.18
162	肺癌	1	59	28.44	1	71	34.44	1	74	36.07	1	66	32.13	1	76	36.93	1	66	31.88
155	肝癌	2	51	24.58	2	40	19.40	2	41	19.98	3	45	21.90	4	37	17.98	2	51	24.63
153 154	結腸直腸癌	3	36	17.35	4	33	16.01	3	32	15.60	4	38	18.50	3	40	19.44	3	42	20.29
174	女性乳癌(1)	6	10	9.35	3	19	17.85	4	16	15.08	2	27	25.37	2	21	19.65	4	17	15.77
185	攝護腺癌(2)	4	16	15.91	6	9	9.03	6	7	7.07	6	11	11.11	7	8	8.09	5	10	10.08
179 180	子宮頸癌(1)	7	8	7.48	8	8	7.52	8	5	4.71	9	5	4.70	22	1	0.94	15	3	2.78
151	胃癌	5	29	13.98	5	28	13.58	5	25	12.19	5	23	11.20	5	19	9.23	7	15	7.25
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	8	3.86	9	12	5.82	9	9	4.39	7	11	5.35	5	19	9.23	6	15	7.25
157	胰臟癌	10	8	3.86	7	16	7.76	7	10	4.87	7	11	5.35	9	10	4.86	8	12	5.80
204-208	白血病	10	8	3.86	11	7	3.40	12	6	2.92	13	7	3.41	13	6	2.92	18	2	0.97
	其他		76	36.63		56	10.23		55	26.81		63	30.67		67	32.56		80	38.64
註：	年中人口數	207,459			206,167			205,160			205,441			205,778			207,032		

表52-1・臺北市松山區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		345	165.26		332	157.94	C00-C97	所有癌症死亡原因		306	145.34
162	肺癌	1	61	29.22	1	86	40.91	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	63	29.92
155	肝癌	2	50	23.95	2	44	20.93	C22	肝和肝內膽管癌	2	44	20.90
153 154	結腸直腸癌	3	43	20.60	3	40	19.03	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	36	17.10
174	女性乳癌(1)	4	20	18.34	4	18	16.34	C50	女性乳房癌(1)	4	16	14.47
185	攝護腺癌(2)	6	14	14.04	5	11	11.00	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	14.00
179 180	子宮頸癌(1)	14	4	3.67	6	12	10.89	C16	胃癌	6	22	10.45
151	胃癌	5	34	16.29	7	21	9.99	C25	胰臟癌	7	20	9.50
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	17	8.14	8	20	9.51	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	12	5.70
157	胰臟癌	8	17	8.14	9	16	7.61	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	6	5.43
204-208	白血病	12	9	4.31	10	12	5.71	C91-C95	白血病	10	9	4.27
	其他		76	36.41		52	24.74		其他		64	30.40
註： 年中人口數			208,762			210,204					210,542	

表52-2・臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		285	115.81		303	123.50		306	126.45		327	136.22		371	153.82		343	141.61
162	肺癌	1	57	23.16	1	65	26.49	1	62	25.62	1	60	24.99	1	86	35.66	1	83	34.27
155	肝癌	2	49	19.91	2	56	22.82	2	49	20.25	2	51	21.25	2	53	21.97	2	55	22.71
153 154	結腸直腸癌	6	19	7.72	3	30	12.23	3	38	15.70	4	38	15.83	4	38	15.75	3	39	16.10
174	女性乳癌(1)	4	12	9.94	6	8	6.62	5	11	9.20	3	20	16.83	6	10	8.35	4	18	14.90
185	攝護腺癌(2)	5	11	8.77	15	3	2.41	6	8	6.53	7	8	6.60	13	6	4.94	7	10	8.23
151	胃癌	3	34	13.82	4	25	10.19	4	24	9.92	5	34	14.16	3	39	16.17	5	29	11.97
200202203	非何杰金淋巴瘤	12	8	3.25	7	10	4.08	10	10	4.13	10	10	4.17	8	13	5.39	10	10	4.13
156	膽囊癌	15	5	2.03	9	9	3.67	13	8	3.31	15	6	2.50	11	12	4.98	10	10	4.13
157	胰臟癌	18	4	1.63	7	10	4.08	17	5	2.07	15	6	2.50	8	13	5.39	8	14	5.78
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	13	7	2.84	11	8	3.26	9	11	4.55	8	13	5.42	16	5	2.07	9	11	4.54
	其他		79	32.10		79	32.20		80	33.06		81	33.74		96	39.80		64	26.42

註： 年中人口數 246,090 245,352 241,996 240,050 241,194 242,208

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-2・臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		351	145.58		410	171.61		383	161.30		367	155.52		373	159.71		430	185.63	
162	肺癌	1	85	35.25	1	78	32.65	1	86	36.22	1	78	33.05	1	71	30.40	1	81	34.97	
155	肝癌	3	44	18.25	2	71	29.72	2	58	24.43	2	52	22.04	2	66	28.26	2	63	27.20	
153 154	結腸直腸癌	2	54	22.40	3	45	18.84	3	45	18.95	4	38	16.10	3	41	17.56	5	51	22.02	
174	女性乳癌(1)	5	12	9.95	5	20	16.70	4	19	15.92	3	23	19.33	7	9	7.62	3	28	23.80	
185	攝護腺癌(2)	6	7	5.81	6	14	11.75	6	17	14.40	7	9	7.69	5	12	10.40	6	12	10.53	
151	胃癌	4	33	13.69	4	40	16.74	5	37	15.58	5	30	12.71	4	29	12.42	4	52	22.45	
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	13	5.39	13	9	3.77	13	8	3.37	9	15	6.36	6	19	8.14	7	24	10.36	
156	膽囊癌	10	10	4.15	9	13	5.44	13	8	3.37	13	9	3.81	12	10	4.28	15	7	3.02	
157	胰臟癌	8	12	4.98	10	12	5.02	9	11	4.63	6	19	8.05	9	15	6.42	8	17	7.34	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	9	3.73	12	10	4.19	17	5	2.11	12	11	4.66	10	12	5.14	9	14	6.04	
	其他		72	29.86		98	41.02		89	37.48		83	35.17		89	38.11		81	34.97	
註：	年中人口數		241,106			238,912			237,446			235,976			233,548			231,643		

表52-2・臺北市信義區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		401	173.50		427	185.51	C00-C97	所有癌症死亡原因		397	173.88
162	肺癌	1	84	36.34	1	103	44.75	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	79	34.60
155	肝癌	2	55	23.80	2	54	23.46	C22	肝和肝內膽管癌	2	62	27.15
153 154	結腸直腸癌	3	50	21.63	3	48	20.85	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	21.02
174	女性乳癌(1)	4	21	17.81	4	24	20.35	C50	女性乳房癌(1)	4	23	19.59
185	攝護腺癌(2)	6	11	9.71	5	17	15.14	C16	胃癌	5	27	11.83
151	胃癌	5	38	16.44	6	30	13.03	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	11	9.92
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	14	6.06	7	21	9.12	C25	胰臟癌	7	22	9.64
156	膽囊癌	9	15	6.49	8	18	7.82	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	10	8.52
157	胰臟癌	7	18	7.79	9	16	6.95	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	15	6.57
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	18	7.79	10	12	5.21	C91-C95	白血病	10	11	4.82
	其他		77	33.31		84	36.49		其他		89	38.98
註：年中人口數		231,128			230,172			228,319				

表52-3・臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		387	114.96		410	122.97		455	140.71		444	140.64		410	129.50		438	137.71
162	肺癌	1	74	21.98	1	85	25.49	1	95	29.38	1	91	28.82	1	80	25.27	1	95	29.87
153 154	結腸直腸癌	4	33	9.80	4	45	13.50	3	55	17.01	3	53	16.79	2	62	19.58	3	52	16.35
155	肝癌	2	56	16.63	2	72	21.59	2	66	20.41	2	70	22.17	3	51	16.11	2	62	19.49
174	女性乳癌(1)	5	16	9.38	3	24	14.17	4	25	15.20	4	26	16.15	4	23	14.19	4	24	14.67
151	胃癌	3	42	12.48	5	34	10.20	5	47	14.53	5	42	13.30	5	40	12.63	5	45	14.15
185	攝護腺癌(2)	7	10	6.02	7	10	6.09	8	10	6.29	7	15	9.70	7	12	7.77	7	12	7.77
183	卵巢癌(1)	25	1	0.59	8	8	4.72	13	5	3.04	9	7	4.35	17	2	1.23	11	5	3.06
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	18	5.35	9	13	3.90	7	25	7.73	8	22	6.97	8	17	5.37	8	22	6.92
179 180	子宮頸癌(1)	6	12	7.03	6	11	6.50	6	18	10.95	6	20	12.42	6	14	8.63	6	14	8.56
156	膽囊癌	12	12	3.56	20	3	0.90	10	12	3.71	13	7	2.22	10	12	3.79	17	6	1.89
	其他		113	33.57		105	31.49		97	30.00		91	28.82		97	30.64		101	31.76

註： 年中人口數 336,651 333,412 323,358 315,709 316,610 318,056

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-3・臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		409	129.00		481	152.02		514	162.78		488	155.23		527	168.49		501	160.39
162	肺癌	1	78	24.60	1	116	36.66	1	107	33.89	1	97	30.86	1	113	36.13	1	105	33.62
153 154	結腸直腸癌	2	63	19.87	3	51	16.12	4	54	17.10	4	55	17.50	2	77	24.62	3	64	20.49
155	肝癌	3	61	19.24	2	65	20.54	2	90	28.50	2	71	22.59	3	69	22.06	2	73	23.37
174	女性乳癌(1)	4	21	12.83	4	25	15.27	3	30	18.32	3	33	20.20	4	26	15.96	4	30	18.39
151	胃癌	5	29	9.15	6	34	10.75	5	39	12.35	6	32	10.18	6	39	12.47	5	46	14.73
185	攝護腺癌(2)	7	12	7.82	5	22	14.41	6	17	11.18	5	17	11.26	5	22	14.67	6	18	12.06
183	卵巢癌(1)	9	7	4.28	12	6	3.67	12	6	3.66	10	8	4.90	7	11	6.75	12	7	4.29
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	19	5.99	9	19	6.01	7	29	9.18	7	31	9.86	13	13	4.16	9	17	5.44
179 180	子宮頸癌(1)	9	7	4.28	10	8	4.89	9	11	6.72	8	15	9.18	8	10	6.14	8	9	5.52
156	膽囊癌	12	12	3.78	11	14	4.42	11	14	4.43	13	11	3.50	11	15	4.80	10	15	4.80
	其他		100	31.61		121	38.17		117	37.05		118	37.54		132	42.20		117	37.46
註：	年中人口數			316,398			317,044			315,766			314,362			312,782			312,360

表52-3・臺北市大安區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		495	158.06		473	150.37	C00-C97	所有癌症死亡原因		501	159.36
162	肺癌	1	110	35.12	1	96	30.52	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	105	33.40
153 154	結腸直腸癌	3	58	18.52	2	66	20.98	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	75	23.86
155	肝癌	2	84	26.82	3	64	20.35	C22	肝和肝內膽管癌	3	68	21.63
174	女性乳癌(1)	6	19	11.59	4	20	12.11	C50	女性乳房癌(1)	4	24	14.50
151	胃癌	4	42	13.41	5	37	11.76	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	18	12.10
185	攝護腺癌(2)	5	19	12.74	6	16	10.71	C16	胃癌	6	30	9.54
183	卵巢癌(1)	7	12	7.32	7	14	8.48	C25	胰臟癌	7	23	7.32
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	20	6.39	8	26	8.27	C67	膀胱癌	8	15	4.77
179 180	子宮頸癌(1)	10	8	4.88	9	12	7.27	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	14	4.45
156	膽囊癌	11	12	3.83	10	22	6.99	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	12	3.82
	其他		111	35.44		100	31.79		其他		117	37.22
註： 年中人口數			313,169			314,548					314,386	

表52-4・臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		249	109.85		289	128.97		281	128.44		323	150.86		302	141.32		293	136.34
162	肺癌	1	43	18.97	1	50	22.31	1	53	24.22	2	54	25.22	2	51	23.86	1	66	30.71
155	肝癌	1	43	18.97	2	42	18.74	1	53	24.22	1	60	28.02	1	54	25.27	2	41	19.08
153 154	結腸直腸癌	5	24	10.59	4	37	16.51	4	24	10.97	3	39	18.22	3	34	15.91	3	36	16.75
151	胃癌	4	28	12.35	5	26	11.60	3	35	16.00	6	25	11.68	5	26	12.17	5	21	9.77
174	女性乳癌(1)	6	9	7.83	6	11	9.68	5	11	9.91	4	19	17.45	4	15	13.74	4	11	9.99
200202203	非何杰金淋巴瘤	14	5	2.21	10	10	4.46	11	8	3.66	7	16	7.47	7	19	8.89	9	9	4.19
157	胰臟癌	17	4	1.76	11	9	4.02	7	11	5.03	11	10	4.67	16	5	2.34	6	16	7.44
150	食道癌	7	11	4.85	12	6	2.68	15	6	2.74	9	12	5.60	15	6	2.81	11	7	3.26
156	膽囊癌	14	5	2.21	12	6	2.68	11	8	3.66	13	9	4.20	9	10	4.68	11	7	3.26
185	攝護腺癌(2)	8	5	4.48	8	6	5.43	10	4	3.71	14	3	2.85	8	6	5.74	8	7	6.68
	其他		72	31.76		86	38.38		68	31.08		76	35.50		76	35.56		72	33.50

註： 年中人口數 226,670 224,076 218,782 214,109 213,703 214,910

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-4・臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		325	151.10		349	161.73		359	165.59		354	162.92		370	170.56		374	172.44
162	肺癌	1	50	23.25	1	77	35.68	2	77	35.52	1	76	34.98	1	70	32.27	1	80	36.89
155	肝癌	3	45	20.92	2	65	30.12	1	80	36.90	2	73	33.60	2	64	29.50	3	46	21.21
153 154	結腸直腸癌	2	48	22.32	3	42	19.46	4	32	14.76	3	33	15.19	4	45	20.74	2	56	25.82
151	胃癌	5	27	12.55	7	19	8.80	5	30	13.84	5	29	13.35	5	24	11.06	5	29	13.37
174	女性乳癌(1)	4	20	18.09	4	14	12.58	3	17	15.16	4	16	14.21	3	29	25.77	4	21	18.63
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	10	4.65	12	9	4.17	7	12	5.53	11	11	5.06	13	7	3.23	7	19	8.76
157	胰臟癌	16	5	2.32	11	10	4.63	7	12	5.53	12	8	3.68	6	19	8.76	9	14	6.45
150	食道癌	13	8	3.72	8	12	5.56	12	7	3.23	16	5	2.30	10	12	5.53	10	12	5.53
156	膽囊癌	9	10	4.65	8	12	5.56	10	11	5.07	13	7	3.22	10	12	5.53	12	7	3.23
185	攝護腺癌(2)	6	9	8.61	5	11	10.53	14	3	2.87	6	12	11.46	8	7	6.71	6	11	10.56
	其他		93	43.24		78	36.15		78	35.98		84	38.66		81	37.34		79	36.42
註：	年中人口數			215,092			215,788			216,806			217,284			216,934			216,887

表52-4・臺北市中山區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		351	160.83		384	175.32	C00-C97	所有癌症死亡原因		382	174.70
162	肺癌	1	62	28.41	1	84	38.35	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	71	32.47
155	肝癌	2	61	27.95	2	64	29.22	C22	肝和肝內膽管癌	2	62	28.35
153 154	結腸直腸癌	3	43	19.70	3	41	18.72	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	23.78
151	胃癌	5	26	11.91	4	37	16.89	C16	胃癌	4	33	15.09
174	女性乳癌(1)	4	19	16.70	5	14	12.21	C50	女性乳房癌(1)	5	14	12.19
200202203	非何杰金淋巴瘤	6	21	9.62	6	20	9.13	C91-C95	白血病	6	17	7.77
157	胰臟癌	7	16	7.33	7	18	8.22	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	7	8	7.71
150	食道癌	10	13	5.96	8	15	6.85	C25	胰臟癌	8	14	6.40
156	膽囊癌	12	10	4.58	9	14	6.39	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	12	5.49
185	攝護腺癌(2)	9	7	6.70	10	5	4.79	C56	卵巢癌(1)	10	6	5.22
	其他		73	33.45		72	32.87		其他		93	42.53
註：年中人口數			218,244			219,033					218,662	

表52-5・臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		213	121.73		244	141.22		210	124.35		242	145.85		227	136.96		247	148.86
162	肺癌	1	44	25.15	1	48	27.78	1	38	22.50	1	56	33.75	1	61	36.80	1	47	28.33
153 154	結腸直腸癌	5	15	8.57	4	30	17.36	4	30	17.76	4	24	14.46	4	23	13.88	3	32	19.29
155	肝癌	2	42	24.00	2	41	23.73	2	32	18.95	2	42	25.31	2	39	23.53	2	38	22.90
179 180	子宮頸癌(1)	6	5	5.77	5	7	8.17	5	10	11.93	5	11	13.32	6	6	7.24	6	6	7.20
151	胃癌	3	20	11.43	3	34	19.68	3	31	18.36	6	17	10.25	5	17	10.26	4	27	16.27
200202203	非何杰金淋巴瘤	14	4	2.29	17	3	1.74	7	10	5.92	8	10	6.03	11	5	3.02	11	8	4.82
150	食道癌	14	4	2.29	11	6	3.47	16	2	1.18	14	5	3.01	9	6	3.62	15	5	3.01
157	胰臟癌	8	9	5.14	9	8	4.63	14	4	2.37	10	8	4.82	7	8	4.83	8	9	5.42
174	女性乳癌(1)	4	9	10.39	6	6	7.00	6	8	9.54	3	15	18.16	3	13	15.68	5	8	9.60
204-208	白血病	12	5	2.86	12	5	2.89	11	5	2.96	11	7	4.22	9	6	3.62	11	8	4.82
	其他		56	32.00		56	32.41		40	23.69		47	28.33		43	25.94		59	35.56

註： 年中人口數 174,984 172,780 168,872 165,924 165,744 165,928

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-5・臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		275	167.47		267	164.45		288	178.08		245	152.45		245	154.05		282	178.58
162	肺癌	1	57	34.71	1	60	36.95	1	47	29.06	1	59	36.71	1	53	33.32	1	53	33.56
153 154	結腸直腸癌	3	32	19.49	3	28	17.25	3	37	22.88	3	29	18.05	2	41	25.78	4	32	20.26
155	肝癌	2	46	28.01	2	37	22.79	2	38	23.50	2	32	19.91	3	34	21.38	3	34	21.53
179 180	子宮頸癌(1)	5	9	10.89	9	5	6.10	6	11	13.43	11	4	4.90	9	5	6.17	18	2	2.48
151	胃癌	4	24	14.62	3	28	17.25	4	29	17.93	5	20	12.45	4	21	13.20	5	25	15.83
200202203	非何杰金淋巴瘤	14	5	3.04	7	12	7.39	9	12	7.42	7	9	5.60	8	10	6.29	6	20	12.67
150	食道癌	9	10	6.09	11	7	4.31	12	8	4.95	7	9	5.60	12	6	3.77	10	9	5.70
157	胰臟癌	12	7	4.26	8	11	6.77	7	16	9.89	9	8	4.98	7	12	7.55	7	11	6.97
174	女性乳癌(1)	5	9	10.89	5	13	15.87	8	8	9.77	4	14	17.15	6	9	11.11	2	19	23.55
204-208	白血病	10	8	4.87	11	7	4.31	10	9	5.57	9	8	4.98	14	5	3.14	13	8	5.07
	其他		68	41.41		59	36.34		73	45.14		53	32.98		49	30.81		69	43.70
註：	年中人口數	164,207			162,362			161,722			160,704			159,042			157,911		

表52-5・臺北市中正區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		267	169.02		258	162.22	C00-C97	所有癌症死亡原因		303	190.07
162	肺癌	1	57	36.08	1	64	40.24	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	60	37.64
153 154	結腸直腸癌	3	31	19.62	2	39	24.52	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	47	29.48
155	肝癌	2	41	25.95	3	32	20.12	C22	肝和肝內膽管癌	3	33	20.70
179 180	子宮頸癌(1)	8	6	7.41	4	9	11.01	C50	女性乳房癌(1)	4	16	19.48
151	胃癌	5	20	12.66	5	12	7.55	C16	胃癌	5	29	18.19
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	13	8.23	6	11	6.92	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	11.65
150	食道癌	12	6	3.80	6	11	6.92	C56	卵巢癌(1)	7	6	7.30
157	胰臟癌	9	9	5.70	8	10	6.29	C91-C95	白血病	8	11	6.90
174	女性乳癌(1)	4	14	17.28	9	5	6.12	C25	胰臟癌	9	9	5.65
204-208	白血病	11	7	4.43	10	9	5.66	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	8	5.02
	其他		63	39.88		56	35.21		其他		75	47.05
註：	年中人口數		157,970			159,045					159,412	

表52-6・臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		173	123.97		230	168.33		194	144.09		232	173.24		204	152.11		223	166.38
162	肺癌	1	40	28.66	1	45	32.93	2	28	20.80	1	46	34.35	2	31	23.12	3	29	21.64
155	肝癌	2	34	24.36	2	39	28.54	1	47	34.91	2	41	30.61	1	42	31.32	1	49	36.56
153 154	結腸直腸癌	3	24	17.20	4	22	16.10	3	22	16.34	3	29	21.65	3	22	16.40	2	30	22.38
174	女性乳癌(1)	6	4	5.78	5	10	14.75	6	6	9.00	6	7	10.56	4	9	13.55	4	11	16.56
185	攝護腺癌(2)	20	1	1.42	12	3	4.36	12	3	4.41	17	1	1.48	-	-	-	11	3	4.44
179 180	子宮頸癌(1)	5	6	8.67	11	3	4.43	4	7	10.50	5	11	16.60	8	4	6.02	6	7	10.54
151	胃癌	4	16	11.47	3	30	21.96	5	14	10.40	4	27	20.16	5	17	12.68	5	18	13.43
157	胰臟癌	9	4	2.87	6	9	6.59	16	2	1.49	10	6	4.48	10	7	5.22	16	4	2.98
200 202 203	非何杰金淋巴瘤	14	2	1.43	6	9	6.59	10	6	4.46	9	9	6.72	10	7	5.22	12	5	3.73
150	食道癌	14	2	1.43	9	8	5.86	8	9	6.68	8	10	7.47	7	9	6.71	7	10	7.46
	其他		40	28.66		52	38.06		50	37.14		45	33.60		56	41.76		57	42.53

註： 年中人口數 139,546 136,634 134,640 133,922 134,112 134,033

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-6・臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		201	151.02		223	168.92		250	190.53		242	185.78		205	158.94		228	178.60
162	肺癌	1	39	29.30	1	41	31.06	1	60	45.73	1	52	39.92	1	40	31.01	1	41	32.12
155	肝癌	2	27	20.29	2	39	29.54	2	38	28.96	2	41	31.48	1	40	31.01	3	34	26.63
153 154	結腸直腸癌	3	20	15.03	5	20	15.15	3	33	25.15	3	31	23.80	3	26	20.16	4	29	22.72
174	女性乳癌(1)	5	7	10.59	3	13	19.80	4	12	18.39	5	9	13.87	5	7	10.87	2	18	28.19
185	攝護腺癌(2)	13	3	4.48	14	3	4.52	9	5	7.58	6	6	9.18	13	3	4.64	10	4	6.27
179 180	子宮頸癌(1)	5	7	10.59	6	7	10.66	6	5	7.66	7	5	7.71	9	3	4.66	11	3	4.70
151	胃癌	4	19	14.28	4	21	15.91	5	19	14.48	4	20	15.35	4	15	11.63	5	14	10.97
157	胰臟癌	7	12	9.02	11	6	4.54	10	8	6.10	14	5	3.84	7	8	6.20	13	5	3.92
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	6	4.51	11	6	4.54	10	8	6.10	8	10	7.68	7	8	6.20	7	11	8.62
150	食道癌	10	7	5.26	9	7	5.30	8	10	7.62	9	9	6.91	14	3	2.33	6	14	10.97
	其他		54	40.57		60	45.45		52	39.63		54	41.46		52	40.32		55	43.08

註：年中人口數 133,098 132,018 131,210 130,258 128,976 127,661

表52-6・臺北市大同區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		273	215.19		259	204.70	C00-C97	所有癌症死亡原因		267	212.93
162	肺癌	2	51	40.20	1	54	42.68	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	56	44.66
155	肝癌	1	57	44.93	2	40	31.61	C22	肝和肝內膽管癌	2	52	41.47
153 154	結腸直腸癌	3	30	23.65	3	35	27.66	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	35	27.91
174	女性乳癌(1)	4	13	20.44	4	14	22.02	C50	女性乳房癌(1)	4	16	25.32
185	攝護腺癌(2)	7	6	9.48	5	10	15.89	C16	胃癌	5	14	11.17
179 180	子宮頸癌(1)	10	5	7.86	6	8	12.58	C91-C95	白血病	6	9	7.18
151	胃癌	8	12	9.46	7	14	11.06	C15	食道癌	7	9	7.18
157	胰臟癌	6	13	10.25	8	12	9.48	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	8	8	6.38
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	9	7.09	9	9	7.11	C56	卵巢癌(1)	9	4	6.33
150	食道癌	9	11	8.67	10	8	6.32	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	7	5.58
	其他		66	52.02		55	43.47		其他		57	45.46
註： 年中人口數			126,867			126,526					125,391	

表52-7・臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		293	133.63		270	125.11		317	149.15		322	153.50		301	143.94		366	175.24
155	肝癌	2	48	21.89	1	50	23.17	2	53	24.94	2	57	27.17	2	62	29.65	2	61	29.21
162	肺癌	1	55	25.08	2	48	22.24	1	67	31.52	1	68	32.42	1	67	32.04	1	73	34.95
153 154	結腸直腸癌	3	37	16.87	4	26	12.05	4	38	17.88	3	32	15.25	5	26	12.43	3	44	21.07
174	女性乳癌(1)	4	17	15.91	6	8	7.60	6	10	9.66	6	7	6.85	3	16	15.68	4	20	19.58
151	胃癌	5	27	12.31	3	42	19.46	3	39	18.35	4	31	14.78	4	30	14.35	5	29	13.88
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	9	4.10	9	9	4.17	9	10	4.71	11	11	5.24	10	10	4.78	7	19	9.10
185	攝護腺癌(2)	19	2	1.78	8	5	4.52	7	7	6.42	10	6	5.58	17	2	1.87	12	5	4.69
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	6	15	6.84	7	12	5.56	16	3	1.41	7	14	6.67	7	12	5.74	13	9	4.31
150	食道癌	7	14	6.38	16	4	1.85	11	8	3.76	8	12	5.72	8	11	5.26	8	14	6.70
156	膽囊癌	10	10	4.56	10	6	2.78	14	4	1.88	13	9	4.29	10	10	4.78	9	12	5.75
	其他		59	26.91		60	27.80		78	36.70		75	35.75		55	26.30		80	38.30
註：	年中人口數	219,264			215,808			212,537			209,778			209,122			208,862		

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-7・臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		332	160.08		377	183.51		386	189.46		388	192.21		414	208.19		431	219.79
155	肝癌	2	48	23.14	2	65	31.64	2	69	33.87	1	79	39.14	2	71	35.70	2	55	28.05
162	肺癌	1	71	34.23	1	86	41.86	1	72	35.34	2	68	33.69	1	75	37.72	1	88	44.88
153 154	結腸直腸癌	3	41	19.77	3	47	22.88	3	48	23.56	3	37	18.33	3	47	23.64	3	42	21.42
174	女性乳癌(1)	5	10	9.85	5	14	13.91	5	15	15.01	4	16	16.14	5	15	15.35	4	19	19.68
151	胃癌	4	31	14.95	4	37	18.01	4	44	21.60	6	24	11.89	4	36	18.10	5	37	18.87
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	13	6.27	9	12	5.84	6	18	8.83	10	15	7.43	12	13	6.54	13	10	5.10
185	攝護腺癌(2)	7	7	6.61	8	7	6.68	11	6	5.78	9	9	8.76	8	10	9.89	7	12	12.05
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	10	4.82	7	18	8.76	9	14	6.87	8	19	9.41	7	20	10.06	6	27	13.77
150	食道癌	10	10	4.82	11	9	4.38	10	12	5.89	13	9	4.46	10	14	7.04	11	18	9.18
156	膽囊癌	12	9	4.34	11	9	4.38	12	11	5.40	11	14	6.94	15	7	3.52	9	22	11.22
	其他		82	39.54		73	35.53		77	37.79		98	48.55		106	53.30		101	51.51
註：	年中人口數			207,399			205,440			203,738			201,858			198,856			196,094

表52-7・臺北市萬華區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		427	219.19		458	236.48	C00-C97	所有癌症死亡原因		394	205.83
155	肝癌	2	72	36.96	1	94	48.54	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	91	47.54
162	肺癌	1	84	43.12	2	84	43.37	C22	肝和肝內膽管癌	2	76	39.70
153 154	結腸直腸癌	3	67	34.39	3	55	28.40	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	48	25.08
174	女性乳癌(1)	5	15	15.60	4	18	18.77	C16	胃癌	4	25	13.06
151	胃癌	4	32	16.43	5	35	18.07	C25	胰臟癌	5	20	10.45
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	10	5.13	6	24	12.39	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	10	10.37
185	攝護腺癌(2)	6	14	14.19	7	9	9.21	C50	女性乳房癌(1)	7	9	9.47
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	8	22	11.29	8	16	8.26	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	9	9.47
150	食道癌	15	6	3.08	9	16	8.26	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	9	11	5.75
156	膽囊癌	17	5	2.57	10	15	7.74	C67	膀胱癌	10	10	5.22
	其他		100	51.33		92	47.50		其他		85	44.41
註： 年中人口數			194,811			193,675				191,416		

表52-8・臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		223	99.82		274	121.59		282	123.23		279	119.91		305	127.27		312	126.69
162	肺癌	1	46	20.59	1	53	23.52	1	51	22.29	2	45	19.34	1	70	29.21	1	70	28.42
155	肝癌	3	25	11.19	2	51	22.63	2	48	20.97	1	55	23.64	2	46	19.19	2	46	18.68
153 154	結腸直腸癌	2	28	12.53	5	28	12.42	3	38	16.60	4	26	11.17	3	38	15.86	3	34	13.81
174	女性乳癌(1)	7	6	5.45	3	16	14.36	5	12	10.57	3	16	13.81	5	10	8.35	5	12	9.72
151	胃癌	4	20	8.95	4	29	12.87	4	27	11.80	5	25	10.74	4	26	10.85	6	23	9.34
185	攝護腺癌(2)	6	8	7.06	8	5	4.39	7	7	6.07	7	6	5.14	7	8	6.67	4	13	10.58
179 180	子宮頸癌(1)	5	9	8.18	6	9	8.08	13	3	2.64	6	11	9.49	5	10	8.35	7	11	8.91
157	胰臟癌	9	9	4.03	10	7	3.11	8	11	4.81	10	10	4.30	15	6	2.50	9	13	5.28
183	卵巢癌(1)	18	1	0.91	9	4	3.59	17	2	1.76	18	1	0.86	18	2	1.67	11	6	4.86
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	9	9	4.03	10	7	3.11	10	10	4.37	8	11	4.73	11	7	2.92	12	9	3.65
	其他		62	27.75		65	28.84		73	31.90		73	31.37		82	34.22		75	30.45

註： 年中人口數 223,412 225,355 228,850 232,676 239,650 246,270

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-8・臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		336	133.94		365	143.97		373	146.15		307	119.68		406	157.81		384	148.55
162	肺癌	1	63	25.11	1	82	32.34	1	72	28.21	1	74	28.85	1	90	34.98	1	84	32.50
155	肝癌	2	57	22.72	2	59	23.27	3	50	19.59	3	38	14.81	2	63	24.49	3	43	16.63
153 154	結腸直腸癌	3	37	14.75	4	30	11.83	2	57	22.33	2	40	15.59	4	45	17.49	2	44	17.02
174	女性乳癌(1)	4	15	11.90	3	16	12.53	4	20	15.53	4	12	9.25	3	25	19.18	4	19	14.47
151	胃癌	5	22	8.77	5	28	11.04	5	34	13.32	6	17	6.63	6	24	9.33	5	36	13.93
185	攝護腺癌(2)	6	9	7.21	6	12	9.53	7	9	7.12	5	9	7.10	5	12	9.45	6	14	11.01
179 180	子宮頸癌(1)	14	5	3.97	7	12	9.40	6	10	7.77	7	8	6.17	9	8	6.14	10	7	5.33
157	胰臟癌	12	10	3.99	11	10	3.94	9	14	5.49	10	11	4.29	10	14	5.44	7	16	6.19
183	卵巢癌(1)	7	9	7.14	13	5	3.92	10	7	5.44	13	4	3.08	15	4	3.07	16	3	2.28
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	12	10	3.99	14	9	3.55	13	6	2.35	14	6	2.34	10	14	5.44	7	16	6.19
	其他		99	39.46		102	40.23		94	36.83		168	65.49		211	82.01		202	78.14
註：	年中人口數			250,866			253,526			255,224			256,517			257,276			258,500

表52-8・臺北市文山區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		411	157.96		411	157.15	C00-C97	所有癌症死亡原因		426	162.79
162	肺癌	1	88	33.82	1	85	32.50	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	99	37.83
155	肝癌	3	45	17.30	2	53	20.26	C22	肝和肝內膽管癌	2	64	24.46
153 154	結腸直腸癌	2	53	20.37	3	43	16.44	C50	女性乳房癌(1)	3	28	20.87
174	女性乳癌(1)	4	21	15.83	4	19	14.20	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	48	18.34
151	胃癌	5	34	13.07	5	33	12.62	C16	胃癌	5	21	8.02
185	攝護腺癌(2)	6	16	12.55	6	13	10.18	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	7.06
179 180	子宮頸癌(1)	12	6	4.52	7	11	8.22	C25	胰臟癌	7	18	6.88
157	胰臟癌	7	24	9.22	8	16	6.12	C15	食道癌	8	16	6.11
183	卵巢癌(1)	8	9	6.78	9	8	5.98	C56	卵巢癌(1)	9	7	5.22
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	9	16	6.15	10	15	5.74	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	10	12	4.59
	其他		203	78.02		215	82.20		其他		104	39.74
註：	年中人口數		260,185			261,542					261,693	

表52-9・臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		125	109.37		139	123.11		139	124.03		149	133.80		137	122.50		146	129.34
162	肺癌	1	32	28.00	1	28	24.80	1	31	27.66	1	33	29.63	1	34	30.40	1	30	26.58
155	肝癌	2	21	18.37	2	23	20.37	2	23	20.52	3	16	14.37	2	22	19.67	2	25	22.15
153 154	結腸直腸癌	3	13	11.37	5	12	10.63	5	11	9.82	5	14	12.57	4	13	11.62	6	13	11.52
151	胃癌	5	12	10.50	3	16	14.17	3	22	19.63	3	16	14.37	5	11	9.84	4	18	15.95
174	女性乳癌(1)	4	6	10.69	4	6	10.80	4	6	10.88	2	13	23.70	8	3	5.44	3	10	17.94
200202203	非何杰金淋巴瘤	12	2	1.75	8	6	5.31	8	6	5.35	10	5	4.49	9	5	4.47	8	7	6.20
185	攝護腺癌(2)	16	1	1.72	14	1	1.74	-	-	-	7	4	7.08	6	4	7.06	5	7	12.25
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	12	2	1.75	7	10	8.86	10	4	3.57	9	6	5.39	7	7	6.26	9	5	4.43
156	膽囊癌	11	3	2.62	10	4	3.54	14	2	1.78	17	1	0.90	13	3	2.68	18	1	0.89
179 180	子宮頸癌(1)	6	5	8.90	6	5	9.00	7	3	5.44	6	6	10.94	3	8	14.50	7	5	8.97
	其他		28	24.50		28	24.80		31	27.66		35	31.43		27	24.14		25	22.15

註： 年中人口數 114,294 112,912 112,072 111,358 111,840 112,884

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-9・臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		166	146.12		202	177.13		177	155.42		176	155.09		193	170.72		186	164.58
162	肺癌	1	31	27.29	2	40	35.08	1	44	38.63	2	33	29.08	2	36	31.84	2	34	30.08
155	肝癌	5	17	14.96	1	43	37.71	2	23	20.20	1	47	41.42	1	37	32.73	1	39	34.51
153 154	結腸直腸癌	4	19	16.72	3	21	18.41	3	18	15.81	3	13	11.46	6	17	15.04	3	22	19.47
151	胃癌	2	23	20.25	6	16	14.03	4	16	14.05	5	12	10.57	4	19	16.81	6	12	10.62
174	女性乳癌(1)	3	10	17.81	4	9	15.93	7	4	7.06	4	6	10.60	3	10	17.73	4	9	15.96
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	5	4.40	7	8	7.02	9	7	6.15	7	7	6.17	15	4	3.54	9	6	5.31
185	攝護腺癌(2)	7	5	8.70	8	4	6.95	17	1	1.75	-	-	-	11	3	5.30	7	4	7.07
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	5	4.40	9	6	5.26	9	7	6.15	7	7	6.17	8	8	7.08	12	5	4.42
156	膽囊癌	14	3	2.64	10	5	4.38	9	7	6.15	13	4	3.52	8	8	7.08	9	6	5.31
179 180	子宮頸癌(1)	6	7	12.47	5	8	14.16	5	5	8.83	6	4	7.07	5	9	15.96	5	7	12.41
	其他		41	36.09		42	36.83		45	39.51		43	37.89		42	37.15		42	37.16
註：	年中人口數			113,607			114,040			113,888			113,480			113,052			113,017

表52-9・臺北市南港區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死亡原因	97年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率			順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		206	182.05		195	171.83	C00-C97	所有癌症死亡原因		186	163.60
162	肺癌	2	33	29.16	1	41	36.13	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	36	31.66
155	肝癌	1	38	33.58	2	30	26.43	C50	女性乳房癌(1)	2	14	24.46
153 154	結腸直腸癌	3	24	21.21	3	24	21.15	C22	肝和肝內膽管癌	3	26	22.87
151	胃癌	4	19	16.79	4	15	13.22	C16	胃癌	4	26	22.87
174	女性乳癌(1)	5	8	14.14	5	7	12.30	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	5	21	18.47
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	8	7.07	6	11	9.69	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	4	7.09
185	攝護腺癌(2)	7	4	7.07	7	5	8.84	C91-C95	白血病	7	8	7.04
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	6	10	8.84	8	8	7.05	C15	食道癌	8	8	7.04
156	膽囊癌	11	5	4.42	8	8	7.05	C25	胰臟癌	9	8	7.04
179 180	子宮頸癌(1)	17	1	1.77	10	4	7.03	C56	卵巢癌(1)	10	3	5.24
	其他		56	49.49		42	37.01		其他		32	28.15
註：	年中人口數		113,155			113,487					113,694	

表52-10・臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		185	84.84		198	88.79		229	99.99		235	100.14		256	106.23		232	93.88
162	肺癌	1	41	18.80	2	29	13.00	3	37	16.16	1	50	21.31	1	53	21.99	1	49	19.83
153 154	結腸直腸癌	4	19	8.71	4	19	8.52	4	25	10.92	5	18	7.67	3	32	13.28	3	24	9.71
155	肝癌	2	30	13.76	1	42	18.83	1	44	19.21	2	42	17.90	2	50	20.75	2	36	14.57
151	胃癌	5	17	7.80	3	25	11.21	5	16	6.99	4	23	9.80	5	27	11.20	6	17	6.88
174	女性乳癌(1)	3	10	9.22	5	8	7.20	2	20	17.46	3	14	11.88	4	15	12.37	5	11	8.83
185	攝護腺癌(2)	6	6	5.48	18	2	1.79	-	-	-	11	3	2.57	14	2	1.67	14	2	1.63
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	11	5	2.29	15	4	1.79	8	9	3.93	13	4	1.70	17	1	0.41	9	8	3.24
183	卵巢癌(1)	-	-	-	8	3	2.70	16	2	1.75	17	2	1.70	12	4	3.30	7	6	4.82
200202203	非何杰金淋巴瘤	11	5	2.29	9	6	2.69	7	12	5.24	8	8	3.41	6	13	5.39	8	10	4.05
157	胰臟癌	13	4	1.83	11	5	2.24	10	6	2.62	6	13	5.54	9	9	3.73	15	4	1.62
	其他		48	22.01		55	24.66		58	25.33		58	24.72		50	20.75		65	26.30

註： 年中人口數 218,050 223,003 229,014 234,660 240,996 247,115

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-10・臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年			
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	
08-14	所有癌症死亡原因		269	106.92		293	115.33		342	133.30		302	116.51		314	120.54		306	117.01	
162	肺癌	1	50	19.87	1	58	22.83	1	81	31.57	1	61	23.53	2	55	21.11	1	56	21.41	
153 154	結腸直腸癌	4	26	10.33	3	39	15.35	3	34	13.25	4	27	10.42	3	41	15.74	3	41	15.68	
155	肝癌	2	44	17.49	2	45	17.71	2	56	21.83	2	49	18.90	1	58	22.27	2	43	16.44	
151	胃癌	3	27	10.73	5	21	8.27	4	30	11.69	5	26	10.03	6	19	7.29	7	24	9.18	
174	女性乳癌(1)	5	12	9.44	4	18	14.00	5	12	9.23	3	19	14.43	4	13	9.80	4	15	11.22	
185	攝護腺癌(2)	6	8	6.43	7	8	6.38	9	6	4.74	17	2	1.57	5	12	9.39	6	12	9.39	
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	12	6	2.38	18	5	1.97	6	14	5.46	10	8	3.09	9	13	4.99	15	5	1.91	
183	卵巢癌(1)	17	2	1.57	16	3	2.33	15	3	2.31	12	4	3.04	15	4	3.01	10	6	4.49	
200202203	非何杰金淋巴瘤	9	9	3.58	8	11	4.33	13	7	2.73	6	19	7.33	10	11	4.22	9	12	4.59	
157	胰臟癌	8	13	5.17	12	7	2.76	6	14	5.46	7	11	4.24	8	14	5.37	12	9	3.44	
	其他		72	28.62		78	30.70		85	33.13		76	29.32		74	28.41		83	31.74	
註：	年中人口數		251,586			254,052			256,566			259,200			260,495			261,519		

表52-10・臺北市內湖區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		357	135.62		373	140.72	C00-C97	所有癌症死亡原因		366	137.51
162	肺癌	1	87	33.05	1	71	26.79	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	76	28.55
153 154	結腸直腸癌	4	33	12.54	2	52	19.62	C22	肝和肝內膽管癌	2	66	24.80
155	肝癌	2	53	20.13	3	47	17.73	C50	女性乳房癌(1)	3	21	15.32
151	胃癌	4	33	12.54	4	33	12.45	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	4	38	14.28
174	女性乳癌(1)	3	19	14.08	5	16	11.74	C16	胃癌	5	25	9.39
185	攝護腺癌(2)	9	7	5.46	6	15	11.65	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	9	6.97
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	10	3.80	7	16	6.04	C25	胰臟癌	7	16	6.01
183	卵巢癌(1)	11	5	3.70	8	8	5.87	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	8	8	5.83
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	16	6.08	9	15	5.66	C15	食道癌	9	12	4.51
157	胰臟癌	6	19	7.22	9	15	5.66	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	11	4.13
	其他		75	28.49		85	32.07		其他		84	31.56
註： 年中人口數		263,231			265,071			266,163				

表52-11・臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		323	108.11		322	107.80		383	129.25		388	131.94		389	131.74		371	125.33
162	肺癌	1	67	22.43	1	74	24.77	1	76	25.65	1	88	29.93	1	75	25.40	1	82	27.70
155	肝癌	2	49	16.40	2	62	20.76	2	68	22.95	2	66	22.44	2	64	21.68	2	55	18.58
174	女性乳癌(1)	5	10	6.68	5	10	6.67	5	15	10.09	3	24	16.27	3	25	16.85	6	11	7.38
153 154	結腸直腸癌	3	41	13.72	4	28	9.37	3	50	16.87	4	38	12.92	4	42	14.22	3	42	14.19
185	攝護腺癌(2)	8	7	4.70	7	7	4.70	7	9	6.09	13	4	2.73	7	7	4.77	5	11	7.49
151	胃癌	4	30	10.04	3	29	9.71	4	40	13.50	5	34	11.56	5	41	13.89	3	42	14.19
183	卵巢癌(1)	14	4	2.67	9	6	4.00	12	5	3.36	7	7	4.75	8	6	4.04	17	2	1.34
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	17	5.69	11	9	3.01	8	15	5.06	9	12	4.08	11	10	3.39	10	12	4.05
157	胰臟癌	10	9	3.01	10	11	3.68	9	12	4.05	14	8	2.72	11	10	3.39	8	15	5.07
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	12	8	2.68	14	6	2.01	10	11	3.71	14	8	2.72	14	9	3.05	10	12	4.05
	其他		81	27.11		80	26.78		82	27.67		99	33.67		100	33.87		87	29.39

註： 年中人口數 298,773 298,691 296,330 294,068 295,270 296,010

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-11・臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死亡原因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	順位	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率
08-14	所有癌症死亡原因		408	138.39		424	144.58		461	157.99		433	149.13		476	164.67		456	158.15
162	肺癌	1	92	31.20	1	86	29.32	1	85	29.13	1	97	33.41	1	120	41.51	1	99	34.33
155	肝癌	2	66	22.39	2	72	24.55	2	66	22.62	2	77	26.52	2	66	22.83	2	67	23.24
174	女性乳癌(1)	3	26	17.48	4	21	14.18	3	30	20.33	4	18	12.24	4	26	17.74	6	13	8.87
153 154	結腸直腸癌	4	43	14.58	3	51	17.39	4	58	19.88	3	50	17.22	3	56	19.37	2	67	23.24
185	攝護腺癌(2)	11	6	4.11	7	12	8.27	8	13	9.02	6	13	9.07	6	15	10.53	4	18	12.69
151	胃癌	5	32	10.85	5	34	11.59	5	44	15.08	5	31	10.68	5	32	11.07	5	32	11.10
183	卵巢癌(1)	18	2	1.34	8	8	5.40	10	6	4.07	17	2	1.36	8	9	6.14	15	4	2.73
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	15	5.09	13	10	3.41	7	27	9.25	12	11	3.79	12	14	4.84	9	16	5.55
157	胰臟癌	7	15	5.09	14	9	3.07	11	11	3.77	8	16	5.51	11	15	5.19	7	22	7.63
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	8	2.71	11	12	4.09	11	11	3.77	7	18	6.20	7	24	8.30	9	16	5.55
	其他		103	34.94		109	37.17		110	37.70		100	34.44		99	34.25		102	35.38
註：	年中人口數			294,826			293,270			291,794			290,344			289,058			288,337

表52-11・臺北市士林區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		489	169.80		533	185.31	C00-C97	所有癌症死亡原因		475	165.76
162	肺癌	1	101	35.07	1	113	39.29	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	95	33.15
155	肝癌	2	83	28.82	2	83	28.86	C22	肝和肝內膽管癌	2	74	25.82
174	女性乳癌(1)	3	28	19.09	3	29	19.75	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	67	23.38
153 154	結腸直腸癌	4	54	18.75	4	55	19.12	C50	女性乳房癌(1)	4	27	18.43
185	攝護腺癌(2)	6	15	10.62	5	16	11.36	C16	胃癌	5	33	11.52
151	胃癌	5	39	13.54	6	29	10.08	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	6	15	10.71
183	卵巢癌(1)	8	9	6.14	7	14	9.53	C15	食道癌	7	19	6.63
200202203	非何杰金淋巴瘤	10	16	5.56	8	22	7.65	C25	胰臟癌	8	18	6.28
157	胰臟癌	12	15	5.21	9	21	7.30	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	9	9	6.14
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	7	19	6.60	10	19	6.61	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	17	5.93
	其他		110	38.20		132	45.89		其他		101	35.25
註： 年中人口數			287,983			287,630					286,557	

表52-12・臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	83年			84年			85年			86年			87年			88年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		277	114.28		277	114.03		316	130.49		307	126.96		326	133.63		344	139.59
162	肺癌	1	56	23.10	2	52	21.41	1	74	30.56	1	72	29.78	1	66	27.05	1	77	31.24
155	肝癌	2	48	19.80	1	58	23.88	2	57	23.54	2	62	25.64	2	60	24.59	2	55	22.32
153 154	結腸直腸癌	4	34	14.03	5	18	7.41	5	24	9.91	4	30	12.41	3	40	16.40	3	39	15.83
174	女性乳癌(1)	3	23	19.12	3	19	15.73	4	14	11.61	5	10	8.29	5	11	9.01	4	16	12.93
151	胃癌	5	24	9.90	4	22	9.06	3	34	14.04	3	36	14.89	4	31	12.71	6	22	8.93
185	攝護腺癌(2)	7	5	4.09	18	2	1.64	7	8	6.58	8	7	5.78	7	7	5.74	7	7	5.70
200 202 203	非何杰金淋巴瘤	10	8	3.30	11	6	2.47	10	9	3.72	12	6	2.48	8	13	5.33	8	14	5.68
179 180	子宮頸癌(1)	6	10	8.31	6	8	6.62	6	10	8.29	5	10	8.29	9	6	4.91	5	12	9.70
157	胰臟癌	15	5	2.06	7	10	4.12	8	14	5.78	9	10	4.14	6	16	6.56	8	14	5.68
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	15	5	2.06	15	4	1.65	11	7	2.89	9	10	4.14	17	5	2.05	10	11	4.46
	其他		59	24.34		78	32.11		65	26.84		54	22.33		71	29.10		77	31.24

註： 年中人口數 242,382 242,918 242,168 241,802 243,964 246,442

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

(3)83-96年死因統計資料採國際疾病分類碼第九版(ICD-9),97年配合衛生署改採第十版(ICD-10)。

表52-12・臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續1）

單位：人，人/每十萬人口

疾 病 碼 ICD-9	死 亡 原 因	89年			90年			91年			92年			93年			94年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		357	144.18		399	160.78		356	143.25		392	157.38		375	150.60		399	160.59
162	肺癌	1	76	30.69	1	88	35.46	1	84	33.80	1	86	34.53	1	81	32.53	1	78	31.39
155	肝癌	2	56	22.62	2	70	28.21	2	52	20.92	2	60	24.09	2	72	28.91	2	64	25.76
153 154	結腸直腸癌	3	43	17.37	4	37	14.91	3	42	16.90	3	45	18.07	3	42	16.87	3	52	20.93
174	女性乳癌(1)	4	17	13.65	5	17	13.59	8	9	7.17	5	15	11.90	5	13	10.30	5	16	12.67
151	胃癌	5	32	12.92	3	43	17.33	4	27	10.86	4	30	12.04	4	34	13.65	4	32	12.88
185	攝護腺癌(2)	14	3	2.44	7	8	6.50	6	10	8.13	6	10	8.13	6	9	7.33	6	13	10.64
200202203	非何杰金淋巴瘤	7	19	7.67	10	13	5.24	7	19	7.65	8	13	5.22	11	11	4.42	8	16	6.44
179 180	子宮頸癌(1)	6	12	9.64	6	9	7.19	5	12	9.56	16	4	3.17	7	8	6.34	9	8	6.34
157	胰臟癌	9	12	4.85	13	8	3.22	11	10	4.02	7	15	6.02	9	13	5.22	11	12	4.83
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	8	14	5.65	8	15	6.04	13	8	3.22	9	12	4.82	10	12	4.82	7	17	6.84
	其他		73	29.48		91	36.67		83	33.40		102	40.95		80	32.13		91	36.63
註：	年中人口數	247,603			248,166			248,510			249,072			249,009			248,464		

表52-12・臺北市北投區歷年主要癌症死亡原因（續完）

單位：人，人/每十萬人口

疾病碼 ICD-9	死 亡 原 因	95年			96年			疾病碼 ICD-10	死 亡 原 因	97年		
		順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率	順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率			順位	死 亡 人 數	每 十 萬 人 口 死 亡 率
08-14	所有癌症死亡原因		401	161.17		463	185.33	C00-C97	所有癌症死亡原因		464	185.70
162	肺癌	1	92	36.98	1	106	42.43	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	97	38.82
155	肝癌	2	63	25.32	2	61	24.42	C22	肝和肝內膽管癌	2	74	29.62
153 154	結腸直腸癌	3	46	18.49	3	59	23.62	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	52	20.81
174	女性乳癌(1)	6	12	9.47	4	19	14.89	C50	女性乳房癌(1)	4	20	15.62
151	胃癌	4	34	13.67	5	33	13.21	C61	前列腺(攝護腺)癌(2)	5	14	11.49
185	攝護腺癌(2)	7	8	6.56	6	15	12.28	C16	胃癌	6	27	10.81
200202203	非何杰金淋巴瘤	8	15	6.03	7	26	10.41	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌(1)	7	10	7.81
179 180	子宮頸癌(1)	5	13	10.25	8	9	7.05	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	8	19	7.60
157	胰臟癌	10	13	5.22	9	17	6.80	C25	胰臟癌	9	19	7.60
140-149*	口腔癌(含口咽及下咽)	10	13	5.22	10	16	6.40	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	10	13	5.20
	其他		92	36.98		102	40.83		其他		119	47.63
註： 年中人口數		248,807			249,825			249,864				

伍、歷年主要癌症發生率

表53・臺北市歷年男性主要癌症發生率

單位：人／每十萬男性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		肝癌		結腸直腸癌		胃癌		攝護腺癌		口腔癌		胰臟癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	247.37	216.08	34.38	28.83	38.69	35.97	34.08	29.37	26.82	22.51	16.02	12.04	12.32	11.68	4.68	4.05
85	267.36	226.20	40.01	32.15	41.53	37.46	39.09	32.75	26.19	20.98	18.86	13.98	15.19	13.84	4.81	3.78
86	266.91	220.52	37.80	29.26	44.42	39.08	36.72	30.44	26.25	20.38	21.40	15.83	12.86	11.45	5.70	4.54
87	287.79	231.95	43.41	33.25	44.57	37.95	39.66	32.28	25.24	19.54	24.55	17.05	16.87	14.86	6.98	5.35
88	306.62	268.49	43.38	36.36	46.89	42.54	42.84	38.20	24.29	20.45	29.10	23.72	18.40	16.97	6.95	5.66
89	315.51	269.06	48.73	40.11	47.66	42.95	48.42	42.24	25.43	20.85	28.49	22.16	18.41	16.44	6.49	5.52
90	313.88	261.12	45.30	36.03	47.76	41.63	44.22	36.90	28.53	22.22	28.77	21.66	16.38	14.09	6.69	5.73
91	335.62	272.63	46.33	36.17	47.56	40.59	49.94	40.49	28.43	21.57	32.35	24.68	21.67	18.60	7.30	5.64
92	313.38	248.40	48.07	35.85	47.22	39.27	45.13	35.58	23.61	17.71	29.50	21.47	22.68	18.98	5.34	4.19
93	345.64	264.21	55.59	39.83	48.82	39.11	53.41	41.33	24.57	17.80	34.75	24.19	25.03	20.61	6.37	4.85
94	333.02	248.76	50.80	35.89	48.61	37.87	53.22	39.94	24.23	17.02	35.79	24.37	23.60	18.69	6.49	4.56
95	376.32	275.24	52.55	35.65	51.30	39.58	58.00	42.14	27.52	19.15	41.71	28.06	26.74	20.70	8.97	6.26

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88-95年係採2000年世界標準人口為基準計算。

表53・臺北市歷年男性主要癌症發生率(續)

單位：人／每十萬男性人口

年	食道癌		白血病		鼻咽癌		膀胱癌		膽囊癌		腎臟癌		腦癌		喉癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	7.48	6.53	5.97	6.05	9.14	8.38	9.67	7.64	2.57	2.08	5.89	5.38	2.80	2.48	4.16	3.54
85	6.34	5.59	5.50	5.29	8.93	8.13	10.46	8.09	1.91	1.53	4.73	4.10	3.36	3.18	3.21	2.99
86	8.55	7.30	4.47	4.32	9.24	8.22	10.09	8.20	3.31	2.49	5.24	4.64	3.46	3.16	3.39	2.88
87	7.06	5.71	5.37	5.20	7.29	6.22	12.66	9.50	2.91	2.31	5.98	5.06	2.53	2.46	3.61	2.86
88	9.39	8.39	5.04	4.86	8.94	8.06	13.52	11.32	2.67	2.19	3.89	3.34	3.67	3.68	4.89	4.26
89	8.78	7.80	6.57	6.10	7.87	6.79	12.14	9.82	3.06	2.46	4.81	4.21	4.66	4.26	4.74	3.89
90	9.54	8.04	4.00	3.83	8.69	7.61	12.00	9.55	3.08	2.42	5.77	4.87	3.77	3.55	4.77	4.09
91	9.99	8.41	8.22	7.59	10.14	8.92	12.83	9.78	3.69	2.78	5.53	4.48	2.69	2.47	4.61	3.94
92	8.28	6.90	9.06	7.83	9.68	8.22	10.22	7.52	2.71	2.07	4.10	3.27	3.48	3.09	3.56	2.85
93	9.72	7.99	7.46	6.15	8.24	6.85	11.66	8.56	3.42	2.53	4.90	3.78	2.49	2.27	3.81	2.81
94	8.44	6.42	8.21	6.90	7.42	6.07	10.47	7.34	3.36	2.53	5.00	3.85	2.81	2.42	5.08	3.91
95	10.45	7.63	8.89	7.48	9.82	7.97	12.01	7.71	4.21	2.81	6.31	4.72	3.12	3.00	5.15	3.69

表54・臺北市歷年女性主要癌症發生率

單位：人／每十萬女性人口

年	所有癌症死亡原因		肺癌		結腸直腸癌		女性乳癌		肝癌		胃癌		胰臟癌		子宮頸癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	213.99	200.47	18.64	18.77	23.72	23.42	42.81	38.25	12.81	12.62	12.58	12.11	3.33	3.20	23.26	21.95
85	249.83	225.27	19.40	18.26	28.26	27.09	47.28	40.79	15.28	14.93	14.66	13.20	3.67	3.49	26.58	24.20
86	258.48	227.82	19.80	17.73	27.32	25.15	53.42	44.91	16.65	16.39	14.35	12.57	3.30	3.07	26.94	23.38
87	282.48	240.29	21.06	18.80	31.62	27.55	55.26	45.34	16.12	14.77	12.39	10.47	3.34	2.97	24.48	20.76
88	293.65	268.19	20.05	19.10	32.44	30.93	65.92	57.65	18.77	18.27	13.66	12.77	3.53	3.31	22.15	19.72
89	299.74	267.19	22.73	21.16	35.22	32.03	67.53	57.48	19.29	18.10	13.39	11.97	4.26	3.90	22.73	20.11
90	307.66	264.31	25.94	22.52	36.67	32.23	65.84	54.31	21.90	19.52	14.25	12.33	5.25	4.52	19.42	16.49
91	319.83	266.19	27.60	23.12	37.45	31.45	76.40	62.10	18.80	16.15	15.59	12.81	4.92	4.10	18.87	15.19
92	264.34	213.39	23.96	19.24	34.22	27.45	67.25	53.22	18.87	15.59	13.03	10.34	5.32	4.13	16.40	13.28
93	284.32	222.63	26.12	20.29	39.44	30.64	77.09	59.29	17.96	14.08	13.85	10.44	5.01	3.98	16.46	12.71
94	298.16	227.26	27.38	20.35	40.92	30.53	84.38	63.60	18.48	14.37	12.79	9.26	5.24	3.83	15.26	11.31
95	319.44	234.00	32.83	23.25	46.68	33.30	84.32	61.66	18.30	13.63	15.93	11.22	6.45	4.55	14.23	10.21

附註：84-87年標準化發生率係採1976年世界標準人口為基準計算，88-95年係採2000年世界標準人口為基準計算。

表54・臺北市歷年女性主要癌症發生率(續)

單位：人／每十萬女性人口

年	卵巢癌		白血病		膽囊癌		子宮體癌		腎癌		鼻咽癌		腦癌		膀胱癌	
	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率	發生率	標準化發生率
84	7.20	6.62	2.88	3.04	1.89	1.99	4.24	4.19	4.32	4.50	2.88	2.27	2.05	2.09	3.11	3.03
85	6.95	6.23	4.20	4.25	2.52	2.40	5.50	4.93	2.29	2.30	3.28	2.55	2.14	2.19	2.67	2.53
86	7.60	6.52	2.53	2.68	2.30	2.04	6.60	5.96	2.46	2.17	3.61	3.02	1.84	1.92	4.22	3.86
87	9.58	8.15	4.03	3.95	3.27	2.69	8.44	7.49	2.58	2.32	4.03	3.41	2.05	1.83	3.65	3.11
88	9.54	8.62	3.00	3.06	2.10	2.08	6.76	6.17	2.18	2.16	3.23	2.73	2.25	2.13	5.41	5.18
89	10.10	9.12	3.51	3.53	2.62	2.42	8.00	7.08	2.24	2.04	3.81	3.21	2.54	2.58	4.11	3.71
90	9.82	8.29	4.20	4.10	3.60	3.11	9.45	8.15	3.00	2.78	3.15	2.63	2.85	2.51	4.20	3.68
91	10.15	8.57	5.67	5.55	3.51	2.94	9.62	7.93	2.46	2.10	3.51	2.88	2.98	2.78	4.25	3.69
92	10.93	8.78	5.84	5.43	2.25	1.80	8.39	6.63	3.52	2.84	3.37	2.80	2.77	2.44	4.64	3.72
93	10.63	8.21	4.94	4.61	2.77	2.11	10.63	8.04	3.22	2.66	2.69	2.09	2.17	1.95	4.57	3.48
94	9.72	7.65	5.68	5.24	2.54	1.89	11.30	8.47	2.47	1.88	4.79	3.80	2.47	2.28	4.64	3.48
95	9.78	7.35	5.56	4.42	2.96	2.06	14.45	10.65	2.96	2.34	2.59	1.98	3.11	2.72	5.41	3.67

陸、附錄

【附錄 1】推動抹片篩檢及早發現治療，子宮頸癌標準化死亡率較 10 年前降低四成

民國 70 年臺北市女性子宮頸癌死亡率為每十萬女性人口 7.6 人，高居女性癌症死因第二位。84 年起全民健保實施，提供 30 歲以上婦女，每年免費接受子宮頸抹片檢查一次。透過推動抹片篩檢，及早發現治療，96 年子宮頸癌降為臺北市女性癌症死因第六位，標準化死亡率較 10 年前降低了 4 成，是女性主要癌症中防治成效最佳的。

臺北市女性子宮頸癌粗發生率 88 年為每十萬女性人口 22.2 人，剔除人口結構影響，以 2000 年 W.H.O.世界人口為基準計算標準化發生率則為 19.7 人，在全國 25 縣市中排名第 6 低；依衛生署國民健康局最新資料顯示，臺北市女性子宮頸癌粗發生率 94 年為 15.3 人，標準化發生率為 11.3 人，僅高於花蓮縣 9.0 人；與 88 年比較，臺北市女性子宮頸癌粗發生率減少 31.1%，標準化發生率則減少 42.6%，並較全國女性標準化發生率低 23.3%。

96 年臺北市女性子宮頸癌死亡率為每十萬女性人口 6.6 人，較全國 7.4 人低；剔除人口結構影響，標準化死亡率則為 4.4 人，僅高於澎湖縣、高雄市、嘉義市 4.0 人及基隆市 3.7 人；與 10 年前比較，臺北市女性子宮頸癌死亡率減少 15.0%，標準化死亡率則減少 40.0%。

96 年臺北市女性子宮頸癌死亡者之平均年齡為 69.0 歲，是女性十大癌症死因中第四年輕者；與 10 年前比較，女性子宮頸癌死亡者平均年齡為 60.4 歲，增加了 8.6 歲，為近 10 年來女性主要癌症中死亡平均年齡提高最多者。

近 10 年來臺北市女性子宮頸癌死亡者除 90 年有一例為 24 歲以下者，餘均為 25 歲以上；87 年子宮頸癌死亡者壯年女性(25-44 歲)占 20.6%、中年女性(45-64 歲)占 40.2%、老年女性(65 歲以上)占 39.2%，至 96 年老年女性占率已漸增為 58.4%，而壯年、中年女性則分別降為 5.6%及 36.0%；子宮頸癌死亡者集中在老年女性，此與臺北市人口結構日趨老化有關；惟各年齡層之子宮頸癌死亡率均呈下降趨勢，各年齡層中壯年、中年之降幅皆達 45%，其中又以壯年減少 74.2%為最多。

96 年臺北市女性子宮頸癌死亡率為每十萬女性人口 6.6 人，與亞洲主要國家或城市比較，低於日本 8.7 人(2007 年)、新加坡 7.0 人(2001 年)，高於香港 3.6 人(2005 年)、南韓 5.8 人(2002 年)；與歐美國家比較，則低於英國 8.8 人(2002 年)、美國 7.5 人(2000 年)、加拿大 6.7 人(2000 年)。

子宮頸癌可經由抹片檢查在癌前病變時早期發現，經治療後可防止後續發展為侵襲性子宮頸癌，是近年來國人子宮頸癌死亡率下降最主要原因。84 年起健保已提供 30 歲以上婦女每年 1 次子宮頸抹片檢查，藉由簡單的檢查即可早期發現，除可保障自己生命也可免受病痛之苦，女性朋友為維護自己健康的權利，應定期到醫院做抹片檢查。

表1 台北市子宮頸癌發生率

單位：人/每十萬女性人口

	粗發生率	標準化發生率
88年	22.2	19.7
89年	22.7	20.1
90年	19.4	16.5
91年	18.9	15.2
92年	16.4	13.3
93年	16.5	12.7
94年	15.3	11.3
94年較88年 增減(%)	-31.1	-42.6

資料來源：行政院衛生署、本府民政局。

表3 各國子宮頸癌死亡率

國籍別	年	每十萬女性 人口死亡率
中華民國	2007	7.4
	臺北市	6.6
	高雄市	5.0
日本	2007	8.7
新加坡	2001	7.0
南韓	2002	5.8
英國	2002	8.8
美國	2000	7.5
加拿大	2000	6.7

資料來源：行政院衛生署、行政院主計處。

表2 台北市子宮頸癌死亡率—按年齡別

單位：人

	合 計		5 - 14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬	死 亡	每 十 萬
	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
87年	102	7.8	-	-	-	-	21	4.3	41	15.4	40	37.7
88年	113	8.5	-	-	-	-	18	3.7	46	16.4	49	44.2
89年	97	7.3	-	-	-	-	18	3.8	30	10.2	49	42.5
90年	110	8.2	-	-	1	0.5	9	1.9	46	15.0	54	44.8
91年	105	7.9	-	-	-	-	8	1.7	37	11.6	60	44.0
92年	85	6.4	-	-	-	-	3	0.7	33	9.9	49	37.2
93年	87	6.5	-	-	-	-	6	1.3	35	10.2	46	33.4
94年	86	6.4	-	-	-	-	12	2.7	34	9.6	40	27.7
95年	81	6.0	-	-	-	-	6	1.3	24	6.5	51	33.7
96年	89	6.6	-	-	-	-	5	1.1	32	8.4	52	32.8
96年較87 年增減 (%)	-12.7	-15.0	-76.2	-74.2	-22.0	-45.2	30.0	-12.8

資料來源：行政院衛生署、本府民政局。

【附錄 2】乳癌是臺北市女性最好發的癌症，發生率全臺最高

臺北市女性乳癌粗發生率民國 88 年起即超越子宮頸癌，為女性癌症發生率最高的癌症；近 10 年女性乳癌死亡率均居臺北市女性癌症死因之第二或第三位。

臺北市女性乳癌粗發生率 88 年為每十萬女性人口 65.9 人，剔除人口結構影響，以 2000 年 W.H.O.世界人口為基準計算標準化發生率則為 57.7 人；依衛生署國民健康局公布最新資料，臺北市女性乳癌粗發生率 94 年增為 84.4 人，標準化發生率為 63.6 人，居各縣市之冠；與 88 年比較，臺北市女性乳癌粗發生率增加 28.0%，標準化發生率則成長 10.3%，且為全國女性標準化發生率的 1.3 倍。

96 年臺北市女性乳癌死亡率為每十萬女性人口 15.0 人，較全國 13.7 人高；剔除人口結構影響，以 2000 年 W.H.O.世界人口為基準計算標準化死亡率，則為 10.6 人，反低於全國女性乳癌標準化死亡率 11.1 人，在全國 25 縣市中排名第 13 高；與 10 年前比較，臺北市女性乳癌死亡率增加 20.6%，標準化死亡率卻減少了 10.8%。

依近 10 年資料觀察，臺北市女性乳癌標準化發生率均低於粗發生率；女性乳癌粗死亡率呈逐年上升趨勢，但標準化死亡率則大致呈緩降趨勢，臺北市女性乳癌發生率及死亡率變動深受人口結構日趨老化之影響。

96 年臺北市女性乳癌死亡者之平均年齡為 61.5 歲，是女性十大癌症死因中第二年輕者，次於卵巢癌之 59.9 歲；與 10 年前比較，女性乳癌死亡者平均年齡為 57.2 歲，增加了 4.2 歲。

若依近 10 年臺北市女性各年齡層主要癌症死因分析，乳癌都是臺北市中年(45-64 歲)與壯年(25-44 歲)女性的第 1 名癌症死因，老年(65 歲以上)女性乳癌死因則由第 6 名前進至第 4 名；女性乳癌死亡率並隨著年齡增加而增高，老

年女性乳癌死亡率不僅居各年齡層之首，亦為唯一呈成長者；壯年女性乳癌死亡率則較 10 年前大幅下降了 45.7%。

96 年臺北市女性乳癌死亡率為每十萬女性人口 15.0 人，與亞洲主要國家或城市比較，低於日本 17.5 人(2007 年)、新加坡 18.0 人(2001 年)，高於香港 13.0 人(2005 年)、南韓 5.6 人(2002 年)；與歐美國家比較，則低於英國 42.4 人(2002 年)、美國 29.2 人(2000 年)、加拿大 31.2 人(2000 年)。

由於乳癌發生率逐年提高，自 93 年 7 月起健保開始提供 50-69 歲女性在合約醫院做兩年一次乳房攝影檢查，國民健康局也有對 40-49 歲婦女的乳癌篩檢計畫，均可向臺北市各區健康服務中心洽詢辦理；經常自我檢查或利用醫院的檢查服務，早期發現早期治療，以提高治癒率，是維護自己健康的不二法門，女性朋友在照顧家庭之外，也要多多關心自己，愛護自己，好好的為自己的健康把關。

表1 台北市乳癌發生率

單位：人／每十萬女性人口

	粗發生率	標準化發生率
88年	65.9	57.7
89年	67.5	57.5
90年	65.8	54.3
91年	76.4	62.1
92年	67.4	53.4
93年	77.1	59.3
94年	84.4	63.6
94年較88年 增減(%)	28.0	10.3

資料來源：行政院衛生署、本府民政局。

表3 各國乳癌死亡率

國籍別	年	每十萬女性 人口死亡率
中華民國	2007	13.7
	臺北市	15.0
	高雄市	18.1
日本	2007	17.5
新加坡	2001	18.0
南韓	2002	5.6
英國	2002	42.4
美國	2000	29.2
加拿大	2000	31.2

資料來源：行政院衛生署、行政院主計處。

表2 台北市乳癌死亡率－按年齡別統計

單位：人

	合 計		5-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上	
	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率	死 亡 人 數	每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率	人 數	死 亡 率
87年	164	12.5	-	-	-	-	34	7.0	78	29.3	52	49.0
88年	162	12.2	-	-	-	-	30	6.2	86	30.6	46	41.5
89年	169	12.7	-	-	-	-	27	5.7	97	33.0	45	39.0
90年	199	14.9	-	-	-	-	32	6.8	105	34.2	62	51.5
91年	192	14.4	-	-	-	-	25	5.4	99	31.0	68	49.9
92年	208	15.5	-	-	-	-	31	6.8	95	28.6	82	57.4
93年	203	15.2	-	-	-	-	32	7.1	103	30.0	68	49.4
94年	224	16.8	-	-	-	-	32	7.2	115	32.4	77	53.4
95年	209	15.6	-	-	-	-	36	8.1	109	29.7	64	42.2
96年	203	15.0	-	-	-	-	17	3.8	106	27.9	80	50.5
96年較87 年增減 (%)	23.8	20.6	-50.0	-45.7	35.9	-4.5	53.8	3.1

資料來源：行政院衛生署、本府民政局。

【附錄 3】臺北市口腔癌死亡率，10 年成長近七成

臺北市 96 年口腔癌標準化死亡率在全國僅高於金門縣、連江縣，但近 10 年粗死亡率卻成長了 6 成 9，排除人口老化因素之標準化死亡率亦成長了 3 成 6，顯見死亡率的增加人口老化並非主要因素。多項醫學研究證實嚼食檳榔、抽煙皆是導致口腔癌的危險因子，紅唇族、癮君子要注意了！

近 10 年臺北市民口腔癌粗死亡率逐年增加，87 年死亡率為每十萬人口 3.0 人，居市民的第 15 位死因，至 95 年則上升到第 9 名，死亡率為每十萬人口 6.3 人，96 年雖略降至 5.1 人，惟近 10 年死亡率增幅達 68.9%；標準化死亡率亦由 87 年每十萬人口 2.8 人，升至 96 年 3.8 人，成長率亦達 36.2%，在主要癌症死因中，成長幅度僅次於攝護腺癌。

臺北市口腔癌近 10 年平均死亡年齡為 58.2 歲，是主要癌症死因中平均死亡年齡最輕者。若以性別來分析，男性近 10 年平均死亡年齡為 57.2 歲，女性為 66.2 歲，男性較女性低 8.9 歲；死亡率方面，男性口腔癌死亡率大致呈逐年上升趨勢，女性死亡率則大致在每十萬人口 1.0 人至 1.4 人間變動，近 10 年男性口腔癌平均死亡率每十萬人口 8.2 人為女性 1.1 人的 7.5 倍。

若依年齡層來觀察，近 10 年口腔癌死亡率隨著年齡增加而增高，65 歲以上人口死亡率居各年齡層之首，平均年增率方面，25-44 歲、45-64 歲及 65 歲以上皆為正成長，其中又以 25-44 歲平均年增率 13.3% 最多。若以性別來分析，男性亦以 25-44 歲平均年增率 14.5% 最多，女性則以 65 歲以上平均年增率 26.8% 居首；死因順位方面，近 10 年口腔癌皆落在女性癌症死因 14 名以外，惟口腔癌則居男性的第 5 或第 6 大癌症死因，其更是壯年男性(25-44 歲)的第 2 大癌症死因(次於肝癌)，男性口腔癌日趨年輕化，對家庭和社會影響不容忽視。

若以近 10 年臺北市各行政區口腔癌標準化死亡率資料觀之， 12 個行政區中大安區歷年死亡率均低於全市死亡率，松山區及中正區僅 1 年高於全市死亡率，萬華區則近 10 年均高於全市死亡率，大同區、南港區及士林區僅 1 年低於全市死亡率外，餘 5 個行政區均呈增減互見之勢。

96 年我國與臺北市口腔癌死亡率分別為每十萬人口 10.1 人與 5.1 人，與其他國家或地區比較，高於日本 2.0 人(2003 年)、香港 2.5 人(2006 年) 及美國 2.5 人(2005 年)，臺灣檳榔文化應是一重要影響因素。

嚼食檳榔對環保或是民眾的健康都有負面的影響，臺北市政府衛生局呼籲市民應及早戒除嚼食檳榔的習慣，除針對 18 歲以上吸菸或嚼食檳榔市民提供口腔癌篩檢服務外，並辦理戒檳班與推動無檳職場，以期降低口腔癌發生率，提升市民健康品質。

表1 臺北市口腔癌死亡率

單位：人/每十萬人口

年度	粗死亡率	標準化死亡率
87年	3.0	2.8
88年	3.7	3.5
89年	4.3	3.8
90年	4.3	3.7
91年	3.5	3.0
92年	4.7	3.9
93年	5.3	4.3
94年	5.6	4.3
95年	6.3	4.8
96年	5.1	3.8
96年較87年 增減(%)	68.9	36.2

資料來源：行政院衛生署、本府民政局。

表2 臺北市口腔癌平均死亡年齡

單位：歲

年度	兩性	男性	女性
87年	55.9	54.6	74.8
88年	56.9	56.9	56.6
89年	58.3	56.6	66.5
90年	58.2	56.6	67.1
91年	57.9	57.3	62.8
92年	58.5	57.2	69.4
93年	59.0	57.7	69.5
94年	59.6	59.2	63.0
95年	58.0	57.6	61.2
96年	60.0	58.5	70.6
近10年平均死亡 年齡	58.2	57.2	66.2

資料來源：行政院衛生署。

表3 臺北市口腔癌死亡率

按性別及年齡別分

單位：人/每十萬人口

年度	總計					男性					女性				
	合 計	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	合 計	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上	合 計	15-24歲	25-44歲	45-64歲	65歲以上
87年	3.0	-	2.0	7.2	10.0	5.7	-	4.1	15.0	14.3	0.4	-	-	-	4.7
88年	3.7	-	2.0	10.8	8.9	6.3	-	3.2	19.3	13.3	1.2	-	0.8	2.8	3.6
89年	4.3	-	2.7	8.9	15.4	7.2	-	5.2	16.7	19.7	1.4	-	0.4	1.7	10.4
90年	4.3	-	1.9	10.7	12.7	7.4	-	3.9	19.9	17.3	1.3	-	0.2	2.3	7.5
91年	3.5	-	1.0	8.8	10.9	6.3	-	2.0	17.1	17.1	0.7	-	0.2	1.3	4.0
92年	4.7	-	2.1	10.5	14.6	8.6	-	4.2	20.8	21.7	1.0	-	0.2	1.2	6.8
93年	5.3	0.5	2.1	10.5	17.4	9.5	1.1	4.3	20.8	26.3	1.2	-	0.2	1.2	8.0
94年	5.6	-	1.7	12.3	16.8	10.4	-	3.3	23.7	30.0	1.0	-	0.2	2.0	3.5
95年	6.3	-	3.3	12.7	16.3	11.5	-	6.1	24.8	27.5	1.4	-	0.9	1.9	5.3
96年	5.1	-	2.5	8.5	16.7	9.1	-	5.4	16.4	26.3	1.3	-	-	1.3	7.6
近10年 平均年 增率 (%)	7.4	-	13.3	4.6	8.8	6.6	-	14.5	3.0	8.6	28.1	-	11.9	-2.6	26.8

資料來源：行政院衛生署、本府民政局。

表4 臺北口腔癌標準化死亡率－按行政區別

單位：人/每十萬人口

行政區別	87年	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年
臺北市	2.8	3.5	3.8	3.7	3.0	3.9	4.3	4.3	4.8	3.8
松山區	1.1	2.3	5.2	3.5	1.3	3.5	0.9	3.0	3.6	2.1
信義區	1.9	4.5	3.1	3.3	1.7	3.9	3.8	4.6	5.8	3.7
大安區	2.2	1.6	2.4	2.0	2.2	1.3	1.6	2.0	2.5	2.3
中山區	3.0	2.8	3.6	3.1	1.7	5.8	3.9	3.5	4.6	1.5
中正區	1.8	2.7	5.4	2.7	2.2	2.5	2.8	4.0	3.2	1.6
大同區	7.2	6.4	5.4	6.1	4.8	4.1	5.5	5.5	8.0	3.1
萬華區	5.3	3.8	4.6	7.2	6.0	8.1	8.1	10.3	8.6	5.4
文山區	2.9	3.5	3.8	3.4	2.1	1.8	5.0	4.9	4.9	4.5
南港區	5.9	4.6	4.1	5.1	5.7	5.3	5.9	3.6	7.8	6.1
內湖區	0.3	3.7	3.2	2.0	5.4	2.6	5.6	2.0	3.4	5.3
士林區	3.0	3.8	2.3	4.1	3.2	5.7	6.4	4.7	5.0	4.8
北投區	2.0	4.4	5.6	5.5	2.5	4.0	4.3	5.2	4.1	5.1

資料來源：行政院衛生署。

表5 各國口腔癌死亡率比較

單位：人/每十萬人口

國籍別	年	每十萬人口 死亡率
中華民國	2007	10.1
臺北市	2007	5.1
日本	2003	2.0
香港	2006	2.5
美國	2005	2.5

資料來源：行政院衛生署。

【附錄 4】臺北市十大死因分類改採WHO第十版，慢性下呼吸道疾病首度進榜

97 年臺北市民死因分類配合衛生署改採WHO第十版，惡性腫瘤蟬連 36 年榜首，慢性下呼吸道疾病首度進榜，位居第 8 名，自殺後退為 11 名。十大癌症死因肺癌 16 年連居首位，口腔癌擠入第 9 名。

97 年臺北市民死亡人數 1 萬 5,119 人，首度突破 1 萬 5 千人，平均每 34 分 46 秒就有一人死亡；粗死亡率為每十萬人口 575.7 人，較 96 年增加 25.1 人、4.6%；如依WHO編布 2000 年世界人口結構調整計算，標準化死亡率為每十萬人口 366.2 人，較 96 年增加 2.7 人、0.74%，較全國標準化死亡率 484.3 人低 24.4%，在全國 25 縣市中，僅高於金門縣、連江縣，為死亡率第三低的縣市；死亡者平均年齡為 72.6 歲，較全國高 3.3 歲。

97 年採用WHO第十版死因分類，十大死因依序為 1.惡性腫瘤 2.心臟疾病 3.腦血管疾病 4. 肺炎 5. 糖尿病 6. 敗血症 7. 腎炎、腎病症候群及腎病變 8. 慢性下呼吸道疾病 9. 意外事故 10. 高血壓性疾病；與 96 年比較，包含慢性肺阻塞、氣喘、支氣管炎的「慢性下呼吸道疾病」，首度進榜，位居第 8 名，敗血症前進 4 位為第 6 名，自殺後退為 11 名，慢性肝病及肝硬化退為第 12 名。十大死因死亡人數占臺北市總死亡人數的 7 成 6，其中惡性腫瘤與心臟疾病 2 者即占 4 成 3。

依性別觀察，惡性腫瘤、心臟疾病及腦血管疾病皆占男女十大死因第 1 至第 3 名，男性十大死因慢性下呼吸道疾病首度進入為第 6 名，慢性肝病及肝硬化退為第 12 名，其餘死因與 96 年同，惟順位上略有變動；女性十大死因高血壓性疾病進位為第 8 名、骨骼肌肉系統及結締組織之疾病首度進入為第 9 名，意外事故、慢性肝病及肝硬化分別退為第 11 名、12 名，其餘死因與 96 年同，惟順位上亦略有變動。

依年齡層觀察，15-24 歲青年主要死因前 3 項分別為意外事故占 31.1%、惡性腫瘤占 15.1%及自殺占 13.2%；奪去壯年 25-44 歲生命之主要死因前 3 項分別為惡性腫瘤占 28.6%、自殺占 18.0%及心臟疾病占 11.0%；45-64 歲中年前 3

項主要死因則為惡性腫瘤占 45.1%、心臟疾病占 11.7%及腦血管疾病占 6.1%；65 歲以上老年主要死因仍以惡性腫瘤占 26.1%居首，依序為心臟疾病占 14.1%及腦血管疾病占 8.9%。

依近 10 年資料觀察，臺北市民標準化死亡率大致呈漸減趨勢，但臺北市民死亡人數與粗死亡率則逐年增加，主要與臺北市人口結構日趨老化有關。88 年臺北市 64 歲以下人口 239 萬人，逐年遞減至 97 年 230 萬人，減幅為 3.9%，而 65 歲以上老年人口，則由 88 年 25 萬人，增至 97 年 32 萬人，增幅高達 29.6%；相對的 88 年 64 歲以下死亡人數為 3,799 人，至 97 年時略增為 3,915 人，增幅為 3.1%，而 65 歲以上死亡人數，則由 88 年 8,625 人，增至 97 年 1 萬 1,204 人，增幅高達 29.9%，顯示老年人口的增加為臺北市民死亡人數成長之主因。

97 年臺北市民癌症死亡人數共 4,467 人，平均每 1 小時 58 分鐘有 1 位市民因癌症死亡，死亡者平均年齡為 69 歲，較全國高 2 歲。粗死亡率為每十萬人口 170.1 人，標準化後為 112.9 人，較全國標準化死亡率 133.7 人低 15.6%。十大癌症死因依序為肺癌、肝癌、結腸直腸癌、女性乳癌、胃癌、攝護腺癌、胰臟癌、子宮頸癌、口腔癌、非何杰金淋巴瘤；與 96 年比較，前 6 名死因順序相同，胰臟癌前進 2 名，非何杰金淋巴瘤後退 3 名，口腔癌擠入第 9 名，膽囊癌退出十大癌症死因。男性十大癌症死因白血病擠進第十順位，其餘死因與 96 年同，惟順位上略有變動；女性癌症死因白血病亦擠進第十順位，其餘死因亦與 96 年同，順位上略有變動。

臺北市政府衛生局為降低市民死亡率，辦理了多種疾病篩檢與服務，對於惡性腫瘤推出口腔癌、乳癌等 5 項好發癌症篩檢；為預防腦血管疾病、糖尿病與高血壓疾病等，則有三高篩檢；希望藉由前述之服務，能讓市民及早發現治療。在自殺防治方面，臺北市政府更於今年 4 月 15 日正式成立府級的「臺北市自殺防治中心」，結合衛生局、社會局、勞工局等 12 個局處，提供包括社區心理衛生及醫療資源、福利救助、職業訓練、就業諮商等各項服務，期望透過學術上的研究和實務上的執行，幫助民眾度過生命低潮。

**表1 ICD-10 臺北市10大主要死亡原因
民國97年**

順 位	合 計				男 性				女 性			
	死亡原因	死亡人數	每十萬 人口 死亡率	死亡人數 百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡人數 百分比	死亡原因	死亡人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡人數 百分比
	所有死亡原因	15,119	575.7	100.0	所有死亡原因	8,992	705.7	100.0	所有死亡原因	6,127	453.2	100.0
1	惡性腫瘤	4,467	170.1	29.5	惡性腫瘤	2,698	211.7	30.0	惡性腫瘤	1,769	130.9	28.9
2	心臟疾病（ 高血壓性疾 病除外）	2,014	76.7	13.3	心臟疾病（ 高血壓性疾 病除外）	1,278	100.3	14.2	心臟疾病（ 高血壓性疾 病除外）	736	54.4	12.0
3	腦血管疾病	1,199	45.7	7.9	腦血管疾病	677	53.1	7.5	腦血管疾病	522	38.6	8.5
4	肺炎	950	36.2	6.3	肺炎	619	48.6	6.9	糖尿病	364	26.9	5.9
5	糖尿病	716	27.3	4.7	糖尿病	352	27.6	3.9	肺炎	331	24.5	5.4
6	敗血症	513	19.5	3.4	慢性下呼吸 道疾病	337	26.4	3.7	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	251	18.6	4.1
7	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	491	18.7	3.2	意外事故	269	21.1	3.0	敗血症	250	18.5	4.1
8	慢性下呼吸 道疾病	446	17.0	2.9	敗血症	263	20.6	2.9	高血壓性疾 病	170	12.6	2.8
9	意外事故	389	14.8	2.6	腎炎、腎病 症候群及腎 病變	240	18.8	2.7	骨骼肌肉系 統及結締組 織之疾病	149	11.0	2.4
10	高血壓性疾 病	374	14.2	2.5	蓄意自我傷 害（自殺）	231	18.1	2.6	蓄意自我傷 害（自殺）	139	10.3	2.3
	其他	3,560	135.6	23.5	其他	2,028	159.2	22.6	其他	1,446	107.0	23.6

資料來源：臺北市政府衛生局。

**表4 ICD-10 臺北市10大主要癌症死亡原因
民國97年**

順 位	合 計				男 性				女 性			
	癌 症 死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 人口 死亡率	死亡人數 百分比 %	癌 症 死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡人數 百分比 %	癌 症 死 亡 原 因	死 亡 人 數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡人數 百分比 %
	所有癌症死亡 原因	4,467	170.1	100.0	所有癌症死亡 原因	2,698	211.7	100.0	所有癌症死亡 原因	1,769	130.9	100.0
1	氣管、支氣管 和肺癌	928	35.3	20.8	氣管、支氣管 和肺癌	593	46.5	22.0	氣管、支氣管 和肺癌	335	24.8	18.9
2	肝和肝內膽管 癌	701	26.7	15.7	肝和肝內膽管 癌	488	38.3	18.1	結腸、直腸和 肛門癌	234	17.3	13.2
3	結腸、直腸和 肛門癌	567	21.6	12.7	結腸、直腸和 肛門癌	333	26.1	12.3	女性乳房癌	228	16.9	12.9
4	女性乳房癌 (1)	228	16.9	5.1	胃癌	218	17.1	8.1	肝和肝內膽管 癌	213	15.8	12.0
5	胃癌	312	11.9	7.0	前列腺(攝護 腺)癌	124	9.7	4.6	胃癌	94	7.0	5.3
6	前列腺(攝護 腺)癌(2)	124	9.7	2.8	口腔癌	115	9.0	4.3	胰臟癌	78	5.8	4.4
7	胰臟癌	192	7.3	4.3	胰臟癌	114	8.9	4.2	子宮頸及部位 未明示子宮癌	75	5.5	4.2
8	子宮頸及部位 未明示子宮癌	75	5.5	1.7	食道癌	107	8.4	4.0	卵巢癌	58	4.3	3.3
9	口腔癌	131	5.0	2.9	非何杰金氏淋 巴瘤	76	6.0	2.8	非何杰金氏淋 巴瘤	55	4.1	3.1
10	非何杰金氏淋 巴瘤	131	5.0	2.9	白血病	76	6.0	2.8	白血病	45	3.3	2.5
	其他	1,078	41.0	24.1	其他	454	35.6	16.8	其他	354	26.2	20.0

資料來源：臺北市政府衛生局。

附註：(1)每十萬女性人口死亡率(2)每十萬男性人口死亡率。

【附錄5】ICD-10 臺北市、全國、高雄市及日本主要死亡原因比較

表1.臺北市、全國、高雄市及日本主要死亡原因比較

順位	臺北市 2008				全國 2008				高雄市 2008				日本 2007(平成19年)				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百分比	
	所有死亡原因	15,119	575.72	100.00	所有死亡原因	142,283	618.68	100.00	所有死亡原因	9,017	592.02	100.00	所有死亡原因	1,108,334	879.0	100.00	
1	惡性腫瘤	4,467	170.10	29.55	惡性腫瘤	38,913	169.20	27.35	惡性腫瘤	2,694	176.88	29.88	惡性腫瘤	336,468	266.9	30.36	
2	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	2,014	76.69	13.32	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	15,726	68.38	11.05	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	859	56.40	9.53	心臟疾病	175,539	139.2	15.84	
3	腦血管疾病	1,199	45.66	7.93	腦血管疾病	10,663	46.37	7.49	肺炎	637	41.82	7.06	腦血管疾病	127,041	100.8	11.46	
4	肺炎	950	36.18	6.28	肺炎	8,661	37.66	6.09	腦血管疾病	568	37.29	6.30	肺炎	110,159	87.4	9.94	
5	糖尿病	716	27.26	4.74	糖尿病	8,036	34.94	5.65	糖尿病	542	35.59	6.01	事故傷害	37,966	30.1	3.43	
6	敗血症	513	19.53	3.39	意外事故	7,077	30.77	4.97	慢性下呼吸道疾病	328	21.54	3.64	自殺	30,827	24.4	2.78	
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	491	18.70	3.25	慢性下呼吸道疾病	5,374	23.37	3.78	意外事故	321	21.08	3.56	老邁	30,734	24.4	2.77	
8	慢性下呼吸道疾病	446	16.98	2.95	慢性肝病及肝硬化	4,917	21.38	3.46	蓄意自我傷害(自 殺)	290	19.04	3.22	腎衰竭	21,632	17.2	1.95	
9	意外事故	389	14.81	2.57	蓄意自我傷害(自 殺)	4,128	17.95	2.90	慢性肝病及肝硬化	286	18.78	3.17	肝臟疾病	16,195	12.8	1.46	
10	高血壓性疾病	374	14.24	2.47	腎炎、腎病症候群 及腎病變	4,012	17.45	2.82	腎炎、腎病症候群 及腎病變	255	16.74	2.83	慢性阻塞性肺病	14,907	11.8	1.34	
	其他	3,560	135.56	23.55	其他	34,776	151.22	24.44	其他	2,237	146.87	24.81	其他	206,866	164.1	18.66	
11	蓄意自我傷害(自 殺)	370	14.09	2.45	敗血症	3,534	15.37	2.48	高血壓性疾病	184	12.08	2.04					
12	慢性肝病及肝硬化	296	11.27	1.96	高血壓性疾病	3,507	15.25	2.46	敗血症	180	11.82	2.00					
13	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	281	10.70	1.86	衰老/老邁	1,615	7.02	1.14	衰老/老邁	71	4.66	0.79					
14	帕金森病	93	3.54	0.62	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	1,282	5.57	0.90	骨骼肌肉系統及結 締組織之疾病	51	3.35	0.57					
15	肇因於吸入外物之 肺部病況(塵肺症及 肺炎除外)	76	2.89	0.50	結核病	762	3.31	0.54	結核病	50	3.28	0.55					
年中人口數		2,626,096				22,997,696				1,523,099				126,084,864			

附註：斜體字列示參考，與順位無關。

表2. 嬰兒（未滿一歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2008				全國 2008				高雄市 2008				日本 2007(平成19年)				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死亡 百分比	
	所有死亡原因	95	459.14	100.00	所有死亡原因	897	451.36	100.00	所有死亡原因	41	353.88	100.00	所有死亡原因	2,828	259.5	100.00	
1	源於周產期的特定病況	48	231.98	50.53	源於周產期的特定病況	421	211.84	46.93	源於周產期的特定病況	22	189.88	53.66	先天性畸形	1,046	96.0	36.99	
2	先天性畸形變形及染色體異常	16	77.33	16.84	先天性畸形變形及染色體異常	185	93.09	20.62	先天性畸形變形及染色體異常	5	43.16	12.20	源於周產期之病態	779	71.5	27.55	
3	肺炎	5	24.17	5.26	意外事故	52	26.17	5.80	意外事故	2	17.26	4.88	嬰兒猝死症候群	147	13.5	5.20	
4	意外事故	3	14.50	3.16	嬰兒猝死症候群（SIDS）	35	17.61	3.90	嬰兒猝死症候群(SIDS)	2	17.26	4.88	事故傷害	127	11.7	4.49	
5	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	2	9.67	2.11	肺炎	21	10.57	2.34	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1	8.63	2.44	心臟疾病	77	7.1	2.72	
6	敗血症	2	9.67	2.11	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	18	9.06	2.01	惡性腫瘤	1	8.63	2.44	肺炎	46	4.2	1.63	
7	貧血	1	4.83	1.05	敗血症	6	3.02	0.67					敗血症	40	3.7	1.41	
8	椎骨肌肉萎縮及有關聯之症候群	1	4.83	1.05	惡性腫瘤	4	2.01	0.45					惡性腫瘤	24	2.2	0.85	
9	慢性下呼吸道疾病	1	4.83	1.05	腦血管疾病	4	2.01	0.45									
10	嬰兒猝死症候群(SIDS)	1	4.83	1.05	腎炎、腎病症候群及腎病變	4	2.01	0.45									
	其他	15	72.50	15.79	其他	147	73.97	16.39	其他	8	69.05	19.51	其他	542	49.7	19.17	
出生數		20,691				198,733				11,586				1,089,818			

表3. 少年（1-14歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2008				全國 2008				高雄市 2008				日本 2007(平成19年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	64	16.20	100.00	所有死亡原因	712	18.85	100.00	所有死因	34	14.13	100.00	所有死亡原因	2,067	12.87	100.00
1	意外事故	16	4.05	25.00	意外事故	181	4.79	25.42	惡性腫瘤	8	3.32	23.53	事故傷害	451	2.81	21.82
2	惡性腫瘤	11	2.78	17.19	惡性腫瘤	111	2.94	15.59	先天性畸形變形 及染色體異常	3	1.25	8.82	惡性腫瘤	292	1.82	14.13
3	先天性畸形變形 及染色體異常	9	2.28	14.06	先天性畸形變形 及染色體異常	52	1.38	7.30	肺炎	3	1.25	8.82	先天性畸形	158	0.98	7.64
4	心臟疾病(高血壓 性疾病除外)	7	1.77	10.94	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)	27	0.71	3.79	意外事故	3	1.25	8.82	心臟疾病	127	0.79	6.14
5	加害(他殺)	2	0.51	3.13	加害(他殺)	20	0.53	2.81	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)	2	0.83	5.88	白血病	108	0.67	5.22
6	源於周產期的特 定病況	1	0.25	1.56	肺炎	18	0.48	2.53	腦血管疾病	2	0.83	5.88	肺炎	108	0.67	5.22
7	腦血管疾病	1	0.25	1.56	敗血症	15	0.40	2.11	肇因於吸入外物 之肺部病況(塵肺 症及肺炎除外)	1	0.42	2.94	自殺	47	0.29	2.27
8	慢性下呼吸道疾 病	1	0.25	1.56	骨骼肌肉系統及 結締組織之疾病	15	0.40	2.11	骨骼肌肉系統及 結締組織之疾病	1	0.42	2.94				
9	敗血症	1	0.25	1.56	腦血管疾病	11	0.29	1.54	敗血症	1	0.42	2.94				
10	蓄意自我傷害(自 殺)	1	0.25	1.56	蓄意自我傷害(自 殺)	9	0.24	1.26	腎炎、腎病徵候 群及腎病變	1	0.42	2.94				
	其他	14	3.54	21.88	其他	253	6.70	35.53	其他	9	3.74	26.47	其他	776	4.83	37.54
年中人口數		395,117			3,778,132				240,634				16,055,565			

表4. 青年（15-24歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2008				全國 2008				高雄市 2008				日本 2007(平成19年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	106	32.59	100.00	所有死亡原因	1,536	46.94	100.00	所有死亡原因	94	45.35	100.00	所有死亡原因	4,648	35.14	100.00
1	意外事故	33	10.15	31.13	意外事故	741	22.65	48.24	意外事故	36	17.37	38.30	自殺	1,848	13.97	39.76
2	惡性腫瘤	16	4.92	15.09	蓄意自我傷害（自殺）	201	6.14	13.09	蓄意自我傷害（自殺）	17	8.20	18.09	事故傷害	1,200	9.07	25.82
3	蓄意自我傷害（自殺）	14	4.30	13.21	惡性腫瘤	146	4.46	9.51	惡性腫瘤	4	1.93	4.26	惡性腫瘤	408	3.08	8.78
4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	6	1.84	5.66	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	56	1.71	3.65	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	3	1.45	3.19	心臟疾病	246	1.86	5.29
5	先天性畸形變形及染色體異常	6	1.84	5.66	先天性畸形變形及染色體異常	30	0.92	1.95	先天性畸形變形及染色體異常	2	0.96	2.13	白血病	119	0.90	2.56
6	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	3	0.92	2.83	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	26	0.79	1.69	結核病	2	0.96	2.13	腦血管疾病	65	0.49	1.40
7	加害(他殺)	2	0.61	1.89	加害（他殺）	26	0.79	1.69	腦血管疾病	2	0.96	2.13	肺炎	62	0.47	1.33
8	肺炎	2	0.61	1.89	腦血管疾病	14	0.43	0.91	加害(他殺)	1	0.48	1.06				
9	人類免疫缺乏病毒(HIV)疾病	1	0.31	0.94	肺炎	14	0.43	0.91	肺炎	1	0.48	1.06				
10	皮膚及皮下組織疾病	1	0.31	0.94	敗血症	11	0.34	0.72	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	1	0.48	1.06				
	其他	22	6.76	20.75	其他	271	8.28	17.64	其他	25	12.06	26.60	其他	700	5.29	15.06
年中人口數		325,271			3,272,088			207,287			13,225,664					

表5. 壯年（25-44歲）主要死亡原因比較

順位	臺北市 2008				全國 2008				高雄市 2008				日本 2007(平成19年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比
	所有死亡原因	798	96.39	100.00	所有死亡原因	11,075	145.35	100.00	所有死亡原因	702	135.26	100.00	所有死亡原因	26,794	78.77	100.00
1	惡性腫瘤	228	27.54	28.57	惡性腫瘤	2,732	35.85	24.67	惡性腫瘤	190	36.61	27.07	自殺	8,297	24.39	30.97
2	蓄意自我傷害 (自殺)	144	17.39	18.05	意外事故	1,707	22.40	15.41	蓄意自我傷害 (自殺)	108	20.81	15.38	惡性腫瘤	5,668	16.66	21.15
3	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)	88	10.63	11.03	蓄意自我傷害(自殺)	1,644	21.58	14.84	意外事故	82	15.80	11.68	事故傷害	2,759	8.11	10.30
4	意外事故	76	9.18	9.52	慢性肝病及肝硬化	891	11.69	8.05	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)	39	7.51	5.56	心臟疾病	2,802	8.24	10.46
5	腦血管疾病	30	3.62	3.76	心臟疾病(高血 壓性疾病除外)	710	9.32	6.41	慢性肝病及肝硬化	37	7.13	5.27	腦血管疾病	1,704	5.01	6.36
6	慢性肝病及肝硬化	30	3.62	3.76	腦血管疾病	436	5.72	3.94	腦血管疾病	24	4.62	3.42				
7	糖尿病	14	1.69	1.75	糖尿病	215	2.82	1.94	肺炎	15	2.89	2.14				
8	骨骼肌肉系統及 結締組織之疾病	12	1.45	1.50	肺炎	160	2.10	1.44	敗血症	10	1.93	1.42				
9	敗血症	12	1.45	1.50	敗血症	133	1.75	1.20	糖尿病	8	1.54	1.14				
10	肺炎	10	1.21	1.25	骨骼肌肉系統及 結締組織之疾病	111	1.46	1.00	人類免疫缺乏病 毒(HIV)疾病	6	1.16	0.85				
	其他	154	18.60	19.30	其他	2,336	30.66	21.09	其他	183	35.26	26.07	其他	5,564	16.36	20.77
年中人口數		827,928			7,619,768				518,989				34,014,330			

表6. 中年人口(45-64歲)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2008				全國 2008				高雄市 2008				日本 2007(平成19年)				
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死 亡 百分比	
	所有死亡原因	2,852	386.04	100.00	所有死亡原因	31,684	549.57	100.00	所有死亡原因	2,301	572.67	100.00	所有死亡原因	147,810	430.18	100.00	
1	惡性腫瘤	1,286	174.07	45.09	惡性腫瘤	12,725	220.72	40.16	惡性腫瘤	1,007	250.62	43.76	惡性腫瘤	66,405	193.26	44.93	
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	334	45.21	11.71	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	2,828	49.05	8.93	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	134	33.35	5.82	心臟疾病	17,595	51.21	11.90	
3	腦血管疾病	175	23.69	6.14	慢性肝病及肝硬化	2,079	36.06	6.56	腦血管疾病	121	30.11	5.26	腦血管疾病	12,798	37.25	8.66	
4	蓄意自我傷害(自殺)	127	17.19	4.45	意外事故	1,949	33.81	6.15	慢性肝病及肝硬化	119	29.62	5.17	自殺	11,995	34.91	8.12	
5	糖尿病	107	14.48	3.75	腦血管疾病	1,944	33.72	6.14	糖尿病	119	29.62	5.17	事故傷害	6,392	18.60	4.32	
6	慢性肝病及肝硬化	106	14.35	3.72	糖尿病	1,630	28.27	5.14	蓄意自我傷害(自殺)	110	27.38	4.78					
7	意外事故	90	12.18	3.16	蓄意自我傷害（自殺）	1,406	24.39	4.44	意外事故	86	21.40	3.74					
8	腎炎、腎病徵候群及腎病變	78	10.56	2.73	肺炎	709	12.30	2.24	肺炎	73	18.17	3.17					
9	肺炎	62	8.39	2.17	腎炎、腎病症候群及腎病變	663	11.50	2.09	腎炎、腎病徵候群及腎病變	49	12.20	2.13					
10	敗血症	42	5.69	1.47	敗血症	488	8.46	1.54	高血壓性疾病	36	8.96	1.56					
	其他	445	60.23	15.60	其他	5,263	91.29	16.61	其他	447	111.25	19.43					其他
年中人口數		738,785				5,765,254				401,801				34,359,704			

表7.老年人口 (65歲以上)主要死亡原因比較

順位	臺北市 2008				全國 2008				高雄市 2008				日本 2007(平成19年)			
	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百 分 比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百 分 比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百 分 比	死亡原因	死亡 人數	每十萬 人 口 死亡率	死 亡 百 分 比
	所有死亡原因	11,204	3,515.04	100.00	所有死亡原因	96,379	4,062.07	100.00	所有死亡原因	5,845	4,080.95	100.00	所有死亡原因	923,666	3,377.54	100.00
1	惡性腫瘤	2,926	917.98	26.12	惡性腫瘤	23,195	977.60	24.07	惡性腫瘤	1,484	1,036.12	25.39	惡性腫瘤	263,658	964.11	28.54
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	1,577	494.75	14.08	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	12,087	509.43	12.54	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	680	474.77	11.63	心臟疾病	154,662	565.55	16.74
3	腦血管疾病	992	311.22	8.85	腦血管疾病	8,254	347.88	8.56	肺炎	545	380.52	9.32	腦血管疾病	112,418	411.08	12.17
4	肺炎	871	273.26	7.77	肺炎	7,739	326.17	8.03	腦血管疾病	419	292.54	7.17	肺炎	106,113	388.02	11.49
5	糖尿病	595	186.67	5.31	糖尿病	6,187	260.76	6.42	糖尿病	415	289.75	7.10	老邁	30,727	112.36	3.33
6	敗血症	456	143.06	4.07	慢性下呼吸道疾病	4,921	207.40	5.11	慢性下呼吸道疾病	296	206.67	5.06	事故傷害	26,994	98.71	2.92
7	慢性下呼吸道疾病	425	133.34	3.79	腎炎、腎病症候群及腎病變	3,243	136.68	3.36	腎炎、腎病症候群及腎病變	201	140.34	3.44	自殺	8,476	30.99	0.92
8	腎炎、腎病症候群及腎病變	405	127.06	3.61	高血壓性疾病	2,954	124.50	3.06	高血壓性疾病	146	101.94	2.50				
9	高血壓性疾病	327	102.59	2.92	敗血症	2,881	121.43	2.99	敗血症	136	94.95	2.33				
10	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	235	73.73	2.10	意外事故	2,447	103.13	2.54	慢性肝病及肝硬化	130	90.77	2.22				
	其他	2,395	751.38	21.38	其他	22,471	947.08	23.32	其他	1,393	972.59	23.83	其他	220,618	806.73	23.89
年中人口數		318,745			2,372,658				143,227				27,347,290			

【附錄6】97年臺北市行政區別衛生統計指標

一、臺北市行政區別衛生統計指標 — 人口統計

中華民國97年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
土地面積		km ²	271.80	9.29	11.21	11.36	13.68	7.61	5.68	8.85	31.51	21.84	31.58	62.37	56.82
人口密度		人/km ²	9,650	22,621	20,323	27,624	15,995	20,946	21,940	21,504	8,306	5,204	8,449	4,587	4,395
年底人數	合計	人數	2,622,923	210,097	227,770	313,848	218,841	159,337	124,653	190,361	261,719	113,672	266,808	286,065	249,752
	男	人數	1,270,948	99,694	110,435	148,315	103,630	77,129	61,723	95,729	127,422	56,354	129,257	139,660	121,600
	女	人數	1,351,975	110,403	117,335	165,533	115,211	82,208	62,930	94,632	134,297	57,318	137,551	146,405	128,152
	男女性比例	男 / 女	94.01	90.30	94.12	89.60	89.95	93.82	98.08	101.16	94.88	98.32	93.97	95.39	94.89
人口變動	出生數	人數	20,691	1,551	1,885	2,249	1,752	1,109	959	1,617	2,126	1,018	2,196	2,205	2,024
	死亡數	人數	15,606	1,087	1,383	1,783	1,321	1,011	928	1,565	1,428	639	1,203	1,677	1,581
	粗出生率	‰	7.88	7.37	8.26	7.15	8.01	6.96	7.65	8.45	8.12	8.95	8.25	7.69	8.10
	粗死亡率	‰	5.94	5.16	6.06	5.67	6.04	6.34	7.40	8.18	5.46	5.62	4.52	5.85	6.33
	人口增加率	‰	-2.41	-4.21	-4.80	-3.42	1.64	-0.93	-11.69	-10.96	0.20	-0.39	4.86	-3.42	-0.90
	自然增加率	‰	1.94	2.20	2.20	1.48	1.97	0.61	0.25	0.27	2.67	3.33	3.73	1.84	1.77
	社會增加率	‰	-4.35	-6.42	-7.00	-4.90	-0.33	-1.55	-11.94	-11.23	-2.46	-3.72	1.13	-5.27	-2.67
生育率	一般生育率	‰	28	27	30	26	29	26	28	32	29	32	28	28	29
	總生育率	‰	975	940	1,005	910	965	910	920	1,040	995	1,025	1,025	945	975
	年齡別生育率														
	15-19歲	‰	2	1	5	1	2	1	2	3	1	2	1	1	2
	20-24歲	‰	14	10	14	6	11	9	13	22	15	18	14	16	15
	24-29歲	‰	52	48	54	41	53	47	52	60	56	57	57	50	54
	30-34歲	‰	85	87	82	85	81	86	85	82	86	88	91	79	87
	35-39歲	‰	37	36	40	43	40	34	29	35	36	36	38	37	33
	40-44歲	‰	5	6	6	6	6	5	3	5	5	4	4	6	4
	45-49歲	‰	0	-	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-
人口組成 (年底)	14歲以下 (a)	人數	408,163	35,462	32,080	50,585	29,964	28,165	17,963	24,089	44,424	17,395	46,425	42,415	39,196
	15-64歲 (b)	人數	1,891,785	147,953	165,897	218,362	161,109	109,306	90,021	137,658	187,620	83,783	198,083	209,518	182,475
	65歲以上 (c)	人數	322,975	26,682	29,793	44,901	27,768	21,866	16,669	28,614	29,675	12,494	22,300	34,132	28,081
組成比 (年底)	14歲以下	%	15.56	16.88	14.08	16.12	13.69	17.68	14.41	12.65	16.97	15.30	17.40	14.83	15.69
	15-64歲	%	72.13	70.42	72.84	69.58	73.62	68.60	72.22	72.31	71.69	73.71	74.24	73.24	73.06
	65歲以上	%	12.31	12.70	13.08	14.31	12.69	13.72	13.37	15.03	11.34	10.99	8.36	11.93	11.24
	扶養比(a+c)/b	%	38.65	42.00	37.30	43.73	35.83	45.77	38.47	38.29	39.49	35.67	34.70	36.53	36.87
	老化指數c/a	%	79.13	75.24	92.87	88.76	92.67	77.64	92.80	118.78	66.80	71.83	48.03	80.47	71.64

二、臺北市行政區別衛生統計指標 — 醫療資源

中華民國97年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
醫療及醫事機構	醫院	家數	40	6	2	5	4	4	2	5	2	1	3	1	5
	診所	家數	2,970	257	258	607	376	232	164	178	175	60	199	294	170
	護產機構	家數	77	7	5	11	14	5	5	3	5	2	4	9	7
	精神復建機構	家數	49	2	1	3	7	4	1	4	6	2	3	7	9
	其他醫療及醫事機構	家數	109	13	8	19	14	13	10	8	4	2	6	9	3
	非醫事機構	家數	558	22	36	57	48	26	29	74	24	46	74	80	42
	藥商	家數	10,527	1,227	897	1,652	1,657	1,005	756	543	491	282	795	735	487
病床數	醫院病床	床	23,262	1,816	796	1,741	1,704	3,269	3,853	606	908	50	2,294	1,173	5,052
	一般急性床	床	21,053	1,458	675	1,436	1,371	3,041	3,698	503	849	35	2,138	921	4,928
	一般慢性床	床	14,874	815	460	1,061	853	2,260	2,595	275	589	30	1,576	586	3,774
	特殊病床	床	815	141	-	-	20	-	175	98	-	-	-	-	381
	診所病床	床	5,364	502	215	375	498	781	928	130	260	5	562	335	773
		床	2,209	358	121	305	333	228	155	103	59	15	156	252	124
		床													
醫事人力 (醫療及醫事機構)	醫師	人	42,447	3,074	2,104	4,862	4,053	5,712	4,722	1,363	2,063	389	3,485	3,038	7,582
	西醫師	人	11,059	828	649	1,464	998	1,577	1,096	352	580	92	941	808	1,674
	中醫師	人	7,877	465	382	871	654	1,280	880	217	374	41	709	544	1,460
	牙醫師	人	730	68	68	98	72	64	112	43	55	8	39	55	48
	藥事人員	人	2,452	295	199	495	272	233	104	92	151	43	193	209	166
	護產人員	人	4,944	492	365	653	633	530	421	233	257	93	411	328	528
	醫檢人員	人	21,915	1,443	929	2,157	2,028	2,972	2,668	649	988	188	1,752	1,639	4,502
	其他	人	2,761	164	93	337	245	469	340	59	110	2	241	137	564
		人	1,768	147	68	251	149	164	197	70	128	14	140	126	314
		人													
平均 每萬人 醫療資源	醫院	家/每萬人	0.15	0.29	0.09	0.16	0.18	0.25	0.16	0.26	0.08	0.09	0.11	0.03	0.20
	診所	家/每萬人	11.32	12.23	11.33	19.34	17.18	14.56	13.16	9.35	6.69	5.28	7.46	10.28	6.81
	病床數	床/每萬人	88.69	86.44	34.95	55.47	77.86	205.16	309.10	31.83	34.69	4.40	85.98	41.00	202.28
	醫事人員數	人/每萬人	161.83	146.31	92.37	154.92	185.20	358.49	378.81	71.60	78.82	34.22	130.62	106.20	303.58
	醫師	人/每萬人	42.16	39.41	28.49	46.65	45.60	98.97	87.92	18.49	22.16	8.09	35.27	28.25	67.03
	西醫師	人/每萬人	30.03	22.13	16.77	27.75	29.88	80.33	70.60	11.40	14.29	3.61	26.57	19.02	58.46
	中醫師	人/每萬人	2.78	3.24	2.99	3.12	3.29	4.02	8.98	2.26	2.10	0.70	1.46	1.92	1.92
	牙醫師	人/每萬人	9.35	14.04	8.74	15.77	12.43	14.62	8.34	4.83	5.77	3.78	7.23	7.31	6.65
	藥事人員	人/每萬人	18.85	23.42	16.02	20.81	28.93	33.26	33.77	12.24	9.82	8.18	15.40	11.47	21.14
	護產人員	人/每萬人	83.55	68.68	40.79	68.73	92.67	186.52	214.03	34.09	37.75	16.54	65.67	57.29	180.26
	醫檢人員	人/每萬人	10.53	7.81	4.08	10.74	11.20	29.43	27.28	3.10	4.20	0.18	9.03	4.79	22.58
	其他	人/每萬人	6.74	7.00	2.99	8.00	6.81	10.29	15.80	3.68	4.89	1.23	5.25	4.40	12.57
		人/每萬人													

三、臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計

中華民國97年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 順位	惡性腫瘤	順位	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	心臟疾病（高血壓性疾病除外）		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	腦血管疾病		3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3
	肺炎		4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4
	糖尿病		5	5	5	5	5	7	5	5	5	5	4	5	5
	敗血症	順位	6	6	6	8	7	5	6	9	7	9	6	6	8
	腎炎、腎病症候群及腎病變		7	8	7	7	8	6	8	6	6	10	8	7	6
	慢性下呼吸道疾病		8	9	8	6	10	8	7	7	9	8	11	9	7
	意外事故		9	10	10	10	13	9	11	10	8	6	9	8	11
	高血壓性疾病		10	7	9	9	11	11	10	11	10	11	10	12	10
十大死因 死亡率	所有死因	人/每十萬人口	575.72	502.04	587.77	545.51	578.06	600.33	712.18	784.68	530.39	553.24	444.46	576.50	615.13
	惡性腫瘤		170.10	145.34	173.88	159.36	174.70	190.07	212.93	205.83	162.79	163.60	137.51	165.76	185.70
	心臟疾病（高血壓性疾病除外）		76.69	66.50	79.28	75.39	76.37	79.67	94.11	106.05	71.84	65.97	57.48	80.61	77.64
	腦血管疾病		45.66	41.32	50.37	41.67	51.22	44.54	51.84	53.29	38.98	45.74	37.95	45.02	52.83
	肺炎		36.18	29.92	38.10	29.26	32.01	43.91	48.65	57.99	32.86	51.01	23.67	33.85	36.82
	糖尿病		27.26	23.27	22.34	23.54	31.56	18.82	43.86	45.97	22.93	27.27	25.55	26.17	26.41
	敗血症	人/每十萬人口	19.53	21.85	20.59	17.18	16.92	25.72	25.52	24.03	17.20	16.71	15.78	20.59	18.01
	腎炎、腎病症候群及腎病變		18.70	14.72	20.59	17.49	16.46	21.96	18.34	31.87	17.58	16.71	12.40	18.50	20.81
	慢性下呼吸道疾病		16.98	12.82	19.71	20.04	13.72	13.80	20.74	26.12	14.52	17.59	10.52	16.05	20.41
	意外事故		14.81	10.45	14.89	14.31	8.23	13.17	16.75	23.51	15.67	21.11	12.40	17.10	14.41
	高血壓性疾病		14.24	17.57	17.96	14.31	11.43	11.92	16.75	20.37	13.37	13.19	10.52	10.82	15.21

三、臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續1)

中華民國97年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
十大死因 標準化 死亡率 (2000世 界人口為 基準)	所有死亡原因	人/每十 萬人口	366.18	305.11	350.41	288.84	365.58	331.54	452.82	450.30	355.06	404.97	378.30	389.90	426.24
	惡性腫瘤		112.87	90.74	110.89	90.51	114.39	111.73	139.52	122.62	118.80	121.11	118.35	113.15	131.99
	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）		46.14	37.91	43.10	36.28	45.89	42.36	58.79	56.99	44.69	44.97	49.08	51.65	51.94
	腦血管疾病		27.26	24.08	27.10	20.32	31.21	21.19	30.62	28.82	24.05	32.00	31.77	28.91	34.85
	肺炎		20.14	17.22	19.25	11.80	18.02	19.59	27.90	28.01	19.04	35.70	19.12	20.06	22.98
	糖尿病		16.89	13.53	12.74	12.29	19.49	10.26	28.02	24.11	14.47	20.03	22.23	17.02	17.15
	敗血症	人/每十 萬人口	11.27	12.07	10.86	7.80	9.68	12.83	14.71	11.95	11.44	11.78	12.45	12.75	11.54
	腎炎、腎病症候群 及腎病變		11.20	8.71	11.95	8.53	9.55	10.66	11.73	16.89	11.13	12.35	10.01	11.53	13.80
	慢性下呼吸道疾病		9.27	6.32	9.97	8.79	7.78	6.08	11.40	12.13	8.46	11.63	8.83	9.28	12.66
	意外事故		11.94	8.37	11.03	10.65	6.75	11.18	11.45	17.52	13.19	17.83	11.36	15.45	11.60
	高血壓性疾病		8.21	9.93	9.81	6.48	6.27	5.90	10.00	9.94	8.59	8.76	8.17	6.70	10.01
十大死因 標準化 死亡率 區排名 (2000世 界人口為 基準)	所有死亡原因	人/每十 萬人口		11	9	12	7	10	1	2	8	4	6	5	3
	惡性腫瘤			11	10	12	7	9	1	3	5	4	6	8	2
	心臟疾病（高血壓 性疾病除外）			11	9	12	6	10	1	2	8	7	5	4	3
	腦血管疾病			9	8	12	4	11	5	7	10	2	3	6	1
	肺炎			11	7	12	10	6	3	2	9	1	8	5	4
	糖尿病			9	10	11	5	12	1	2	8	4	3	7	6
	敗血症	人/每十 萬人口		5	10	12	11	2	1	6	9	7	4	3	8
	腎炎、腎病症候群 及腎病變			11	4	12	10	8	5	1	7	3	9	6	2
	慢性下呼吸道疾病			11	5	8	10	12	4	2	9	3	7	6	1
	意外事故			11	9	10	12	8	6	2	4	1	7	3	5
	高血壓性疾病			4	5	10	11	12	2	3	7	6	8	9	1

三、臺北市行政區別衛生統計指標 — ICD-10死因統計(續完)

中華民國97年

		單位	臺北市	松山區	信義區	大安區	中山區	中正區	大同區	萬華區	文山區	南港區	內湖區	士林區	北投區
年齡別 死亡率	合計	人/每十 萬人口	575.72	502.04	587.77	545.51	578.06	600.33	712.18	784.68	530.39	553.24	444.46	576.50	615.13
	0		469.11	457.67	560.22	400.89	303.58	437.06	320.51	586.13	418.90	501.00	230.79	701.43	657.40
	1-4		23.18	13.83	12.83	76.75	13.97	18.18	-	-	10.32	-	10.42	10.35	69.03
	5-14		14.12	10.93	12.92	20.71	13.85	4.59	22.79	29.75	8.99	24.17	2.82	12.72	20.60
	15-24		32.59	16.80	24.97	17.43	35.31	27.47	25.93	63.86	43.10	45.96	18.11	53.63	24.46
	25-44		96.39	67.24	101.56	63.93	98.56	96.94	114.96	154.50	72.92	101.16	105.36	111.09	92.77
	45-64		386.04	339.88	319.02	276.98	426.68	352.84	572.95	519.27	371.26	431.30	349.82	387.11	452.22
	65+		3515.04	3023.15	3532.69	3091.22	3289.20	3437.85	3838.61	3874.92	3557.32	3629.41	3755.53	3551.81	4029.77
年齡別 死亡率 區排名	合計			11	5	9	6	4	2	1	10	8	12	7	3
	0			6	4	9	11	7	10	3	8	5	12	1	2
	1-4			5	6	1	4	3	10	10	9	10	7	8	2
	5-14			9	7	4	6	11	3	1	10	2	12	8	5
	15-24			12	8	11	5	6	7	1	4	3	10	2	9
	25-44			11	5	12	7	8	2	1	10	6	4	3	9
	45-64			10	11	12	5	8	1	2	7	4	9	6	3
	65+			12	8	11	10	9	3	2	6	5	4	7	1

中華民國 97 年 臺北市生命(死因)統計

刊期頻率/ 一年

出版機關/ 臺北市政府衛生局 網址 www.health.gov.tw

發行人/ 邱文祥

編輯/ 臺北市政府衛生局統計室

地址：臺北市市府路 1 號東南區 2 樓

電話：1999(外縣市 02-27208889)轉 7139

出版日期/ 中華民國 98 年 8 月

創刊日期/ 中華民國 88 年 9 月

印刷者/ 九茹印刷有限公司

電話：(02)2966-0816
