

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

衛生福利部 114 年度專科護理師甄審筆試試題本

報考科別：麻醉科

科目：專科護理通論

【注意事項】

1. 請核對考試科目與報考類別是否相符。
2. 請檢查答案卡、座位及入場證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
3. 本試卷共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試卷最後一題後面有備註【以下空白】。
4. 本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 2B 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
5. 有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
6. 本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
7. 請在試卷首頁入場證號碼之方格內，填上自己的入場證號碼。

入場證號碼：

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫入場證號碼，再翻閱試題本作答。

1. 對於專科護理師職責之敘述，下列何者錯誤？
(A) 協調擬定內外科病人住院相關檢查與治療計畫
(B) 幫助安寧緩和病人的家屬面對失落與哀傷歷程
(C) 開立安養機構病人的治療計畫與用藥醫囑
(D) 提供個人、家庭或團體在社區心理衛生照護
2. 依據衛生福利部對「專科護理師」的角色定位，下列何者最適當？
(A) 接受完整訓練後，可獨立執行醫療業務
(B) 與醫師共同提供連續性護理與醫療照護
(C) 實質工作內容主要在取代住院醫師角色
(D) 核心目標是成為醫療輔助性專業人力
3. 目前處於資訊科技主導之際，護理專業對「聰明工作」的描述，下列何者錯誤？
(A) 所有措施皆具理論或實證依據 (B) 追求高品質且省時之護理成效
(C) 包含護理行政與技術層面創新 (D) 以人工智慧作為照顧決策核心
4. 下列何者較不屬於臨床照護實證護理知識之應用？
(A) 臨床照護指引 (clinical practice guidelines, CPG)
(B) 醫病共享決策 (shared decision-making, SDM)
(C) 臨床路徑 (clinical pathway)
(D) 護理資訊系統 (nursing information system, NIS)
5. 專科護理師執行溝通協調之原則，下列敘述何者最不適當？
(A) 有效的溝通可促進跨專業團隊間訊息的傳達與共享
(B) 運用安撫技巧雖能減輕衝突情緒，但難以解決根本問題
(C) 面對不想解決的警覺性衝突，擴大衝突點是必要方式
(D) 協力合作 (collaboration) 是一種正向的合作途徑
6. 有關「善用沉默」的治療性溝通技巧，下列敘述何者最不適當？
(A) 沉默時雖沒有語言內容，卻有非語言訊息在進行
(B) 不想說話時可以沉默溝通方式來進行
(C) 可應用於試圖重整溝通對象的想法時
(D) 可安靜、關心地陪伴在病人身旁
7. 對 84 歲肺癌第三期病人與家屬進行預立醫療指示 (advance care planning, ACP) 諮詢，下列執行過程何者較不適當？
(A) 除病人外，需有三親等內親屬 (至少 1 人) 參加
(B) 幫助病人與家屬釐清資訊不清、焦慮與治療抉擇困難
(C) 與病人討論感受與目標，提供緩和醫療資源資訊
(D) ACP 的立法目的是為了尊重病人醫療自主意願
8. 專科護理師對中風後病人進行出院準備服務諮商，下列何者較不適當？
(A) 應事先評估病人與家屬對疾病歷程了解程度
(B) 需考慮病人特殊文化背景、對需求的表達方式
(C) 應直接轉介腦中風個案管理師接手後續規劃
(D) 需觀察病人與家屬所表現之非語言行為背後意涵

9. 某社區活動中心邀請專科護理師至社區進行高血壓健康教育講座，下列何者為設計課程的第一步？
- 與活動中心負責人確認講座的學習成效評量指標
 - 分析居民基本資料、文化背景及健康識能程度
 - 安排教學環境、準備教材，並設計講座舉辦方式
 - 與心血管專科醫師討論高血壓的最新治療指引
10. 有關問題導向學習(problem based learning,PBL)的說明及應用，下列何者較不適當？
- 由教師主導學習流程，帶領學習者解決真實情境的問題
 - 學習者透過團隊互動及腦力激盪，確認學習主題與目標
 - 學習者獲得的知識較為片段，學習動機為成敗的重要關鍵
 - 需耗費大量的教學資源與師資人力，具有執行的挑戰性
11. 下列何者屬於學習者認知領域的「應用」層級教學目標？
- 能舉例說明胰島素於人體的功能
 - 能依據血糖數值，正確計算應施打的胰島素劑量
 - 可辨別三項胰島素休克與高血糖昏迷的徵象
 - 能說出自己目前使用兩種胰島素的不同之處
12. 專科護理師設計 3 個月「過重成人改變錯誤飲食行為」的介入團體，目標為改變學習者的飲食行為。下列何者最適合做為第一個月參與者行為改變的評量指標？
- | | |
|-------------------|--------------------|
| (A) 體脂肪降低 2% | (B) 低密度脂蛋白降低 5% |
| (C) 完成 20 天每日飲食紀錄 | (D) 每日步行步數達 7000 步 |
13. 下列何者最能展現專科護理師角色的獨立性專業價值？
- | | |
|-------------------|-------------------|
| (A) 依據醫師的指示完成交辦任務 | (B) 舉辦健康講座提高病人滿意度 |
| (C) 協助疾病診斷並提出個人意見 | (D) 以實證為基礎提供照護與決策 |
14. 高齡臥床病人有多處嚴重壓力性損傷，此次因肺炎入院做進一步處理，下列何者最能促進醫療團隊共識及完成整體照顧計畫？
- 安排召開多科團隊個案討論會議
 - 將訊息電話告知醫師後等待評估結果
 - 先完成外科手術再通知其他科部
 - 完成相關病歷紀錄並開立照會單
15. 當專科護理師與主治醫師在病人處置意見上有分歧，下列何者溝通方式最符合正向、尊重與雙向溝通的原則？
- | | |
|------------------|------------------|
| (A) 以醫師決策為標準以免衝突 | (B) 面對面討論並尋求照顧共識 |
| (C) 在病歷上紀錄表達不同意見 | (D) 請該科部主任出面主持公道 |
16. 當與患有失智症的病人進行溝通時，下列何者最不適當？
- 保持耐心與同理心，避免催促病人
 - 使用圖片、手勢來輔助溝通，協助病人理解
 - 支持病人說出想法與困難，並給予鼓勵
 - 當病人表達錯誤時，須及時給予指正

17. 到職剛滿3個月的護理師，擬進行一位長期臥床且意識不清女性病人之尿液培養採檢，陪病家屬強烈表示希望由專科護理師來執行採檢。您是該病房的專科護理師，下列處理方式何者較適當？
- (A) 陪同護理師進行尿液培養採檢並給予協助，保持無菌技術
 - (B) 告知護理師尿液採檢是護理師的工作職責之一，讓護理師執行
 - (C) 為安撫家屬情緒由專科護理師進行尿液採檢，好讓家屬安心
 - (D) 請住院醫師告知家屬說明須於期限內採集檢體，以免延誤治療
18. 下列何者是臨床指引之評析工具？
- (A) Cochrane Rob 2.0
 - (B) Oxford systematic reviews - critical appraisal sheet
 - (C) AGREE II
 - (D) JBI checklist for quasi - experimental studies
19. 25歲病人術後第2天，傍晚開始持續腹痛，專科護理師評估後懷疑有腸阻塞現象，建議值班住院醫師開立腹部X光檢查與禁食。但住院醫師表示：「不急，先試著進食看看再說。」專科護理師擔心延誤處理可能影響病人安全，請問此時最符合專業倫理與團隊合作原則的應對為何？
- (A) 立即代替醫師開立腹部X光檢查與禁食醫囑，避免延誤
 - (B) 應尊重醫師判斷，雖不同意也不應過度干預
 - (C) 基於臨床經驗，向病人說明應禁食並先暫停飲食
 - (D) 與醫師詳細討論病況並提出建議，必要時通報主治醫師
20. 病人突發意識喪失與呼吸停止，現場僅有專科護理師與病房護理師，當下聯繫主治醫師無法即時趕到，團隊啟動緊急應變機制。專科護理師立即實施心肺復甦術，並協助正壓面罩給氣(bag-valve-mask ventilation)、給予高濃度氧氣。下列何者最符合現行法規規範？
- (A) 得於緊急時依預立醫療授權執行基本急救措施，並於事後向醫師報告
 - (B) 可於緊急情況下依臨床判斷逕行執行所有必要處置，不須向醫師報告
 - (C) 不得執行任何急救相關動作，應等待醫師到場處理
 - (D) 可因緊急狀況，執行插管或藥物注射等侵入性處置
21. 照護失智症病人時，下列何者不是友善溝通與維護尊嚴的表現？
- (A) 面帶微笑自我介紹
 - (B) 避免眼神直接注視
 - (C) 避免糾正不合時宜的話語
 - (D) 耐心傾聽並放慢速度回覆
22. 病人於1PM術後返回病房，專科護理師依指示開立Primperan® 10 mg / 2 mL IV push stat，預防術後腸胃不適。5PM專科護理師瀏覽病歷，發現護理師尚未依醫囑完成該藥物注射。依護理倫理規範，專科護理師下列做法何者最適當？
- (A) 提醒護理師，請其立即依醫囑完成藥物注射
 - (B) 將藥物自醫囑中刪除
 - (C) 告知護理師其疏失，並主動通報給藥異常事件
 - (D) 修改藥物開立時間，請護理師立即完成給藥

23. 衛生福利部規劃的「護理輔佐人力制度」中，對於「照護輔佐(nurse aide)」與「護理助理(nursing associate)」這兩種人員的職能角色與工作內容之敘述，下列何者**錯誤**？
- (A)「照護輔佐」的職能角色定位為生活照護導向，主要提供住院病人身體清潔、進食等輔助照護
 - (B)「照護輔佐」的工作內容涵蓋協助管灌食與體溫量測，但這些項目需經醫院教育訓練並通過技術評核後方可執行
 - (C)「護理助理」的職能角色定位為護理輔助導向，可與護理師合作執行輔助護理業務
 - (D)「護理助理」在護理師指導下，可執行簡單傷口換藥等侵入性與風險較高之照護技術
24. 王護理師已領有護理師證書並從事臨床護理工作3年。她計畫開設「居家護理所」，並希望自己能擔任該機構的負責資深護理人員。也考慮在未來進修成為專科護理師，以擴大服務範圍。依現行法規，下列何者最為正確？
- (A)目前王護理師已領有護理師證書並完成執業登記，即可擔任居家護理所的負責資深護理人員
 - (B)王護理師若要取得專科護理師證書，必須先完成專科護理師訓練，並經中央主管機關甄審合格
 - (C)居家護理所設立後，若其負責資深護理人員因故不能執行業務超過1個月，需內部指定代理人，代理期間最長可達2年
 - (D)服務對象有醫療需求，該所專科護理師在監督醫師未親自在場的情況下，可直接執行所有侵入性醫療業務，無需醫師當面指示
25. 急救責任醫院(A醫院)目前因設備維護，無法提供嚴重外傷病人之必要處置，A醫院的後送醫院(B醫院)能提供該項服務。依據民國102年「緊急醫療救護法」及「緊急傷病患轉診實施辦法」規定，下列何者最適當？
- (A)A醫院應立即將病人轉診至B醫院，無需事先告知病人家屬轉診原因或取得其書面同意，以爭取黃金救命時間
 - (B)A醫院應先對病人進行必要之穩定處置，說明原因並取得書面轉診同意，聯繫B醫院進行轉診
 - (C)A醫院因設備故障及人力不足，可以直接拒絕收治該病人，並要求救護車將病人直接送往B醫院
 - (D)A醫院可直接將病人轉診至B醫院，但B醫院有權視自身病人負荷量或人力狀況，決定是否接受此轉診
26. 王小華護理師於114年8月10日在台中醫學中心完成專科護理師訓練，並獲得醫院核發完訓證明。未取得執照前，因故欲南下至具專科護理師訓練醫院資格的高雄醫院擔任專科護理師，下列敘述何者正確？
- (A)高雄醫院可安排其接受專科護理師補充訓練
 - (B)其可於高雄醫院執行「專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法」之醫療業務
 - (C)台中醫學中心可視其狀況，安排每週1日補充訓練至115年6月30日
 - (D)其可報名參加114年8月30日舉辦之專科護理師甄審考試

27. 依據民國 112 年修訂「專科護理師分科及甄審辦法」，下列敘述何者正確？
- (A) 證書效期屆期未更新，即喪失專科護理師資格，需重新接受訓練並通過甄審，始得恢復專科護理師身份
 - (B) 如有特殊原因，無法在證書效期屆滿前完成 6 年 120 點繼續教育積分，可向地方衛生主管機關申請延期更新
 - (C) 經核准證書延期更新者，應自效期屆至日起 6 個月內檢具 6 年 120 點繼續教育積分申請證書更新，屆期未更新，專科護理師證書自動失效
 - (D) 於中央主管機關認定之醫療資源不足地區執業或因公派駐國外從事外交有關國際醫療之專科護理師，其繼續教育課程積分，得加倍採計
28. 病人家屬在病房情緒失控並推倒工作中之專科護理師，雖然專科護理師表示體諒家屬情緒不希望追究，此時醫療機構採取何種處置最適當？
- (A) 應將加害人姓名、特徵公布大廳明顯處，以防止其他人被傷害
 - (B) 應邀集倫理小組會議，徵詢當事人意願後再決定是否通報
 - (C) 應尊重該醫護人員不提告之意願，決定不通報
 - (D) 應立即通報警察機關，並啟動保護與關懷機制
29. 有關專科護理師執業規範之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 執業範圍包括：健康問題之護理評估、預防保健之護理措施、護理指導及諮詢、醫療輔助行為及專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法之醫療業務
 - (B) 113 年新增家庭科專科護理師，係為拓展在社區以人口群為基礎之健康照護角色功能，其執業場域限於社區，不得於醫院執業
 - (C) 取得美國專科護理師證書並在美國實際執業多年，返國後仍需重新考取我國專科護理師證書，才能執行專科護理師業務
 - (D) 進階藥理、病理及生理為基礎之分析判斷、臨床推理及醫療照護之能力是專科護理師執業應具備核心能力
30. 證據品質評估以 GRADE 系統評核隨機對照研究，下列何者不是降級因素？
- (A) 偏差風險
 - (B) 不一致性
 - (C) 結果不顯著
 - (D) 出版偏差
31. 末期病人表達疼痛與不適時，下列何者最能展現專科護理師之臨床倫理與專業角色？
- (A) 面對病人疼痛主訴時，可建議儘量忍耐以避免過度使用藥物而產生依賴
 - (B) 主動對病人表示安慰，並建議使用坊間草藥與輔助療法作為止痛選項之一
 - (C) 協助病人與家屬了解病情與安寧療護選項，並依醫療團隊討論擬定止痛計畫
 - (D) 為了立即減輕病人痛苦，可先調整鎮痛藥劑量，再跟醫師報備
32. 有關專科護理師於長期照顧體系中的角色，下列敘述何者較不適當？
- (A) 參與出院準備服務，協助病人銜接社區照護資源
 - (B) 評估高齡與失能個案之身心功能，擬定照護計畫
 - (C) 於社區據點提供衛教、健康促進與慢性病追蹤服務
 - (D) 只能擔任行政管理職務，但不提供直接照護
33. 根據 2025 年美國糖尿病學會照護指引，下列何者最不符合該指引對糖尿病病人之整體飲食建議？
- (A) 不鼓勵以市售營養飲料來維持主要的能量與營養
 - (B) 鼓勵以動物性優質蛋白來取代植物性蛋白質，如豆腐、黃豆等
 - (C) 建議病人以代糖飲品如無糖可樂取代含糖飲料以降低碳水攝取
 - (D) 強調均衡飲食與代謝目標並重，避免採用特殊飲食，如生酮飲食

34. 李小姐 BMI 為 29 kg/m^2 ，想減重但常因工作忙碌無法持續運動。她表示：「我已經下載健身 App，每天早上做個 15 分鐘，但週末常懶得動」。依據跨理論模式 (transtheoretical model, TTM)，下列哪一階段最符合她目前的狀態？
- (A) 前預備期 (precontemplation stage) (B) 預備期 (contemplation stage)
 (C) 行動期 (action stage) (D) 維持期 (maintenance stage)
35. 專科護理師想用實證手法回答「新生兒注射維生素 K1，是否會增加兒童期罹患白血病的風險」，在實證問題的提問類型中是屬於下列何種？
- (A) 介入型 (intervention) (B) 病因型 (etiology)
 (C) 診斷型 (diagnosis) (D) 預後型 (prediction/prognosis)
36. 專科護理師想探討苦瓜製劑/萃取物能否降低第二型糖尿病成人之血糖，有關此臨床問題形成的 P : population、I : intervention、C : comparison、O : outcome 之敘述，下列何者錯誤？
- (A) P : 第二型糖尿病成人 (B) I : 苦瓜製劑/萃取物
 (C) C : 口服降血糖藥物 (D) O : 飯後血糖值、糖化血色素
37. 有關臨床照護指引發展準則的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 敘述發展成員的組成不建議納入病人與家屬，避免影響指引發展的客觀性
 (B) 指定指引和指引發展經費來源必須詳細說明，並向大眾公開
 (C) 敘述發展成員應使用系統性文獻回顧的標準格式及評價
 (D) 建議內容應以標準化格式呈現，詳細說明建議的措施是什麼，以及在什麼情況下執行
38. Irvine 等學者於 1998 年提出「護理角色有效模式概念架構」，分為結構面、過程面、結果面，下列何者不屬於「結果面」的指標？
- (A) 中心靜脈導管相關血流感染率 (B) 非計畫性氣管內管滑脫發生率
 (C) 護理人員離職率 (D) 一般病房住院跌倒發生率
39. 某內科病房住院病人一般壓力性損傷發生率超過閾值，單位品質改善小組要監測「住院病人預防壓力性損傷照護執行完整率」過程的資料來源應包括：
- (A) ①皮膚觀察 ②訪談病人家屬 ③護理紀錄 ④病人滿意度 ⑤異常事件報告
 (B) ①③④
 (C) ①③⑤
 (D) ②④⑤
40. 臨床護理品質關鍵性指標包括顧客、內部流程、學習成長及財務四大構面，下列何者不屬於內部流程指標？
- (A) 臨床警示之反應 (B) 意外事件導致傷害事件
 (C) 血流管路照護 (D) 呼吸道照護
41. 管制圖係由修華特 (Shewhart) 所發明，其利用統計方法將所蒐集的資料算出管制界限，以管制及判斷是否有變異發生。管制界限通常為平均值加減 (+/-) 幾個標準差？
- (A) 1 個 (B) 2 個 (C) 3 個 (D) 4 個
42. 判斷臨床護理品質管理指標四大準則，分別為高危險活動 (high risk activities)、高等量活動 (high volume activities)、高成本活動 (high cost activities) 及具有問題傾向的活動 (problem prone activities)，下列各項護理活動所對應的準則，何者正確？
- (A) 護理人員執行化學治療 - 高危險活動 (B) 輸血 - 高等量活動
 (C) 靜脈注射給藥 - 高成本活動 (D) 病人皮膚照護 - 具有問題傾向的活動

52. 有關氧合血紅素解離曲線的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 溫度降低時，常見曲線右移
- (B) pH上升時，常見曲線左移
- (C) 曲線左移表示血紅素與氧氣親和力增加
- (D) 曲線右移有利於血紅素將氧氣釋放

53. 有關常見的氣道評估方式，下列何者錯誤？

- (A) Mallampati 分級：病人臥姿，張口吐舌，發出啊聲
- (B) 下頷突出測試可評估下頷活動度與上下門牙相對位置
- (C) 上下門牙間隙(張口距離)小於兩指幅提示可能張口受限
- (D) Cormack - Lehane 分級是喉頭鏡下評估聲門可見程度的分級方式

54. 有關麻醉機中二氧化碳吸收劑的使用，下列何者正確？

- (A) 吸收劑的主要功能是吸收新鮮氣體中的二氧化碳
- (B) 若麻醉機型號為雙罐系統，則應同時更換兩個吸收罐
- (C) 當二氧化碳吸收劑恢復為原色時，即代表完全恢復吸收能力
- (D) 若麻醉機長時間未使用，仍應維持微量氣流通過避免吸收劑乾燥

55. 有關功能肺餘量(functional residual capacity , FRC)和閉合容量(closing capacity , CC)的敘述，下列何者正確？

- (A) 仰臥位與麻醉會使FRC增加，改善氧合情形
- (B) 懷孕會使CC減少，因此更容易導致小氣道閉合
- (C) 當CC大於FRC時，小氣道會在正常呼吸周期中提早關閉
- (D) FRC與CC均隨年齡下降，因此高齡病人較不易發生氣道閉合

56. 有關慢性阻塞性肺病的術前評估，下列何者錯誤？

- (A) 術前應常規安排肺功能檢查以評估疾病嚴重程度
- (B) 術前應鼓勵病人戒菸使肺功能達到最佳化
- (C) 懷疑感染或氣胸時應安排胸部X光片檢查
- (D) 病人若缺氧或需要使用氧氣治療則建議進行動脈血液氣體分析

57. 有關疾病對射出分率(ejection fraction, EF)的影響，下列何者錯誤？

- | | |
|----------------------|--------------------|
| (A) 敗血症的病人通常表現為高EF | (B) 心衰竭的病人可表現為正常EF |
| (C) 二尖瓣逆流的病人通常表現為低EF | (D) 肝硬化的病人通常表現為高EF |

58. 下列何者為缺血性腦損傷之新生兒的體溫調控原則？

- (A) 術中應維持高體溫以促進代謝
- (B) 高體溫對於缺血後腦部具保護作用
- (C) 無需特別注意新生兒體溫
- (D) 輕度低體溫對缺血性損傷具保護效益

59. 在術中持續低二氧化碳血症的病人，術後照護應注意下列哪一項神經學表現？

- (A) 高血糖引起的酮酸中毒
- (B) 血氧過高造成的癲癇發作
- (C) 高腦壓導致的嗜睡與瞳孔擴大
- (D) 因腦血管收縮導致的神經功能障礙

60. 下列何者最可能發生腦盜血現象(cerebral steal phenomenon)？
(A) 慢性阻塞性肺病病史者
(B) 腦血管狹窄或動脈粥樣硬化病史者
(C) 心室早期收縮(PVCs)病史者
(D) 肝硬化與門脈高壓病史者
61. 下列何者最可能發生腦部低灌流？(MAP:mean arterial pressure；ICP:intracranial pressure)
(A) MAP=95 mmHg, ICP=20 mmHg (B) MAP=70 mmHg, ICP=10 mmHg
(C) MAP=85 mmHg, ICP=20 mmHg (D) MAP=60 mmHg, ICP=10 mmHg
62. 有關腦代謝率(cerebral metabolic rate of oxygen consumption, CMRO₂)和腦血流量(cerebral blood flow, CBF)的敘述，下列何者正確？
(A) CBF 與 CMRO₂變化無關
(B) 降低 CMRO₂會導致 CBF 上升
(C) 低體溫會降低 CMRO₂，進而降低 CBF
(D) 當 CMRO₂增加時，CBF 會下降以保護腦組織
63. 下列何者最符合 Cushing's triad？
(A) 高血壓、頻脈、潮式呼吸
(B) 低血壓、心搏過速、呼吸急促
(C) 高血壓、心搏過緩、不規則呼吸
(D) 低血壓、心律不整、呼吸急促
64. 車禍病人麻醉前評估如下：發出無意義聲音、因疼痛刺激睜眼、對疼痛刺激伸展四肢。
請問此病人的 GCS (glasgow coma scale) 總分為何？
(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12
65. 重症肌无力穩定控制的病人即將接受甲狀腺切除術，下列何者為最適當的處置？
(A) 停用所有抗膽鹼酯酶藥物
(B) 如使用 succinylcholine 應考慮加大劑量
(C) 改採局部麻醉以避免症狀加重
(D) 長效型肌肉鬆弛劑優於短效型肌肉鬆弛劑
66. 有關手術後慢性疼痛的機轉，下列何者最有可能？
(A) 抑制自主神經活動造成交感神經過度興奮
(B) 神經再生過度活化造成腦內啡耗竭
(C) 周邊及中樞神經系統的敏化反應
(D) 疼痛傳導阻斷導致反彈性疼痛加劇
67. 下列何者與胃食道逆流較不相關？
(A) 肥胖 (B) 高血壓
(C) 媽孕 (D) 食道裂孔疝氣
68. 有關糖尿病的術前評估，下列何者最不適當？
(A) 評估是否存在腎臟病變，甚至腎衰竭
(B) 評估甲狀腺功能是否正常，影響藥物代謝
(C) 評估關節活動性受限，影響氣道處置
(D) 考慮是否存在胃輕癱，增加胃內容物吸入的風險

69. 有關嗜鉻細胞瘤和副神經節瘤的術前評估，下列何者錯誤？

- (A) 主要目標是盡量減少兒茶酚胺激增並評估終末器官損傷
- (B) 術前應進行心電圖和超音波心臟檢查以評估心血管功能
- (C) 術前應至少進行 7 至 14 天的 α 腎上腺素受體阻斷劑治療
- (D) 建議病人在手術前應攝取低鈉飲食和限制液體攝取

70. 有關腎功能的術前評估，下列何者正確？(血清肌酸酐：serum creatinine；BUN：blood urea nitrogen；GFR：腎絲球過濾率)

- (A) 血清肌酸酐濃度能夠可靠地偵測出輕微的腎功能障礙
- (B) 相較於血清肌酸酐或 BUN，肌酸酐清除率是衡量 GFR 更可靠的指標
- (C) BUN 濃度主要受腎功能影響，不受飲食或水合狀態的影響
- (D) 血清肌酸酐濃度無法反映肌肉生產肌酸酐與腎臟排泄之間的平衡

71. 有關 sugammadex (Bridion[®]) 的敘述，下列何者錯誤？

- (A) sugammadex 可安全使用於氣道敏感的病人
- (B) sugammadex 80% 主要經由肝臟代謝排除
- (C) 即使深層的阻斷也能依適當劑量來恢復
- (D) sugammadex 對 cisatracurium 無效

72. 有關惡性高熱的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 會被 succinylcholine 及揮發性麻醉藥誘發
- (B) 體溫升高是最敏感且具特異性的早期症狀
- (C) 一旦發生後應立即給予 dantrolene 治療
- (D) 是因為肌漿質網上的鈣離子通道出現問題

73. 有關重症肌無力的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 屬於自體免疫疾病，主要影響骨骼肌
- (B) 會在活動時越動越無力，休息時緩解
- (C) 麻醉處置應考慮肺誤吸的風險
- (D) 惡化的誘發因子有壓力、感染、高血鉀

74. 有關睡眠呼吸中止症中 STOP-Bang 的各項風險因子，下列何者錯誤？

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| (A) 打呼 | (B) 年齡 < 50 歲 |
| (C) BMI > 35 kg/m ² | (D) 頸圍 > 40 公分 |

75. 有關術中呼吸道著火的風險評估，下列何者錯誤？

- (A) 有火源，例如電燒或雷射
- (B) 有燃料，例如棉花或氣管內管
- (C) 有氧化劑，例如氧氣、笑氣或空氣
- (D) 僅發生於插管全身麻醉

76. 下列哪個疾病發生困難氣道的風險較低？

- (A) Pierre Robin syndrome
- (B) 重症肌無力
- (C) 舌癌
- (D) 僵直性脊椎炎

試題

參考

77. 某地區醫院為確保其專科護理師在醫師監督下執行醫療業務時，能符合法規要求並維持高品質的病人照護，下列何者最能展現其精神？
- (A) 醫院可授權資深專科護理師在緊急情況下，自行決定其可之醫療業務範圍，並於事後24小時內口頭向監督醫師回報
 - (B) 醫院應成立專科護理師執行醫療業務委員會，負責核定專科護理師預立醫療流程內容及標準作業程序
 - (C) 為確保病人安全，所有侵入性醫療業務必須由醫師親自在場監督，專科護理師方能執行
 - (D) 監督醫師對於專科護理師執行之所有醫療業務，僅需在病人出院前完成紙本或電子醫囑記錄
78. 依據民國113年修訂之「專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法」中，醫師監督下的定義與內涵，是確保專科護理師在執行醫療業務時具備法定授權依據與臨床安全保障的關鍵，下列敘述何者錯誤？
- (A) 醫師需事先參與並核定預立醫療流程內容
 - (B) 醫療機構需定期審查流程內容及執行現況
 - (C) 急救時各種侵入性處置不受此規範
 - (D) 所謂醫師之監督不以醫師親自在場為必要
79. 依據民國113年修訂之「專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法」規範，下列哪一項侵入性檢查處置，專科護理師在醫師監督下可以執行？
- (A) 執行超音波導引抽吸採集檢體
 - (B) 操作支氣管鏡檢查採樣及判讀
 - (C) 執行陰道擴張器置入採集檢體
 - (D) 操作膀胱鏡以生理食鹽水沖洗
80. 專科護理師執業登記於居家護理所，其執行「專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法」之醫療業務，下列敘述何者正確？
- (A) 居家護理所應成立專科護理師執行醫療業務委員會，並由醫師背景的委員擔任召集人
 - (B) 執行預立醫療流程後，監督醫師不需要到居家護理所，可以傳真方式簽署
 - (C) 所執行之醫療業務經監督醫師同意後即可執行，不需居家護理所核定
 - (D) 執登之居家護理所負責人必需為專科護理師，始能針對其所執行業務進行督導

【以下空白】